

ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA

Plantarum novissimè detectarum ultra Millenarium numerum

COMPLECTENS.

Cui, tanquam pedi jam stantis Columnæ,

PLUS ULTRA

Inscribere fas est.

Cum Indice ~~Totius~~ Operis ad calcem adjecto.

— *Aspice quantum
Congruet arderi mox Anagramma meo.*



*Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulli nata
post mille Sæcula, præcludetur occasio aliquid adjiciendi.*

Seneca.

L O N D I N I M D C C .


Sumptibus Autoris.

MANITISSA

COMPLETENS

PLUS ULTRA

Dedit nobis hæc Otia DEUS.



LONDON: MDC

Printed by J. Sturges

LEONARDUS PLUC'NETIUS

Candido Lectori.

SAPIENTER olim summus Vates Homerus, homines epitheto perquam accom-
modato ἀπορητας, hoc est Indagatores, Repertoreshque appellavit: Est enim Ho-
minis hoc maxime proprium Invenire semper aliquid, & quæ abdita, diu latue-
rant, in lucem proferre. Hinc Artes inventæ omnes initio rudes, deinde verò
aliis excogitantibus sensim excultæ, atque ad insignem, non summam tamen perfectionem
deductæ; Locus ubique semper est novarum rerum Inventioni. Id cum in omni Facul-
tate conspicuum est, tum præcipue in Botanica inter præcipuas Artes nobilissima comper-
tissimam; Quæ cum eo perducta hodie sit, ut nihil magnificentius, nihil ornatius, aut
dici aut excogitari posse videatur, hæc tamen adhuc obstructa est nova rebus Inveniendis
via, nec multa etiamnum desunt, in quibus præstantissimi Viri Ingenii nervos intendant
in ultimâ manu operibus imponendâ.

Post evulgatam sane meam Almagestum Botanicum s. Phytographiæ totius Ono-
masticon, quædam necessaria circa nonnullas Plantas ibid. recensitas adhuc Observabam,
aliquot alias insuper ex abundanti non minus elegantes quàm valde raras ad meam notiti-
am pervenire contingebat; quarum neminem hætenus mentionem fecisse ar-
bitror, Luxuriosa namque est plantarum seges ut optime scribit Turnefortius Epist. ad Sherard.
& demetendæ forsân jamjam collectis longè sunt copiosiores; Adeo enim im-
mensum est hoc rei Herbariæ studium, ut quam multæ à diligentibus Inda-
gatoribus quotidie reperiantur Novæ Plantæ quas in rerum Naturâ minimè extare pu-
tabamus, Plantæ novæ sunt dictæ, non quod Natura novas in illis ediderit formas, sed
quod à Novi Orbis Exploratoribus nobis fuerint noviter detectæ.

Eam ob rem tum illa quæ Observabam ad illustranda plurima, tum inter infinitas,
propemodum quas antea possidebam plantas, nonnullarum Icones affabrè delineatas & ære
incisas (harum equidem perpaucas ob sumptus immadicos) in hanc Maptissam congerere
operæ pretium esse ducebam; cæterasque nunc hæc in hunc adjectas censui, indicatis folio
& lineâ quibus inseri deberent, ut in qui Almagestum & Phytographiam nostram sibi
compararunt, hæc nostræ Post-Curæ etiam usus esse possint.

Candido Lectori.

Nec pudet me profiteri per quos profecissim; Has enim Plantas perquam rarissimas; quæ maximâ, & præcipuâ molè auxere Mantissam nostram, acceptas referimus munificentia Amplissimi Viri, & Mercatoris Londinensis celeberrimi, nec non Directoris Veteranæ Societatis Indiæ Orientalis apud Anglos dignissimi, D. Caroli du Bois, Stirpium exoticarum Aestimatores eximii, & in arte Botanicâ tam docti, quàm qui maxime, non minus quàm Communicationi Ornatissimi Viri D. Alexandri Brown, eruditi Scoti, Medicinæ & Chirurgiæ, perinde ac Matheseos Facultatibus cum primis periti, qui Plantas rariores quamplurimas, quas ipse propria manu collegit, atque in reditu ex Ind. Or. & Prom. Bon. Spei secum adferebat, nobis candidè impertivit: Huic igitur Duumviro nunquam satis deprædicando, cujus desiderium & amor Botanices augendæ & exornandæ tantus fuit, meritò apud omnes Candidos ac recti iudicii animos, gratiæ debeantur, quoniam (ex parte saltem) suum hoc Opus jure quoddam dici mereatur.

His itaque præmissis Benevole mi Lector hoc nostrum de Te benemerendi studium boni consulas, & nobis meditare quàm ampla, quàm mirabilia sunt Creatoris nostri opera, & quàm nos ignari simus innumerabilium rerum quæ alibi terrarum reperiuntur: Ipse denique Tecum recolis, cum Summus rerum Archetypus ad immensitatem Potentiæ, Sapientiæ, Bonitatis suæ hac in parte explicandam tot Plantarum varietates condiderit, cumque in Mundo hoc sublunari præter hominem, non aliud animal sit intelligentiæ & rationis particeps quod eas Contemplari valeat; Huic, quàm sedulo incumbere expedit singulas species exquirere? Ne quæ pars Naturæ Operum negligatur, aut Creatoris laude vacet.

Vive felix atque licet nos omni Mecænate destitutos esse, nec ullo Evergeta in partem oneris ferendi bucusquæ adjutos, hic palam & ingenuè profiteamur, (quod non possit sanè non maximum esse debortamentum, & summum tædium nobis ingerere, sumptus tantos faciendi alienis deliciis;) alia tamen, (favente Numine) nec minus Pluc'netii nomine digna expectaturus: Quæ si non ingrata fore animadverterimus, necdum desinemus forti animo & labore indefesso Spartam quam semel sumus nati, pro virili parte adornare, & in rem Herbariam amplificandam ulterius prosecuturos nos pollicemur; Interim his fruire & Vale,

Ex Aedibus nostr. ad Palatium antiquum apud Westmonast. Anno à nato Mundi Salvatore M DCC.

Tu quoque perpetuos semper gere Frondis honores.

Ubi cum Almagesto nostro,
Hic quoque liber est parabilis.

Monitio.

Tab. CCLXXXI. CCLXXXII. CCLXXXVIII. CCXCII.
CCXCIII. CCXCIV. CCXCV. CCXCVI. Phytogr.
nondum sunt ære incisæ; quocirca Plantæ hujus numeri,
ad Delineationes his Tabulis adscriptas, tanquàm nondum
editis, ab Almagesto referuntur.

Ad

ALMAGESTI BOTANICI MANTISSA.

A.

Fol. 2. post lin. 12.

A BROTANOIDES arboreum *Monomotapense* floribus in ramulorum cymis. An *Elichrysium* foliis *Abrotani* glabris *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.*

Fol. 2. ad lin. 30.

Abrotanum tenuifolium incanum minimum Bocconi Museo Plantar rarior. pag. 83. Tab. 74.

Fol. 2. ad lin. 34. post fig. 14.

Abinthium Santonicum Alexandrinum, f. Sementina & Semen sanctum Park. Theatr. 102.

Fol. 2. lin. antepenult. post fig. 3.

Fortè *Yztacchayat* sive *Sal amarum Hernandez apud Recc. fol. 208. Artemisia humilior flore majore albo, anisid adornitwod Jamaicensibus dicta Cat. Jam. 127.*

Fol. 3. ad lin. 4.

Abinthium pumilum palmeum minus, argenteo sericeoq; folio Hispanic. & Italic. Bocc. Mus. Plant. pag. 81. Tab. 71.

Fol. 3. lin. 12. post p. 429.

Itè *Acacia secunda* veteribus ejusd. *I. B. Tom. 1. lib. 12. fol. 432.*

Fol. 3. post lineam 26.

A CACIA *Americana* *Abruzæ* foliis triacanthos, sive ad axillas foliorum spinâ triplici donata, ex *Surinam*. Hanc Arborem curâ & industriâ *D. Joan. Adams Hortulani* peritissimi cultam, in *Hort. Comptoniano Fulbamiæ* conspeximus.

Fol. 4. post lineam 17.

Acacia spinosa Indiæ Orientalis foliis subtus cæsiis, floribus globosis luteis. *Eachedde Malabarorum.*

Eadem non spinosa, *Checrean Malabarorum.*

Acacia spinosa Ind. Or. floribus aureis staminibus, *Tamarisci Narbonensium* more, in spicam dispositis, *Mullaowlamaram Malabaror.* An *Acacia* genus *Indiarum* flosculos ferens luteos racematim coherentes; *Wamulæthya Cingalensis* dictum *D. Seyn. in Not. ad Part. 1. Hort. Mal. fol. 70.*

Eadem non spinosa flosculis staminibus aureis *Tamarisci* in modum spicatis *Owlamaram Malabarorum.*

B

Acacia

Acacia Chalepensis pinnulis parvis spinosa, floribus papilionaceis luteis, ex alis in spicam prælongam dispositis spinâ rectâ singulari. An *Acacia Americana* floribus spicatis luteis PBP. 304. Huc congener est *Zezecpathis Acatlanensis* Glycyrrhizæ æmula *Hernandez*. apud *Rec.* 241. Si non *Glaux Americana* *Acaciæ* forma rectius nominari mereatur.

Fol. 4. ad lin. 2. post. 13.
An *Acaciæ* cognata alia JB. *Hist. Pl. Tom. 1. lib. 12. fol. 433.* forte etiam *Moulava Hort. Malab. Part. 16. Tab. 5.* aut hujus congener.

Fol. 4. ad lin. 3. post. 13. add.
Pro hujus synonymo in *Catalogo Jannicensi*. male ponitur *Rhamnus Myrtifolius* ex *Insula Sancti Christophori*, *Cornuti* pag. 83. ubi sub hujus titulo diversarum Plantarum nomina miscentur.

Ibid. post CBP. & ante vocem *Rubi.* add.

Hanc etiam *D. Sloan* in *Cat. Jamaic.* *Gossipium* arboreum maxim. spinosum folio digitato perperam facit. pag. 159.

Fol. 4. ad lin. 3. post. 13. add.
The Pichar Tree, nostratibus & aliquando *The Besout Tree*, (i.e.) *Nux Bezoartica*; *Malabaris Gatchgachitta*; *Gentilibus* autem *Cachakailille* nuncupatur.

Fol. 5. lin. 3. post. c. 29. add.
Pisum Ochrae colore ejusd. *Exot. lib. 3. cap. 15. fol. 71.* *Bonduch Indiano di color citrino* *Pon. Ital. 34.* *Bonduch* planta *Indiana* di color citrino *Zanon. fol. 44.* Fructus omnino rotundus luteus non splendens JB. *Tom. 1. fol. 311.* Fructus rotundus & orbicularis quintus 1. flavus, macula subfusa notatus CBP. 405. *Jonst. Den-drolog. fol. 100.* *The yellow Pichar Tree.*

Fol. 5. ad lin. 19.
Cū mō (forte) *Sinensum* quæ arbor *Lustanice* *Sapaoc Cleyeri de Medicam. Simplic. Sinensum* pag. 45.

Ibid. ad lin. 25.
Adr. Jun. Arriani lignum *Acacanthum* esse autumat, ut à *Skinnero* nostro in *Etymolog. Botanic.* observatum.

Ibid. ad lin. 32.
Poinciana flore pulcherrimo *Turnesarti Elem. des Botan. Tom. 1. 492.* *Mailleonei Malabaror. Indorum Idolis sacra.*

Ibid. ad lin. 41.
Sena spuria arborea spinosa fol. stans ramosis s. decompositis, flore ex luteo & rubro specioso *Sloan. Cat. Jam. 149.* *St. Jago flower of Ligon. fol. 15.* & interdum *fence-flower.*

Ibid. ad lin. 47.
An *Tlacoxilexochitli* flore barbato *Hernandez apud Rec. fol. 104.* *Car. subjung. de novo.* *Acacia* non spinosa *Ind. Or.* villosa caule, lobo corticoseo prægrandi fusco, *Chata-maram Malabarorum.*

Fol. 6. post. 13.
Acacia non spinosa *Ind. Or.* Coluteæ foliis, floribus flammis amphis, lingua crustacea gemella *Placentæ* in modum colorata. *Caurwallæ Malabaror.*

Ibid.

Ibid. ad lin. 22.

An *Mimosa arborea* *Americana* non spinosa pinnis *Acacia* latioribus inferne glaucis, flore albo *Breyn. Prodr. 2. 73.* *Mimosa arborea* non spinosa; foliis l. pinnis latiss. *Car. Jam.*

Ibid. ad lin. 24.
Hæc forsitan *Mysobalan* sit species, sed ab *Emblia* foliis *Securidacæ* *Breyn. Prodr. 2. pag. 74.* plurimum diversa.

Fol. 7. ad lin. 20.
Arbor (forte) *Thurifera* *Theveti* quoad Iconem apud *Hist. Lugdunens. fol. 1754.*

Ibid. post lin. 29.
ACERIS cognata *Tilia* folio *Bengalensis* fructu amplissimis membranulis circumcincto. *Draco arbor Indica* siliquosa *Populi* folio *Angsana* vel *Anglaya* *Javanica* *Hort. Amsteladami. fol. 213.* *Draconis arboris* fructus ex *Carthagine* *Periana* *Morardes* apud *Clus. fol. 338.*

Ibid. ad lin. penult.
An *Guaiaco* *Occidua* similis arbor *Park. Theatr. 1587.* *India Occidua* *Palma* *Sanctæ* similis arbor *Lob. Adv. Sic. 187.* *Loti Africana* similis *Indica* *CBP. 1148.*

Ibid. post lineam ultimam.
ACEFOSA montana maxima *CBP. 114.* *Oxalis* major *Brackenbergensis* *Tha-lyii* *Hercyn.*

Fol. 8. post lin. 5.
Acerosa maj. subrotundis foliis ex *Promontorio* *Bau. Spec. an Acerosa montana* lato *Ari* rotundo folio *Boscon. Mus. Pl. pag. 165. Tab. 125.*

Fol. 8. ad lin. 15. add.
An (forte) *Acerosa* *Calcha* folio peregrino *CBP. (i.e.) Oxalis* *Zacynthi* *Prosp.* *Alpin de Plant. Egypt. pag. 136.*

Ibid. post lin. 26.
Acerosa arvensis lanceolata *CBP. 114.* *Acerosa* minor erecta lobis multifidis *Bocc. Mus. Pl. pag. 164. Tab. 126.*

Acerosa lanceolata angustifolia repens *CBP.* quæ quarta in *Prodr.* *Acerosa* minor supina lobis laciniatis *Bocc. Mus. ut supra.* a præcedenti species non diversa; Hujus enim foliorum varietate mirè se oblectat ludibunda Natura; ratione loci pinguioris (inquit *Bauhinus*) aridiorisve, major minorve, latioribus angustioribusve foliis reperitur; nunc etiam non lanceolatis, nunc lobis multifidis; addi poterat.

Ibid. ad lin. 32.
An *Oxalis* maxima montana *Clus. Hist. 2. fol. 69.* *Acerosa* montana geniculis nodosis *CBP. 114.* *Oxalis* folio amplissimo geniculis tuberosis *J.B. Tom. 2. 991.* *Ribes Arabum* foliis *Petasitidis* *CBP. 155.* *Ribes Serapionis* foliis *Oxylapathi* *Bel-lyn. de Coniferis* *Dod.* *Ribes legitima Arabum* *Clus. Hist. 120.*

Ibid. post lin. 37.
Acetose arboreæ foliis minoribus & magis acuminatis. *Chitramullum Malabarorum*, & *Coadevalle Gentilium Indorum*, an *Karapa* *Hort. Malab. Part 5. Tab. 47.* *Baccifera Indica* ad foliorum alas florida, fructu umbilicato, & calculato tricocco *Raii, Hist. 1496.*

Fol. 8. post. lin. 34.

ACINODENDRON *Americanum* ampliore folio trinervi, inferius alba lanugine incano, *Malva Brasiliensis* Marteg. 117. Arbor racemosa *Brasiliensis* foliis *Malabathri* Breyn. Cent. Grossulariz fructu arbor max. non spinosa *Malabathri* folio integro minore subtus albido, fructu majore Cat. Jam. 164. Pomifera *Brasiliensis*, fructu rotund. cum pulpa molli polypyræno *Raii Hist. Pl.* 1501. & 1648.

Acinodendron Americanum. *Malabathri* subrotundis foliis, subtus lanugine ferruginea villosis. Arbor *Americ.* *Malabathri* subrotund. foliis subtus lanugine ferruginea villosis *Plukenet Tab.* 249. Cat. Jam. 164. Item Grossulariz fructu arbor max. non spinos. *Malabathri* folio integro minore subtus ferrugineo. *ejusd.* pag. 165.

Acinodendron Americanum. quinquenervium comantibus flosculis, foliis amplissimis glabris prona parte albicantibus. Grossulariz fructu arbor maxima non spinosa *Malabathri* folio maximo inodoro, flore racemoso albo Cat. Jam. 164.

Acinodendron Americ. Canellæ fol. maximo utrinque glabro. Grossulariz fructu arbor non spinosa *Malabathri* folio maximo glabro & splendente. Cat. Jam. 165.

Acinodendron Americanum. pentaneuron foliis crassis hirsutis, ad ambitum rarioribus ferris, ex *Insula Jamaica*: An Grossulariz fructu non spinosa *Malabathri* foliis longa & rufa lanugine hirsutis fructu majore cæruleo Cat. Jam. *Ibid.* Fortè Coaghyuyo *Brasiliensium* *Pison.* fol. 217. Frutex baccifer *Brasiliensis* fructu racemato congesto Myrtylli *Raii Hist. Pl.* 1636. Hæ sunt Arbores quæ sub generico Arborum titulo cum suis epithetis, propofui in *Almagesto.* fol. 40. at in *Catalogo Jamaicano* recensetur alia quidem Grossulariz fructu majore, Arbor spinosa fructu folioso è viridi albicante, quæ nobis nondum innotuit. An fortè Uva crispa *Americana* *Pisonis* fol. 242. Aninga peri *Brasiliensium* sub titulo Sambuci in *Almagesto* nostro exhibita fol. 330. An sit hujus loci quærendum. Huc quidem fortè spectat Cisti facie Arbuscula *Jamaicensis* foliis trinerviis hujus *Almag.* fol. 105. & dici mereatur.

Acinodendron Americanum. trinervium foliis perexiguis. An fortè *Guvavirap Brasiliensium* Arbor proceræ & vasta frondibus perexiguis, floribus rubicundis, fructu Uyam crispam referente *Lacini Ind. Occid.* lib. 16. cap. 11. *Ibid.* post. lin. 37.

ACROCHORDODENDROS f. Arbor *Indica* prægrandis, foliis integris, Platani fructu verrucoso minore, sive Fragi formi duro, cujus singuli bati seu tuberculi sunt capsulæ Seminales. Melius forsân, Arbor *Indica* prægrandis, foliis integris fructu rotundo parvo Fragiformi è tuberculis capsularibus composito. *Nellacarumbac Malabarum.*

Ibid. ad lin. ult.

An fortè Erica spinosa *Tetralix Arbeniensium*. f. *Tetralix Ericæa Pliny* lib. 2. cap. 16. *Tetralix* quam & folio & caule spinosas habere lanugines, Idem *Plinius* affirmat. *Hist. Nat.* lib. 21. cap. 16. an *Tetralix Theophrasti Hist. Pl.* lib. 6. cap. 3. à quibusdam *Ixine* vocata.

Fol. 9. ad lin. 5.

Huic quodammodo affinis est *Carim-curini Hort. Malab. Part 2. fig. 20.*

Ibid.

Ibid. ad lin. 19.
 An Filix ramosa min. hirsuta ramulis raris brevibus pinnulis subrotundis folii apice radices agente Cat. Jam. pag. 24.
Ibid. ad lin. 20.

Adianto nigro accedens segmentis rotundioribus Filix elegans Raii Synops. Stirp. Brit. novissime edit. pag. 51. ubi D. Raii hujus Specimen optime asservatum sibi ostendere Sberardum, & pro natali solo Jersera haberi faceret; Ast idem Cl. Sberardus hanc perelegantem filiculam Jersera Angliæ nostræ adjacentis Insulae alumnam esse, exinde nobis vivâ voce inficiatus est, quomobrem hanc notam licet inserta fuit in Phytographia de industria omisimus in Almagesto.
Ibid. ad lin. 30.

Trichomanes majus foliis longis auricularis D. Bawster. apud Rai. Hist. Pl. 1928.
 Trichomanes foliolis longioribus eleganter supernâ præsertim parte laciniatis Cat. Jam. 17.

Ibid. ad lin. 32.
 Trichomanes majus pinnis sinuatis subtus niveis Cat. Jam. *Ibid.*
Ibid. ad lin. ult.

An Ruta muraria major foliis variis, scilicet oblongis integris, & subrotundis serratis Cat. Jam. 21. Adiantum minimum folio vario Turnfortii Elem. Bot. Tom. 1. 433.

Fol. 10. ad lin. 32.
 An Adiantum ramosum scandens, pinnulis sive foliis oblongis profundè laciniatis pellucidis Cat. Jam. 22. Muscus (fortè) monranus Adiantum foliis Bacc. Mus. Pl. Tab. 2.

Ibid. post lin. 41.
 ADIANTUM Æthiopicum frutescens diffuso vertice, pinnulis tenerimis subrotundis transparentibus pediculo nigro.

Fol. 11. ad lin. 11.
 Adiantum nigrum majus non ramosum, sulculis è pediculi communis summitate tanquam centro prodeuntibus, & stellæ in modum radiatis Cat. Jam. 22. sed quomodo hoc Adianti genus radiatum dici meretur & surculosum, atramen non ramosum, ego planè non intelligo.

Ibid. ad lin. 13.
 Adiantum nigrum minus non ramosum pinnulis majoribus crassis Trapezii in modum figuratis Cat. Jam. sed malè dicitur non ramosum. Item Adiantum nigrum majus non ramosum pinnulis & sulculis rarioribus crassis & Trapezii in modum figuratis ejusd. Fortè etiam Trichomanes majus totum album pinnis aculeatis Trapezii figurâ ejusd. *Ibid.*

Ibid. ad lin. 15.
 An Filix major in pinnas tantum divisa oblongas latisque non crenatas à basi rotundiore ad apicem se sensim angustantes Cat. Jam. nostræ ramen pinnulæ sunt argutè denticulatae.

Ibid. ad lin. 18.
 An Filix major in pinnas tantum divisa raras latiores oblongas striatas, ex adverso, latis & non crenatas Cat. Jam. 18. At nostra sup. pinnulæ non semper

ex adverso sitæ, nec non crenatæ. An rectius sit Filix non ramosa major caule nigro furculis (alis) raris, pinnulis angustis raris longis dentatis *Car. Jam. 20.*
 An Adiantum nigrum ramosum pulverulentum & falcatum *Carol. Plumier. Fig. 47.*

Ibid. ad lin. 36.
 Filix non ramosa minor caule (pediculo) nigro, furculis raris, pinnulis angustis dentatis raris brevibus acutis, subtus niveis. *Car. Jam. 20. aut. Saltem.* Filix non ramosa minima caule nigro furculis raris, pinnulis angustis raris brevibus, acutis, subtus niveis *eiusd. ibid.*

Fol. 13. ad lin. 17.
 An Chamelez genus spinosum ex *Prom. Bon. Spei. ejusd. Hermannii. Phillyrea* forte Hispanica Lauri folio serrato & aculeato *Journesfortii Elem. Bot. Jam. 1. 469.*

Fol. 14. ad lin. 7.
 An Malva minor supina Betonica folio, flore coccineo, seminibus asperis *Car. Jam. 96.* seminibus tamen asperis plantula nostra caret. An rectius ergo Abutilon herbaceum procumbens Betonica folio, flore purpureo *eiusd. 97.*

Ibid. post lin. 23.
 ALCEA parva fruticosa Triflaginis folio erecta ex Oris *Caromandel.*

Alcea arborea Populi nigrae foliis, prona parte albicantibus, flore amplissimo rubicundo ex *Insula St. Helena* ubi *Redmond. (i. e.)* Lignum rubrum Nostratibus nuncupatur.

Alcea arbor Populnea fronde, tota argentea quinquicapularis. f. Ebenus viridis ex *Insula St. Helena* ubi ab *Anglis* illic degentibus *Blackwood & Ebony, (i. e.)* Lignum nigrum & Ebenus cognominatur. Et re vera est Ebenus genuina *Indarum*, ut ex aliorum fide dignorum relatu nobis serio affirmabat insignis ille Botanicus & Veritatis studiosus *D. Carolus de Bauh.* Catomelanos arbor f. Melanoxylon populnea fronde argentea dici mereatur. *The Silver-leaf'd Blackwood, or Tree Green Ebony of the Indies, L. ebenus Verre Rochefort. 73.*

Ibid. ad lin. 49.
 Atlazopillin (forte) seu aquosa herba appensa flore rubro *Hernandez apud Recc. fol. 177.*

Ibid. ad lin. 42.
 An Arbor rosea flore flavo *Cap. Bon. Spei. D. Jan Rhine Breyn. Cent. 178.*

Fol. 15. ad lin. 6.
 Cum precedente confundi non debet.

Ibid. ad lin. 29.
 Alcea acetosa Indica spinosa, foliis profunde laciniatis, flore subluteo amplo. *Breyn. Prod. 2. pag. 9.*

Ibid. ad lin. 34.
 An Acetosa Brasiliensis flore dilute purpureo *Marogr. fol. 23.* An forte Acetosa, The Juice whereof is carried in a Gourd by the Indians of *Cumana*, to moisten their eyes; flour, carried in another Gourd. *Sir John Hawkitt. Hakluyt Part 3. fol. 98. French Society, (i. e.)* Acetosa Franca vulgo nuncupatur; dubium movetur in *Car. Jam. 99.*

Fol.

Fol. 15. ad lin. 37. post accepimus.

An Sair Indorum Oxalis Canhabina fruticosa, fructu coccineo coronato *Triumfetti Hort. Medic. Romanae Sapientia apud Cyprian Hort. Catholic. 194.*

Althea Indica parvo flore petalis angustis & acutis *Moris. Hist. Pl. 2. fol. 531.*

Ibid. ad lin. 131.

Alcea maxima Malvæ roseæ folio, fructu decagono recto, casso breviora esculento *Cat. Jam. 98.*

Alcea maxima Malvæ roseæ folio fructu pentagono recurvo graciliore & longiore *Tong. Dehon, vulgo Car. Jam. Ibid.* ubi Autor multa confarminat nomina sed huic plantæ nimis erroneè attributa; Hæc enim reverà omnibus rei Herbariarum studiosis hactenus fuit incognita, & à nullo Botanico descripta; Eam igitur si Autor præsum filio, nec Synonymis male appropriatis tam fidei confudisset, melius suo honori, Lectorique consulisset.

Ibid. ad lin. 131.

Forse etiam *Alcea minor* *Africana* Althææ facie, flore purpureo parvo *Bryn. Fajt. rarior. 19.*

Fol. 17. post lin. 9.

Alcea minor Abutili facie ex *Coromandel* à priorè diversa.

Parum distat ab Althæa arborea *Indica* flore luteo, folio tripartito *PBP. hujus Almagesi fol. 25. Pl. 1. cujus pictura exhibetur Phytogr. Tab. 259. Fig. 4.*

Hacoyochitl Nov. *Hisp. Hernandez apud Rec. 376.* ad hoc genus Plantarum spectare videtur.

Fol. 18. ad lin. 1. Post striata, add. rugosa.

ALCHIMILLA alpina pentaphyllos *Rais. Synops. Stirp. Brit. 66.* quam pro *Alchimilla* alpina quinquifolia *CBP.* per errorem ut ipse fatetur olim habuerat. Pentaphyllum s. potius Heptaphyllum argenteum flore muscolo *JB. Hist. Plantar. Tormentilla alpina folio sericeo CBP.* *Alchimilla* perennis incana argentea sive sericea Sacrum provocans *Moris. Hist. 2. 198.* Huic (forse) accedit *Cihoapatli Axitzalpatli* Nov. *Hisp. Terentii apud Rec. fol. 378.*

Narcissus Andromedæ folio latissimo rotundo floribus niveis inodoris *Hort. Med. Amstelod. Iconibus fig. 39.*

An Frutex *Virginianus* floribus albis instar *Spirææ compactæ* *Hort. Oxon. Alni folio arbor folio subrotundo serrato* *Car. Jam. 128.*

Button-wood *Barbadenfis* Angliæ cujus fructus Anglice *Buttons*, à similitudine globulorum *Vestimentorum* dicti sunt, subsecati *Myrsinifolia* plurimum diversa.

- Ibid. ad lin. 30.*
An Alni fructu Laurifolia arbor maritima *Cat. Jam. 135.*
Fol. 19. post lin. 12.
ALOES *Serpentariae foliis floribus hexapetalis spicatis.* **Maurelchedde** *Malabarorum.*
Ibid. ad lin. 30.
An Caraguana prima. *Pisum. Hist. Brasit. 191.*
Ibid. ad lin. 31.
 Hæc forsitan est illa Planta cujus meminit **Gulielmus Dampier** in *Orbis sua Circumnavigatione* pag. 175. quæ folia habet *Pinguin* persimilia, & radicem *Sempervivi*, sed multo majorem, hæc furno cocta, cibo sit idonea, quæ & *Indi* in *California* vescuntur.
Ibid. ad lin. 33.
An Tacori Clusii *Exot. fol. 48.* **Tacori** folia **Draconis** arbori similia **JB.** *Tom. 1. 405.*
Ibid. ad lin. 40.
An Nequametli. *Mori quinta angustifolia.* **Hernandez** apud **Recc.** 273. quodam figuram huic accenseri meretur, an potius sit **Yolopatli Irina** **Hernand.** apud eund. **Recc.** 310.
Fol. 20. ad lin. 3.
 Huc forte spectat **Tzichichic** vel **Texichic** de **Ocoinic** **Nov. Hisp. Terentii** apud **Anton. Recc.** fol. 434.
Ibid. post lin. 3.
ALSINE minor multicaulis **CBP.** **Alfine** minima **JB. Hist.** Huic forte pertinet **Trompili** **Quixpatli** **Nro. Hispania** apud **Recc.** 437.
Fol. 20. ad lin. 15.
Glaux altera subrotundo folio, **Bocc. Mus. Pl. Tab. 84.** **Glaux** altera palustris repens subrot. folio ejusd. pag. 107.
Ibid. ad lin. 17.
 Huic etiam accedit **Glaux** major palustris flore herbaceo **Bocc. Mus. Pl. pag. 105. Tab. 84.**
Fol. 108. post lin. 21.
Alfine major **Mariana** angusto longiore folio **Samoli** **Kalanandi** capsulis, summo caule floribunda.
Ibid. ad lin. 24.
 Hujus autem sententia censetur à **Opavi** non videre esse in **Hort. Catholic.** pag. 6.
Fol. 20. post lin. 26.
Alfine Anthylloides **Ind. Or. Commentaria Malabarorum.** Quid si cum **Juncaria** **Clus.** affinitatem aliquam habere deprehendatur
Ibid. ad lin. 31.
Herniaria **Alfines** folio **Turnefortii** **Elem. Bot.** 408.
Ibid. post lin. 36.
Alfines affinis **Tafala** **Jabala** juxta foliola barbula donata, flosculis summo caule glomeratis.
Fol. 21.

M A N T I S S A.

9

Fol. 21. ad lin. 38.

Nealapoondoo *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 40.

Terai *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 40.

Alfine five *Spergula marina* nostrati similis ex *Promontorio Bon. Spei*.
 Alfine five *Spergula marina* major *Gaditana* nodis caulim creberrimis.
 Alfine *Spergula* foliis, capitulis brevioribus duris. *Arraveenampoondo Malabar.*
 Alfine *Spergula Indiae Or.* spicatis floribus ex alis emergentibus. *Maunalekui Malabarorum.*

Alfine *Spergula Mariana* latiori folio, floribus ad nodos, pediculis curvis circa caulem insidentibus, calyculis eleganter punctatis, Alfine (fortè) *Spergula latifolia reptans*, *Banisteri Cat. Stirp. Virgin.*

Fol. 22. post lin. 2.

Alfine *holostea* angustissimo folio glabro ex *Virginia*.

Fol. 22. post lin. 4.

Alfines *Holostii* foliis antagonisticis glabris, *Ranunculi phragmitis* flore ampliori, *Planta Mariana*.

Alfine *Myosotis longifolia Virginiana*.

Ibid. ad lin. 7.

Huic fortè spectat *Saxiphraga altera Pr. Alp. de exot. 192.*

Ibid. post lin. 10.

Alfine *Chamædrios* foliis bijugis *Spergula* floribus *Æthiopica*.

Ibid. post lin. 14.

Alfine *Portulacæ aquaticæ* folio oblongo, flore longo pedunculo insidente ex *Prom. Comerin* fortè *Brami*, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 14.* *Glaux Indica* *Portulacæ* folio, flore majore diluto caeruleo albicante colore, *Commelin. Not. in loc.* Eadem fortè cum præcedenti, aut ejus saltè varietas.

Fol. 22. lin. 31.

Caryophyllus alpinus *Linifolius* radice amplissima, *HRP. Raii. Cat. exterar. 398.*

Fol. 23. post lin. 21.

A fine *Saxifraga Ind. Or.* foliolis circa caulem radiatis; flore herbido & muscoso; five Alfine *Spergula muscosa Ind. Or.* surrecta, caliculis albicantibus. *Perpauticum Malabarorum.* Alfine *Maderaspatana* *Gallii* foliis, flosculis communi pediculo ternis. *Almag. Bot.* excepto caliculorum colore, & quod non procumbit huic nostræ plurimum convenit.

Fol. 24. ad lin. 29.

Post accepimus adde *Phytogr. Tab. 159. Fig. 2.*

Ibid. ad lin. 35.

Huc fortè spectat *Macpaxochitl*, *Nov. Hispaniæ Terent. apud Recc. 382.*

Ibid. lin. ult.

Althæa Americana pumila flore luteo spicato, *Breyn. Cent. 124.* *Althæa* flore luteo, *Cat. Jam. 96.* Item *Malva Americana*, *Abutili* folio, flore luteo spicato, foliis hirsutioribus & crassioribus, *P.B.P. ejusd. Cat. Jam. 97.*

Fol. 25. ad lin. 13.

An Malva arborea folio oblongo acuminato veluto dentato & levitèr sinuato, flore ex rubro flavescente, *Cat. Jam. 95.*

Ibid. ad lin. 19.

Althæa Americana Betonicæ folio, flore luteo, *Commel. Not. in locum.*

Ibid. ad lin. 26.

An Malva vel Alcea fruticosa Ribesij foliis, seminibus asperis, *Cat. Jam. 96.* Uren Malabarica hujus est Species minor

Fol. 25. ad lin. 27.

An Malva aspera major aquatic. ex Hortensium s. rosearum genere, flore minore, jureo, semine aculeato, *Cat. Jam. 96.*

Ibid. ad lin. 32.

Abutilon (fortè) fruticosum, foliis subrotundis serratis, floribus albis pentaperalis ad alas foliorum conglomeratis, *Cat. Jam. 97.*

Ibid. post lin. 32.

ALTHÆA Betonicæ folio villosa, floribus ex luteo purpurascens deorsum reflexis ad oras. *Coromandel.* an Alcea arborea Althææ folio, florum peralis luteis deorsum reflexis, *Cat. Jam. 97.*

Althæa Coromandeliana angustis prælongis foliis, semine bicorni. Huic proximè accedit Tsjeruparna, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 53.* Quamquam *Commelinus* hanc plantam pro Cabrita posuit, *Not. supr. loc. Inferatur hæc ultima post lin. 34.*

Ibid. ad lin. 38.

Malva erecta minor Carpini folio, flore luteo, seminibus singulis simplici aculeo longiori donatis, *Cat. Jam. 96.*

Fol. 25. ad lin. 39.

Huic spectat Tsjeru Uren, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 73.* Utut pro Anomala ponitur à *Commelino* in loc. & ab ipso nominatur Planta Sideritis folio insipida, flore pentapetalo rosæci coloris, fructu rotundo in quinque partes diviso, semine triangulato.

Ibid. ad lin. ult.

An hæc sit Malva Curassavica Carpini foliis latioribus, Nehu Indigenis, *Hort. Begum. 29.*

Fol. 26. ad lin. 2.

Malva minor erecta Betonicæ folio, flore luteo semine duplici rostro seu aculeo prædita, *Cat. Jam. 96.* Huic (fortè) priori jure referenda Karu-Uren, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 54.* Althæa Americ. Betonicæ folio, flore luteo, *Commel. Not. in locum.* Cui à feminibus ex Curacao sibi transmissis non tantum progerminavit, sed & semina ad maturitatem perduxit.

Ibid. post lin. 2.

Althæa Americana, Sideritidis sive Matrupii aquatici foliorum æmulis, flore luteo minore.

Ibid. ad lin. 8.

Alcea (fortè) fruticosa aquatica folio cordato, scabro, flore pallidè luteo, *Cat. Jam. 97.*

Fol. 26. post lin. 13.

Althæa Brasiliensis minor *Chamædryos* foliis lanugine pubescentibus à Reverend. Viro D. Stonestreet accepimus.

Althæa pusilla fruticescens *Chamædryfolia* flore rubro cernuo ex Orii *Coromandel.*
Althæa minima procumbens *Chamædryos* foliis densa hirsutie obductis, Codeechit-
tamutte *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 23.

Rettepemarette Malabarorum.

Ibid. post lin. 23.

AMARANTHOIDES spicatum *Indicum* ramosissimum *Spergulae* foliis, spica
Alopecuroide candida.

Ibid. post lin. 28.

Amaranthus Ind. Or. *Bliti* folio transparenti, paniculis inter folia sparsis, Caunum-
palæ *Malabarorum.*

Ibid. post lin. 33.

Amaranthus spicatus *Coromandelicus*. *Bliti* majoris crispato folio, radice perenni.
Cadelari Hort. Malab. Part. 10. Tab. 78. *Verbena Indica Bontrij 1306* ex senten-
tia *Commelin. Not. sup. loc. Nijuree Malabarorum*, à præcedentibus admo-
dum diversa.

Ibid. ad lin. 39.

Wadapu Hort. Malab. Part. 10. Tab. 37.

Ibid. ad lin. ult.

Tlalchamallin (forte) *Mexicana* *Hernandez apud Recc. 420.*

Fol. 27. ad lin. 9.

Huc forte spectat *Ana-Coluppa*, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 47.* & nuncupari
possit, *Amaranthoides* scandens *Ciceris triphylli* foliis, capitulis oblongis *Malabar.*

Ibid. ad lin. 11.

Perficariae foliis repens *Malabarica* flore globoso albescente *Commelin. Not. in lo-
cum*, an *Amaranthoides* fruticosus foliis longis angustis subtus niveis, *Can Jam. 48.*

Ibid. ad lin. 13.

Punnagunnee Malabarorum.

Fol. 27. post lin. 13.

Amaranthoides Americanum latioribus bijugis foliis, summo caule spicatum, an *Tla-
loquiloni Huastocensis Hernandez apud Recc. 178.* Huic etiam congener ut no-
bis dijudicare licet, est *Tlayoyomochtli*, *Nov. Hispan. Terentii apud eandem
Recc. 426.*

Ibid. post lin. 20.

Amaranthus verticillatus minimus *Bliti* foliis pallide viridibus ex *Ind. Or.*
Huic (forte) spectat *Muriguti*, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 131.* *Alfinae* affinis
planta *Indica* flore candido, *Commelin. Not. in loc.* *The Indian Butthead:*
Muriguti enim tantundem dicit ac *Læde-Sana.*

Ibid. post lin. 22.

Amaranthus Africanus tomentosus subrotundis majoribus foliis, capitulis parvis
inter folia sparsis ad *Dom. Stonestreet* à fratre allatus est. *Idem* foliis ferme glabris.

Fol. 27. ad lin. 36.

Post app. 1938. add: Huic folia sunt Urticæ nostrati persimilia; ideoque verba quæ sequuntur ad proximè subsequenterem, pro Synonymo transponuntur: & emendabitur error.

Ibid. ad lin. ult.

An Ambrosia elatior foliis Artemisiz atrovirentibus asperis odoratis non lanuginosis, Cat. Jam. 38.

Fol. 28. ad lin. 7.

Ammi Matthioli Hist. Lugd. lib. 6. fol. 695.

Ibid. post lin. 7.

AMMIOIDES CBP. 159. Ammi pusillum Casalpini, an Ammi parvis foliis Fœniculi ejusd. CBP. Ammi perpallidum Lobel. Hujus exemplar optimè exsiccatum acceptum habui à Clariss. viro & in hujusmodi rarioribus indagandis Sagacissimo Exploratore D.D. Carolo Preston M. D. eruditissimo Scoto.

Fol. 28. ad lin. 10.

Huc fortè spectat Amomum sive Tugus, seu Birao, aliis Caropi, ex Insulis Philippinis à Reverendo Patre Georgio Camelli nuper in Angliam transmissum cujus pictura exhibetur in Transact. Philos. Londin. edit. No. 248. planta, Tsjanæ-Kuæ, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 8. haud multum impar.

Ibid. ad lin. 27.

Hemmottero Hottentorum, hujus est Prosapiæ Adamarum, Hort. Malab. Part. 4. Tab. 3. & 4. Katappera seu Amygdalæ Indicæ Joan. Niebuos. in Itinerar.

Ibid. ad lin. 29.

Amygdala Peruviana, cortice triangulari rugoso, JB. Tom. 1. lib. 3. fol. 293.

Fol. 28. ad lin. 31.

Add. nomine Katappera seu Amygdalæ Indicæ.

Ibid. post lin. 31.

AMYGDALÆ veneuata triquetra Ahovaij Americanis dicta: Arbor America foliis Pomifructu triangulo CBP. 434. Aouai lignum teterrimi odoris ejus nucleus presentaneum venenum, ex quo crepitacula Bresliani faciunt, Lærio Part. 3. Ind. Occid. cap. 12.

Amygdalus amara Indorum putamine fungoso amicta, flore umbellato, nucibus ad unum florem plurimis, Samandra Bengalensibus, & Goemburn Zeylanensibus dicta: Nagam Hort. Malab. Part. 6. Tab. 21. ubi inter siliquosas Arbores rescensetur. sed perperam. Siliquosa flore umbellato pentapetalo siliquis digitalibus spadiceis monospermis ad unum florem pluribus, Raii. Hist. Pl. 1753. De hac autem arbore sis vide Almagesti fol. 260. Sub cognomine Nagam.

Fol. 29. post lin. 11.

ANAGALLIDIS Monelli similis Herba Mariana Rubiæ Taurinensium foliis & floribus luteis ex uno exortu quaternis. Fortè Rubiæ species Mariana.

Ibid. post lin. 24.

Anagallis lutea foliis & floribus ab eodem exortu quatuor ex æqualibus furculorem interyalis cruciatim positæ à Terrâ Mariana. Rubiæ argentea Cretica Præ Alp. excepto quod folia non sunt argentea, huic nostræ plurimum convenit.

Anagallis

Anagallis lutea Mariana foliis longioribus angustis, ad genicula plurimis, caulem ambientibus.

Fol. 29. ad lin. 19.

Cytisus alpinus latifolius flore racemoso pendulo, *Turnesfort. Elem. Bot. 508.*

Ibid. ad lin. 27.

Mala Guianensis ejusd. *CBP. 433.* *Aizoi* majoris ortu persimilis exotica planta *Lobelii* ejusd. *JB. Tom. 3. 96. vid. Lob. Icon. 375.* *Yayama & Jajama* quibusdam, *Cynara Indica* sive *Ananas Indus* dicta *Bontii. 145.* *Aberas* fructus exotici *Brasiliensis*; *Cardui* forsân species, *Ambrosin. Phytolog. Part. 1. Tom. 1. fol. 2.*

Ibid. post lin. 27.

ANANAS sylvestris folio *Aloes* fructu cupressino, *JB. Tom. 3. lib. 25. fol. 96. Flor. Malabaric. fol. 5.* *Ananas Brasiliensis* sylvestr. *Acostæ Hist. Lugd. 1871.* *Carduus Brasiliensis* sylvestr. *CBP. 384.* *Nana brava* *Maregr. 33.* Frutex *Indicus* fructu aggregato conoide *Kaïda* dictus, *Raii. Hist. Pl. 1442.* *Kaïda Hort. Malab. Part. 2. fol. 1.* de hac autem videsis sub *Palmæ* affinis titulo minùs propriè in *Almagesto nostro fol. 277.*

Fol. 29. ad lin. 34.

An Mexocotl. s. Maguey Prunorum Antonii. Recc. fol. 272. *Aloe Americana* fructu dulci & acido multiplici, *Prunis* simili *Moris. Hist. Pl. 418.*

Ibid. post lin. 34.

ANA-PARNA *Hort. Malab. Part. 1. fol. 88.* *Poonnaeai Malabarorum.* Insigne ad *Venerem Incentivum.*

Fol. 30. post lin. 13.

ANCHUSA Buglossoides *Lithospermi* semine ex *Insula Johanna.*

Anchusa peregrina flore albo umbellato: *Omphalodes Lusitanicum Turnesforti. n. o. nente D. Preston.*

Anchusa Echioides lutea, *Corinthes*, aut *Symphyti* flore, folio ampliore. *Echium Alpinum luteum*, cui amplissima florum spica. *Almag. Bot. fol. 133. pl. 8.* *Symphytum* radice rubrà *Echii* folio ampliore *Turnesforti* qui dubium movet an *Echium* flore luteo radice rubrà *CBP.* habet enim *Consolidæ* majoris florem. *Onosma Matthioli Hist. Lugd. 1107.* similitudine in foliis, & modo crescendi, ut in *pictura* exhibetur huic nostræ maximè convenit.

Ibid. ad lin. 17.

Anchusa (forsân) *lutea minima Lob. Observat.*

Ibid. post lin. 17.

Anchusa angustifolia CBP. 255. *Lithospermum minus repens* ejusd. *CB. in Phytopin. 498.* *Lithospermum fruticosum angustifol. ejusd. in suo Matthiolo fol. 658.* *Libanotidis* species *Rondeletii JB. Tom. 2. 25.* Buglossum *Rorismarini* folio *Turnesforti.* *Anchusa lignosior angustifolia, Lob. Adv. 248.* *Tragoriganum notitum Dalechampii Hist. Lugd. 889. CB. Phytopin 422.* At non possum ego (inquit *Joannes*) cum fratre *Tragoriganum Dalech.* & *Anchusam Lob.* eandem facere plantam, quamvis adhuc in *Pinace* ejusdem sit opinionis. Una enim frutex est, altera non item, &c. quæ verba in *Almagesto nostro fol. 368.* cum duabus præcedentibus lineis inibi deleantur, & hoc loco inserantur, emendabitur error.

Fol.

Fol. 31. qd lin. 6.

A Novanglicanis nostratibus *Diospyros* nuncupatur.

Ibid. ad lin. 33. post cap. 17.

Fructus *Brasilianus* inæqualis semine fusco fervido CBP. 406.

Ibid. ad lin. ult.

Anona Hort. Medic. Amst. cap. 69. ubi pictura habetur.

Fol. 32. ad lin. 3. post T. 1.

Fortè etiam *Pineæ* nucis specie Fructus *Melenken ejusd.* JB. Tom. 1. lib. 9. fol. 264. ex *Theveto*. Arbor fructu Nucis *pinæ* specie CBP. 597.

Ibid. ad lin. 8.

An *Mespila Nicaraguz* suavissimi saporis, *Laetii* lib. 8. cap. 20. fol. 343. *Chetapaulum Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 14.

Atapaulum Malabarorum.

Ibid. ad lin. 17.

Momin ou *Corasol Rochfort* *Histoire des Antilles*, pag. 67. Anona *Indica* pomo viridi, PBP. 312.

Ibid. ad lin. 24.

Anona aquatica foliis Laurinis atrovirentibus fructu minore conoide luteo, cortice glabro in areolas distincto, Cat. Jam. 205. forte etiam *Palmis* affinis *Malus Persica* maxima caudice non ramoso foliis longiss. flore tetrapetalo pallidè luteo, fructu ex Arboris trunco prodeunte ejusd. Cat. Jam. 179. An forte *Palma Myrobalanifera* à *Plinio* memorata, Hist. Nat. fol. 232.

Fol. 32 post lin. ult.

ANONIS *Hispanica* frutescens folio longo tridentato. Anonis *Hispanic.* frutes. folio *Cithmii Chrysanthemi Schol.* Bor. 148.

Fol. 33. post lin. 2.

Anonis minima hirsuta *Cherleri* Trifoliis affinis, JB. Tom. 2. 394. Anonis siliqua hirsuta pendula, flore purpureo, HRB.

Fol. 33. post lin. 3.

Anonis mitis annua purpurea HRB. 17. Anonis purpurea oblongo rotunda prægrandi integro serrato folio lucido, spica Alopecuroide, *Cupani* Cat. Hort. Catholic. pag. 18. Ononis non spinosa rotundifolia spicata purpurea, *Hispanica* Bocc. Mus. Pl. pag. 60. Tab. 48.

Anonis peregrina monophyllos cum auriculis flore purpureo.

Ceteræ Anonidum species hoc loco in Ordinem seq. digerantur, viz.

Anonis non spinosa *Cerica* flore purpureo, Hort. Patavini Phytogr. Tab. 135. fig. 4.

Anonis forte non spinosa purpur. supin. minima *Rati.* Hist. Pl. 957. Forte etiam

Anonis æstiva minor floribus rubris *Baelli* Park. Theatr. Pl. 995.

Anonis lutea mitis, *Oxytriphyllo* ad florum petiolos capreolata, foliis levissimè crenatis Phytogr. Tab. 135. fig. 5.

Anonis lutea mitis, obtusis longioribus & crenatis foliis capreolis donata, Ononis

Senensis *Spigelia* *Isagog.* in rem *Herbariam* 39. Anonis non spinosa capreolis donata CBP. 389. An forte Anonis lutea annua recta hirsuta vilcosa siliquis hirsutis brevioribus;

brevioribus, *Morif. Hist. 2. 171.* Anonis fortè viscosa spinis carens lutea latifolia annua *Botan. Monsp. pag. 21.*

Anonis viscosa lutea mitis capreolata erecta foliis splendentibus glabris. Anonis (fortè) annua lutea, siliqua glabra breviori, *Morif. Hist. 2. 171.* ex *Insulis Fortunatis* ad nos allata est.

Anonis viscosa spinis carens lutea major, *CBP. 389.* Anonis lutea non spinosa *Dalechampia Natrix JB. Tom. 2. 393.* Anonis lutea perennis major *Natrix dicta, Morifon. Hist. 2. 170.* Cui flores Genistæ vulgaris lutei, pediculis oblongis insidentes, qui ultra florem nonnihil procurunt, nam petiolus ille è quo flos immediate dependet ex hoc (modo dicto) pediculo longo erectoque exoritur ut ritè observavit, *Cl. Rajus Hist. Pl. 958.*

Anonis non spinosa *Natrix dicta* floribus luteis striatis. Anonis non spinosa flore luteo variegato, *CBP. 389.* Anonis non spinosa lutea variegata, *Park Theatr. 994.*

Anonis viscosa spinis carens lutea major nonnihil procumbens, medio tantum folio per extremum serrato, pediculis florum indivisis. Hujus caules plurimi teretes, lenti pilosi, nonnihil rubentes ex una radice enascuntur longi partim humi procumbentes partim surrecti ad tactum glutinosi, è quibus prodeunt ramuli, quos petioli breves complectuntur atque quilibet folia tripartito divisa, quidam etiam unum integrum continentes, sic enim inferiora duo foliola caulem amplectuntur ut in *Lotis* sit, ac proinde hæc planta eodem modo & trifolia & quinquefolia quo *Lotus* quinquefolia dici meretur: Fortè Anonis non spinosa floribus luteis *Brasiliæ Maregr. fol. 3.* *Ononidis species Pisonis fol. 234.* Loto pentaphyllo siliquoso villosa similis, Anonis non spinosa, foliis Cisti instar glutinosis & odoratis, *Cat. Jam. 74.*

Anonis pusilla glabra fruticans *Cherleri Trifoliis* affinis *JB. Tom. 2. 394.* An. Anonis sylvestris lutea minima *Fab. Column.* quam spinosam dicit, *CB. in Pinace.* quia ut habet *Columna* calyces florum rigentibus foliolis oblongis aculeatis constructi sunt, quod in hac nostra videre licet, ut optimè notavit, *Cl. Magnol. Bot. Monsp. pag. 22.*

Anonis *Æthiopica* *Thymbrae* strictioribus foliis tricuspidatis, summis apicibus spinosis, flore pallescente luteo.

Fol. 33. ad Vin. 16.

Enonymus Virginiana *Ribesii* folio capsulis eleganter bullatis, *Hort. Med. Amst. cap. 87. cum Icone.* *Spiræa Opuli* folio, *Turnefortii Elem. Bot. 490.* Singulis capsulis plura semina, *Milij albi æmula* continentibus.

Ibid. post lin. 26.

ANONYMOS *Æthiopica* *Hyssopti* subrotundis foliis ex nodulo confertis, summo ramulo lignosa capsula magna & bivalvi donata.

Fol. 34. ad lin. 2.

Huc fortè spectat *Huapahuitzapatl* altera, *Nov. Hisp. Terentij apud Recc. 379.*

Ibid. post lin. 2.

ANTIRRHINUM luteum *Pedicularis rubrae* foliis *Marianum.*

Ibid. post lin. 11.

Antirrhinum foliis inflexis multo crassioribus, calyculis florum margine asperatis ex *Provincia Mariana.*

Ibid.

Ibid. ad lin. 14.

An *Linaria Saxatilis Serpylli folio Turnesfortii* apud *Collectaneas D. Preston*,
Antirrhino similis Mariana floribus purpureis parvis, staminibus prælongis refertis.

Fol. 34. post lin. 16.

APARINES minoris folio glabra Herba procumbens *Africana*. An *Aparines*
 folio *Anomala*, vasculo seminali rotundo, multa semina minutissima continente,
Cat. Jamaic. 50. In Horto Med. Cheltenham seminibus nata procrevit, Anno 1696.

APHYLLON aquaticum *Virginienſe* petraeum *D. Baillier*. hujus pictura ex-
 hibetur *Phytograph. Tab. 138. fig. 1.* nescio tamèn quo casu Ea in *Almagesto* fuit
 omiſſa.

Fol. 34. ad lin. 21.

An *Aracynappil Aurantijs parvis similis fructus*, *JB. Hist. Pl. Tom. 1. fol. 106.*

Anona (forte) trifolia flore stamineo, fructu Sphaerico ferrugineo scabro minore,

Allii odore, Cat. Jam. 205. Malus Americana trifoliata fructu Pomi Aurantii

instar colorato, Hort. Medic. Amst. cap. 67. Ubi sub hoc titulo pro hac arbore

alterius Icon figuratur, scilicet Therebinthi Americanae trifoliae lucidae Palamalettæ

vulgo, quæ in Phytographia nostra Tab. 229. fig. 1. depicta est, & à priore pluri-

mum diversa; Fructus etiam qui illic adpingitur non est hujus Arboris, sed Cu-

curbitiferae spinosæ similiter in Phytographia Tab. 170. fig. 3. ad vivum exsculptæ

cum suo fructu adposito.

Ibid. ad lin. 28.

An fortè *Libanotis Septentrionalium Herbariorum Lb. Adversar. Eibanotis minor,*

umbellâ candidâ, CBP. 158. Libanotis minima, Hist. Lugd. lib. 6. fol. 766.

Ibid. post lin. 29.

APOCYNUM arboreum *Ind. Or. Laurinis foliis, rostrato Borriginis flore,*

prægrandi siliquâ, seminibus longis gracilibus sericeis pappis involutis. Adde-

weepaula Gentilibus Indis, Bupaulemaram Malabareis vocitatur, an Nelampala

Hort. Malab. Part. 9. fol. 5. Apocynum Malabaricum arboreſc. Limonii folio,

flore ex flavo rubescente, siliquis maximis, Commel. Not. in loc. cui semina ob-

longa in vertice sericeis filamentis pencillata.

Ibid. ad lin. 37.

Huic fortè est congener *Wisanck f. Vincetoxicum Virginianum Gerard. emac. fol.*

899. Asclepias Indica JB. Tom. 2. 140. Asclepias quarta ex Virgina CBP.

Ibid. post lin. 37.

Apocynum rectum Marianum, foliis amplioribus binis ex adverso sitis, floribus um-

bellatis albis fortè præcedentis tantum varietas.

Ibid. post lin. 37.

Apocynum umbellatum album, latiore folio, tetraphyllum, ex Terrâ Marianâ.

Apocynum rectum Marianum longioribus subrotundis foliis intervallatis, floribus

purpureis.

Fol. 35. ad lin. 5.

Ercachedde Malabarorum.

Ibid. ad lin. 12.

An *Tepezentlis seu Spica Majzii montani, Hernandez apud Rer. fol. 223.*

Ibid.

Fol. 35. post lin. 13.

Apocynum rectum Marianum foliis longis mucronatis, floribus in umbellam, ob-
soleti coloris.

Ibid. ad lin. 21.

An Izontecpatli seu Volucrum Medicina, Hernandez apud Reccum. 125.

Ibid. ad lin. 39.

Fortè etiam Cenanam Texcoquensis, Nov. Hispanie Terentii apud Recc. 362.

Fol. 36. post. lin. 21.

Apocynum rectum umbellatum, longissimo Salicis folio glabro, ex Terra Mariana,
inter Exsuccatas D. Doody observatum.

Ibid. post lin. 21.

Apocynum Marianum erectum, lanuginoso Salicis folio, Hostulis ex albo virescen-
tibus in umbellam sitis. Huic fortè potiori jure pertinet Cenanam Texcoquensis
Mexicenfium sub Matris Spicæ Maizii titulo apud Recc. fol. 185.

Ibid. post lin. antepenult.

Apocynum Marianum erectum Linariæ angustissimis foliis umbellatum, apud eund.
D. Doody. Apocyno recto non ramoso Rosimarini foliis umbellis florum candi-
dis Almagest. Bat. plurimum convenit.

Fol. 37. ad lin. 1.

An Apocynum Hispanicum frutescens Linariæ folio, Turnesfort. Elem. Bot. 78.

Apocynum (fortè) caule tenui alte scandens capsulis echinatis, Bauh. Pin. Car.
Stirp. Virgin. Fortè etiam Apocynum fruticosum scandens Genistæ Hispanicæ
facie, floribus luteis odoratis, Cat. Jam. 89.

Apocynum frutescens strictissimis rigidis & prælongis foliis, bullatis floribus
Africanum, an fortè Aselepias lactescens & scandens foliis Linariæ Arbusti flore,
Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. pag. 20. An Apocyno similis angustissimo folio
Cassavæ, tuberosa radice caule geniculato nodoso, PBP. 314. Apocyn. scan-
dens African. Asphodeli radice angustissimo folio, Oldenlandi Paradis. Batav. 59.

Ibid. post lin. 7.

Apocynum angustifolium scandens, Ind. Or. breviori folio, cauliculis panicanti-
bus, Segunda-pala Malabarorum.

Ibid. ad lin. 10.

An fortè Cenanam de Quabuna-Hoad. Nov. Hispanice apud Recc. fol. 361. Huic
quoque propius accedit Katu-pai-valli, H. M. P. 9. Tab. 11. Apocyn. Ind. scan-
dens latifol. flore viridi diluto, siliquis oblong. cuspidatis Commelin. in loc.

Ibid. post lin. 23.

Apocyni genus scandens ex Ind. Or. Paulecoddee Malabarum, an fortè Vonsjera-
patsja, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 13.

Ibid. ad lin. 42.

Hujus flores sunt odore fragrantissimi.

Ibid. post lin. 42.

Apocynum scandens Pervinca majoris folio ex Provincia Carolina.

Ibid. ad lin. 44.

Fortè Vincetoxicorum speciebus adnumerari meretur.

Fol. 37. ad lin. ult.

An Circo affinis, scandens planta, aphylla, caule roscundo articulado glabro succulento saturate viridi. *Cat. Jam. 198.*

Fol. 38. lin. 16. post foliis add.

Minus corrugatum.

Ibid. ad lin. 30.

Semini ab Indigenis nuncupatur.

Ibid. ad lin. 35.

An Conguacuba Brasiliens. Martius lib. 3. fol. 97. Prunus (forte) racemosa foliis oblongis hirsutis maximis, fructu rubro. *Cat. Jam. 184.*

Ibid. ad lin. ult.

An Verbasci folio majore odorato arbor floribus pentapetalis albis, *Cat. Jam. 139.*

Fol. 39. lin. 10. post Sculigeri add.

Exercitatio 175. fol. 22.

Ibid. ad lin. 9.

Nominatur à *Shara* in *Cat. suo Jamaicensi*. Prunifera arbor fructu maximo Pyri-formi viridi, pericarpio esculento butyraceo nucleum unum maxim. nullo officulo rectum cingente; plurima etiam illic adnectuntur. Synonyma scilicet *Pyrus Hispanica Hugheji*. *Paltifera* arbor *Lactij*, &c. quæ omnino discrepant ab istis notis characteristicis sub hujus titulo comprehensis: Ista enim *Hugheji* habet in medio fructu officulum magnitudine *Mali Armeniaci* rotundum durum cave; quam *Slaviana* (ut ipse describit) nucleum habet nullo officulo rectum. Item *Dampier* in *Orbis circumnavigatione*, pag. 203. affirmat intra substantiam hujusce fructus latere Officulum magnitudine *Pruni Asinarii*. Etsi *Pyrus Armenica* idem sit cum *Paltifera*, ut est verisimile (& sic ipse existimat) holo tamen non potest esse non diversam, quoniam ista quoque in medio pulpa habet Officulum majusculum quoad formam, fructus haud ab simile. At huc quæritur. Arbor quæcunque butyraceo fructu, *Hernand. fol. 89.* si Author plures nudos nucleos intra fructus substantiam illi non attribueret, putarem equidem eandem esse Arborescentem, & ab hujus foliorum odore aromatico facile adducimus conjectare eandem quoque esse cum *Persea* arbore *Clusij*, quæ interdum ab *Hesperio* *Mammy* quoque nuncupatur, ut ex *Clusio* ipso & *Jo. Bauhino Dendrolog.* 96. didicimus; sed necesse est ut tum ab ipsa *Paltifera* tum ab *Agave* ob rationes supra allatas sit aliena. Quæcumque postrema quoque fructum generatim crassum, & corticali tegumento obductum ideoque abedendum maxime indonatum. Adeo profecto ut non tam in hoc quam in eo decipitur *Storax* quod utique intelligens hanc, is inter-
rim, cum Synonymiis hæbit obtrudat aliam ab ipsa maxime diversam, errore nimis crasso, & ipsi quidem in hoc Opere nimis frequenti.

Ibid. ad lin. 16.

Noster autem est cuticula densa coriacea mollis, imperreginus fructus crassus in quo magnus nucleus. *J.B. Tom. 1. 398.* An *Malus Persea* maxim. foliis rotundioribus splendens glabris, fructu maximo scabro rugoso subrotundo pulpa dura sublutea unum vel plura officula filamentosa cingente, *Cat. Jam. 179.* Noster tamen officula non filamentosa, nec in filamentosis tegumentis sunt conclusa. Subsequentis sane Arboris fructus Officula ita se habent.

Fol.

M A N T I S S A.

Fol. 39. ad lin. 18.

Vid. *Gulielm. Dampier Orb. Circumnavigat. pag. 204.*

Ibid. ad lin. 26. post 488.

Nux I. Officulum Cypote simile Nuci Balsami, *Perviani JB. Tom. 1. 294. Cox-*
cocypote Clus. exor. lib. 2. cap. 18. fol. 44. Malus Persica maxima foliis magnis
integr. longis, fructu max. oblongo scabro, officulo partim rugoso partim
glabro, Car. Jam. 181. An Fructus reticulato corio, Bahl. Bessler. Fascicul. An
hic vero ad Odallam potius sit referendus.

Ibid. ad lin. 40.

Huic etiam ut mihi videtur plurimum convenit *Cochitzapoti* f. *Tzapoti Tomai-*
fera, Hernandez apud Recc. 89. ab Hispanis Asbarzapoti. nuncupata.

Ibid. ad lin. 43. post 294. adde.

An hujus Officulum sit Fructus Amygdaloides nitidus peregrinus *eiusd. JB. ibid.*
fol. 292. An fortè Castaneæ specie fructus peregrinus eiusd. Tom. 1. lib. 7. 129.

Fol. 40. ad lin. 2.

Fortè etiam Fructus oblongus fuscus splendens, *CBP. 406. Fructus i. Simonis*
Tewar. Coxco Cypote (i. e.) Nux sive Officulum Cypote, Clus. exor. lib. 2.
cap. 18.

Ibid. ad lin. 8.

An fortè *Sambaucaie Brasiliensis*, *JB. Tom. 1. 385. Cacao Gerard. emac. Sloan.*
Car. Jam. 134. ubi more suo querendum proponit an sit Nux Portoricensis am-
plissimis foliis venosis & lætè virentibus Pluken. Tab. 208. fig. 2. cui vel in foliis
ne minima quidem intercedit similitudo.

Ibid. ad lin. 32.

An *Mesilus Curassavica vulgo, PBP. 312.*

Ibid. ad lin. ult.

Arbor fortè *Canellifera* sylvestris ex *Syrinama* folio pragranti, *Breyh. Prodr. 2. 18.*
Cujus folia cum aliis quamplurimis reticatis plantis Surinamensibus adhuc incog-
nitis (si bene meminit) Autor accepit à Nobiliss. D. Philippo de Plines rerum Bo-
tanicarum Estimatore insigni.

Fol. 41. post lin. 3.

ARBOR *Maderasspatana* *Lapathi* sanguines cerè foliis corymbosa, *Pautanchedde*
Malabarorum.

Arbor baccifera *Indica* *Lauri* subrotundo folio flosculis numerosis ad *Lichenis* pe-
træi stellata capitula prope accedentibus Contraumchidde Malabaror. Huic persi-
mile est Vanamairam Malabareis dictum & forte Idem. Arbor Indica baccifera
Lauri foliis corymbosa, *Perin-panel* (fortè *Hort. Malab. Part. 5. Tab. 15. Ar-*
boris enim hujus flosculi, cum formâ tum colore & magnitudine haud absimiles
sunt floribus nostris, propterea ramen eandem esse Arborem affirmare nequeo.

Arbor Indica baccifera *Lauri* pallidioribus foliis tetraphylla, floribus spicatis. *Toul-*
cute Malabarorum.

Arbor baccifera *Abutili* foliis lanugine ferruginea villosis, *Punnanganarre Malabar.*
An fortè Peragu, Hort. Malab. Part. 2. fig. 25. Hujus enim baccæ calyce am-
plo membranaceo excipiuntur.

Arbor *Indica* procerâ Cucurbitæ foliis fructu oblongo quadrangulâri. Mallecarresh?
Malabaror. Herbaceam autem hanc plantam nobis esse videtur.

Fol. 41. ad lin. 10.

Punnamaram *Malabareu*, hujus fructus Pruna *Damascena* par. ex quo exprimunt
 Oleum ad Rheumaticos dolores valde proficuum.

Ibid. ad lin. 12.

Carcapuli forte) *Itaschotani* fructu dulci rotundo, Cerasi magnitudine. Kanna
 Ghoraka (i. e.) Ghoraka dulcis *Cingalensis* dicta; quod *Casparus Baubinus* in
Pinar. cum Carcapuli *Acoſtæ*, fructu Mali aureæ æmulo, perperam confundit; ut
 videre est in *Hort. Malab. Part. 1. fol. 42. Not. in Coddampulli.*

Arbor *Indica* Lauri amplioribus foliis obtusis, & regione binis, floribus Jasmini, sum-
 mo ramulo umbellatim positus, ex *Insula Johanna. Tsjovanni Amelpodi, H. Malab.*
Part. 6. Tab. 47. Huic arbori propius accedere videtur.

Ibid. ad lin. 16.

Cujus Umbones postquam decidunt petala, baccis plurimis Ovali forma sunt
 eleganter circumcincti. Jabotapitz *Brasilienſis* in modum ut videſis apud *Piſanen.*
 166. Tirnamapollee *Malabarorum*, & interdum Paulemaram eorund.

Ibid. ad lin. 39.

Ramos enim proceris incrementis extendit, ij fila quædam tenuia demittunt,
 quæ terre contactu radices item generant in aliarum arborum perpetuam seriem
 fabule non minus quam multiplici. Enſenda *Ficus Indica* modo nascens, JB.
Tom. 1. 147.

Ibid. ad lin. 41.

Hujus arboris ni fallor meminit etiam *Antonius Pigafetta* in suo *Itinerar.* ubi refert
Insula Tidore feminas pudenda tegere panno & libro arboris hac ratione confecto;
 Delibratur cortex & aqua maceratus donec mollescat, ligno runditur, atque qua-
 libet longitudine ac latitudine diducitur adeo tenuiter, ut sericei veli instar, ve-
 nis transversim discurrentibus contextus videatur. Laurifolia arbor folio latiore
 longo mucronato laevi splendente, cortice interiore in telas plurimas linearum æ-
 mulas extensili, *Car. Jam. 137.*

Fol. 42. ad lin. 2.

An *Laurocerasi* folio arbor, JB. *Tom. 1. lib. 4. 421.*

Ibid. post lin. 2.

Arbor *Indica* cujus folia sunt Lauri *Aldina* similia, apicibus rotundioribus retusis ac
 magis venosa fructu Amygdali, ex hujus nucleis Oleum exprimitur ad varios
 usus. Elippemaram *Malabaror.* ad *Copaibam Brasilienſum Piſonis* accedere vide-
 tur. Est tamen Nuci-prunifera.

Ibid. post lin. 2.

Arbor *Indica* Cerasi laurinae foliis, flore albo fructu Piniformi, à *D. Jacobo Coning-*
ham in India Orientali observata. Lici, (forte) arbor *Sinenſis Mich. Boym. Flor.*
Sinenſ. cujus folia Cerasi laurinae sunt persimilia fructus cordiformis glandis mag-
 nitudine, squamosa cortice. Piniferae arboris fructum refert qui sapit fraga &
 uvas, sic vide Iconem apud *Joſſonum Dendrol. Tab. 136.* Est arbor nucifera ut su-
 spicari licet ex *Descriptione apud Ogilv. Chin. Tom. 1. 263.*, nec non *Tom. 2.*

Fol. 42. ad lin. 6.

Ahona foliis subtus ferrugineis, fructu rotundo majore, lavi purpureo, semine nigro partim rugoso partim glabro, Cat. Jam. 206. Mespili (forte) quarum fructus nostrates mole superant, Laetii lib. 17. cap. 13. 644. An Mespilus folio laurino ex *Siriuoma* Cammelin. Cat. Amst. 232. *Ibid.* post lin. 6.
Arbor Indica baccifera Laurinis lucentibus foliis ex Oris Coremandel. Malecungee Malabarorum.

Ibid. ad lin. 14.

Sub nomine Balanqas habuit idem Casparus.

Ibid. ad lin. 15.

Arbor Indica pallidioribus foliis, fructu conoide ex magno calyce emergente. Cautmogullamaram Malabarorum. Hujus flores sunt odore fragrantissimi. Elongi forte Hort. Malab. Part. 1. Tab. 20. quam tamen à Kauki Indorum Breynii plane diversam esse agnoscimus.

Ibid. post lin. 17.

Arbor Laurifolia Indica, fructu ad caulem racemoso, Oleæ magnitudine & formâ villoso, seminibus Anonæ nucleorum æmulis referto.

Ibid. ad lin. 20.

Tetrane Malabarorum.

Ibid. ad lin. 23.

An Quauhilepatli seu Arbor ignea, Hernandez apud Recc. fol. 67.

Ibid. ad lin. 32.

Balsami novi fructu racemoso folium, apud J. Baubin. Tom. 1. 297. ad vivum expressum à nostrâ haud multum abhorret, ut & Balsami folium, Hist. Long. lib. 18. fol. 1775.

Ibid. ad lin. 34.

An forte Tilia arbor racemosa folio longiori subtus albicante nervis purpureis insignito, flore pentapetalo purpureo, Cat. Jam. 135. Yerva Mora ab Hispanis quoque dicitur Solanum baccis rubris & aureis; Ipsum tamen Solani ethymon ob quandam in quibusd. partibus similitudinem longè pluribus iisque diversissimis stirpium generibus ab eodem Populo imponi consuevit: Affinitas ergo formæ & coloris baccarum eò forsân Hispanos Canarienses induxit, ut hujus Arbuseulam Yerva Mora (i.e.) Solani titulo insigniverint.

Ibid. ad lin. ult.

Venaungoo Malabarorum.

Fol. 43. ad lin. 2.

An potius Scherunam Cottam ejusd. Hort. Malab. Part. 2. fig. 16. Corni f. Sorbi species Javanica Bontij lib. 6. cap. 12.

Ibid. post lin. 7.

Arbor Indica longis mucronatis integris foliis, fructu albicante Nucis Palmæ Indel dictæ æmulo; Ashogamaram Malabarorum, an forte Asjogam, Hort. Malabar. Part. 5. Tab. 59. cui bina sunt ex adverso folia perinde ac in nostrâ.

Fol.

Fol. 43. post lin. 9.

Arbor ~~Indica~~ Ovali folio floribus plurimis in spicis summo ramulo dispositis acinifera, Pulicheerum Malabarorum. Forte Tsjerum Cotam, Hort. Malabar. Part. 5. Tab. 11. Quæ ad cæteras Cotam species, Part. 1. Tab. 56. & Part. 2. Tab. 16. ut dicit Commelinus merito refertur, estque cætera illarum ut Notæ genericæ indicant; Omnes namque humiles sunt Arbusculæ bacciferae flore pentapetalo.

Arbuscula corymbosa Ind. Or. folio semè Ovali figura. Sirrunarvenne Malabaror. hujus folia Sida-pou, Hort. Malab. Part. 6. Tab. 59. foliis haud dissimilia videntur.

Arbuscula Americana baccifera floribus comosis & foliorum Tremæ Brasiliensium æmulis, in Vitis Idæa ex Terra Mariana, an Sorbi vel Meruli species Americana? Eadem forte cum Tremæ Pijonis vel Tremæ Brasiliensibus Marteg. 81. quædam figuram.

Arbuscula baccifera Asclepiadis folio fructu Tilie tetragono. Chermurte Malabarorum hujus fructui Pec-Tsjerou pomagant, Hort. Malab. Part. 5. Tab. 23. fructus haud multum absimilis.

Arbor rosca Styracis folio Africani ter Rhine Brey. Fasc. 19. Arbor rosca folio inferne incano ejusd. Cent. 179. Hæc autem planta ut ex ramulo cum flore minùs ramèn curiosè asservato mihi viro, conjectatè inter Cistorum genera, militari meretur.

Ibid. ad lin. 13.

Hanc quandam affinitatem cum Acere habere velit Dr. Sloan in Cat. suo Jam. 138. ubi sub nomine Aceri vel Pædaci amnis angusto oblongo Ligustico, flore tetrapetalo herbaceo dubium movere. An sit? Arbuscula viscosa nostra, cum jure merito ad Acer minus fructu orbiculari, &c. Brey. in Almagest. cum Synonymiis memoratum, fol. 7. ista sit referenda, cui tam propè accedit ut eandem esse nobis videtur, sicut & ipse facit; sed ab Arbuscula nostra viscosa de qua questio nunc agitur maxime diversam; si ramèn quod res est tateri necat suspicamur non bene notam Sloan hanc nostram Arbusculam; pluribus etiam argumentis hoc loco si res exigit ostenderem D. Sloan alteram ab altera nescivisse distinguere.

Fol. 44. post lin. 2.

Arbor baccifera Barbadiensis Morifolia simplici officulo magno eodède striato, polycarpus, sive multiplici nucleo parvo. Quilibet tamen, ab Insulis nostratibus nuncupatur, an Cumana arbor dicta Laetii Ind. Occid. lib. 18. cap. 4. Gacirma Nierembergij lib. 14. cap. 5.

Ibid. post lin. 7.

Arbor Indica Fagi amplioribus foliis densis, fructu Anona æmulis. Sumtrapoonne Malabarorum. Hujus arboris folia mirabiliter flatus discuntur, & optimum hiscæ regionibus exstat Carminativum.

Ibid. post lin. 11.

Arbor baccifera Ind. Or. flicis subernerae foliis fructu caryocato, calycibus intus azureo tinctis.

Arbor baccifera Althææ foliis parvis subrotundis Ind. Orient. Chaddache Malabar. An Tindæ parvæ species minor Malabarica.

Arbuscula

Arbusecula Africana tricapsularis Anonidis Vernæ folio singulari flosculis oblongis pentapetalis luteis calyce magno bullato villis obsito exceptis, summo ramulo confertim nascentibus. Hujus capsulae seminales Sisynchij parvi sunt æmulæ, in quibus semina parva nigro-splendentia Anonidum more deliquium patientia, plurima intra parietes continentur. In Horto exoticar. Scirpium instructissimo, D. D. Uvedale apud Esfeldiam lætè virentem conspeximus. Hanc Arbuseculam (sui generis) & maxime sibi peculiarem, Chamæcistum, cap. B. 8. folio crispo Chamædryos, Novitius quidam è nostratibus satis iniquè denominat; Undè patet quam non æquam viribus suis materiam suscepit, licet Virtuosorum albo inscriptus erat, cum de Plantis exoticis conscribere aggressus est. Hermannia ut dicitur à Tyrastortie denominatur.

Fol. 44. post lin. 37.

Arbusecula Mariana Aceris Virginianæ folio baccifera, ossiculis singulari striato compresso, apud Collectaneas amici nostri D. Jacobi Ayre.

Ibid. ad lin. 6.

Cummala Malabarorum.

Ibid. ad lin. 12.

Arbusecula enim in secundo Canonu ait Scitaragi ille qui est Indus habet ligna parva subtilia, & cortices sicut Caryophylli. Scitaragi vero secundum Johannem Jacobi de Munliu in Explanat. Herbar. apud Othoneum Brunfelsium fol. 168. est Species Nasturtij, & quoad Simonem Jannensem ex autoritate Pauli Iberis, quam Lepidium alii Agriocardamon appellant est legitima Scitaragi: Hinc patet duas fuisse apud Arabes hujus nominis Plantarum species.

Ibid. ad lin. 19. quæ sequuntur verba.

Fortè etiam Avellana pargatrix, & Ben Memoris cap. 7. omnino deleantur.

Ibid. post lin. 19.

Arbusecula Mariana Pruni sylvestris longioribus alternis foliis lætè virentibus flosculis plurimis ad foliorum alas oriundis, an Frutex anonymos quintus, Marceg. lib. 2. cap. 15.

Ibid. ad lin. 19.

Anona foliis laurinis glabris viridi-fuscis fructu minore rotundo viridi flavo scabro, seminibus fuscis splendentibus, fissura alba notatis; Cas. Jam. 206. additur Laurinis (fortè) à similitudine aliqua in foliis; quam vix assequor.

Ibid. ad lin. 33. post alatu add.

Terebinthinis foliis.

Ibid. ad lin. 36.

Nostra enim est arbor baccifera cujus fructus sunt Hedera trifoliz. *Camdensis* Cornuti baccis hæud absimiles. Arbor (fortè) peregrina *Roma*, in quodam Horto *Columnensi* similes *Rhoi*, foliis lacte manantibus *Andr. Casalpini* in append. ad libras de Plantis. Huic (fortè) accenseri meretur *Quarxioni*, *Nov. Hispania* *Hernandez* apud *Recc.* 406.

Ibid. post lin. 39.

Arbor *Africana* foliis Arburi Spitzæ floribus in spicam densiorem adactis, Madam fortè præcedenti. Huic maxime conveniret *Pongolam*, *Flor. Malab. Ray.* si folia essent ex adversifolia.

Fol.

Fol. 45. ad lin. 40. post 1636. add.

Phytograph. Tab. 141. fig. 4.

Ibid. post lin. ult.

Arbor *Sirinamensis* Lauri densioribus foliis, media costâ per longitudinem tuberculis veluti perforatis conspicuâ. Amelpodi (fortè) Hort. Malab. Part. 5. Tab. 51.

Arbor *Indica* *argentea* floribus umbellatis tetrapetalis Raj. Hist. Pl. 1787.

Fol. 46. ad lin. 3.

Qui dubium mover, an sit? Kanelli itti Canni, Hort. Malab. Part. 10. in Mus. pag. 8. At hæc Kanelli est herba parasitica super ramos Arboris Kasjan repens in *India Orientali*. Ista vero non item; Caushachedde à *Malabareis* nuncupatur & aliquando Caciachedde ejus folia ad colorem rubrum inficiendum tinctoribus inserviunt, cui flos viride-cæruleus, bacca parva rotunda, vivaci viridi colore, eleganter coronata, & si bene memini monopolyrena, cum spinula longa ad apicem donata.

Ibid. post lin. 3.

Arbor *Indica* baccifera. Ligustri foliis densioribus & firmioribus, fructu ovali. Pungalu *Malabarorum*, an hæc sit rectius Kanneli-Itti Canni, Hort. Malab. Part. 10. Tab. 5.

Ibid. ad lin. 9.

Deleantur fortè & quæ sequuntur verba.

Ibid. ad lin. 25. post levantes adde.

Coca *Ferviana* *Hernandez* apud Recc. 392. Arbusta pro Numinibus habita, *Macocæ* vocata (hoc est) Matres Cocæ f. Dec. Cocæ *Nieremberg*. fol. 304.

Fol. 46. post lin. 27.

Arbor *Indica* *Euonymi* brevioribus foliis, floribus ad stipitem racemosis. Cungee *Malabarorum*, an fortè Tsjerou Kanneli, Hort. Mal. Part. 5. Tab. 50.

Arbuscula *Mariana* brevioribus *Euonymi* foliis pallide virentibus, floribus Arbutis ex eodem nodo plurimis, spicam uno versu prorumpentibus. An sit Myrtilli f. *Vitis Idææ* species *Americana*, flore majori.

Ibid. ad lin. 36.

Fortè etiam *Amazquilis* *Novæ Hispaniæ* *Terentij* apud Recc. 350. An Myrtifolio arbor cortice argenteo foliis oblongis ad basin latioribus acuminatis inodoris ex adverso sitis, flore pentapetaloide pallide albicante, Cat. Jam. 162. an Arbor *Brasiliana* Myrti lauræ foliis inodoris, Hort. Med. Amst. cap. 89. cum Icone.

Ibid. ad lin. 38.

An Myrtifolio arbor foliis longissimis inodoris, Cat. Jam. 162. An Arbor *Americana* Myrti *Boeticæ* latifoliæ facie aromatica. An *Lauro affinis* *Terebinthi* folio alato, ligno odorato candido, flore albo, Cat. Jam. 137. An Myrto affinis arbor foliis laurinis flore albo tetrapetalo odorato ejusd. 162. Hujus exemplar à D. *Samuele Doodoio* nos accepimus.

Arbor *Americana* Myrtiformis foliis graveolens. An Arbor ex *Sirinama* f. *Americana* Myrti lauræ foliis, Elemi resinam fundens, *Brayn. Prodr.* 2. 180. An Arbor baccifera Myrtifolia in ramulorum cymis fructu racemoso cæruleo. *Carriwaopulle* *Malabarorum*. Tota planta aromatica est, & Uva sapore acris Piperis.

E

Fortè

Fortè Frutex *Myrsine* sive *Annonum Mali panicæ* foliis apud *Plinium. lib. 12. cap. 13.* & *Piperella* dici mereatur. Fortè etiam *Oxymyrine Serapionis* qui as-
firmaverit *Oxymyrinam* esse Arborem ferentem fructum qui apud *Arabes* Cu-
bebo vocatur; ab *Oxymyrine Græcorum* quæ latine *Ruscus*, vulgo autem etiam à
Medicis, *Brosus* appellatur, ex quo *Plinij* temporibus, sicut hodie quoque fiebant
ruri *Scopæ*, plurimum diversa est.

Arbor *Indica* Pruni sylvestris folio, Corni maris fructu longiore, cujus lignum San-
talum nigrum ab *Indigenis* habetur. Davadarre *Malabar. vid. Santalum nigrum.*

Arboscula *Indica* Buxifolio baccifera, ex alis foliorum sigillatim fructum edens. E-
rembillee *Malabarorum.* Hujus baccæ sunt & calyculatæ, & coronatæ, rotundæ
fusæ.

Arbor baccifera *Biti Malabarica* foliis majoribus, averſa parte molli hirsutis pube-
ſcentibus. Taxi fructu duro glandiformi, vel fructu parvo, calyce membranaceo
integro propemodum immerso. *Percwoondel Malabarorum.* Ex foliis arboris
placentulas conficere norunt *Indigenæ* quas in eduliis habent, fructus quoque istis
cibo sunt, quæ causa est ob quam diligenter excoluntur, cujus exemplar nos adhuc
ſervamus in *Herbario nostro urbo*, inter hæc allatas *Raritates Indicas.*

Fol. 46. post lin. 40.

Arbor quinquifolia & heptaphylla frondosa, ex *Terrâ Marianâ.* An de *Mespilo-*
rum genere necne. Fortè *Mamanga Brasiliensis* *Marogr. fol. 183.*

Fol. 47. post lin. 31.

Arboscula *Mariæna* Ligustri foliis ternis circa caulem ambientibus, floribus pluri-
mis ad Ortus foliorum amoene purpureis.

Ibid. ad lin. 33.

Punahidde Malabarica dicta & interdum *Purnaval.*

Ibid. ad lin. 36.

An *Iperoba Brasiliensis* *Marogr. lib. 3. 97.* Baccifera trifolia racemosa, flosculis
allatis tetrapetalis, fructu nigro monopolyreno fetido, *Cat. Jam. 170.*

Ibid. ad lin. 38.

An forte *Pavate Acostæ. Hist. Lugd. lib. 18. 1863.*

Fol. 48. ad lin. 5.

Baccifera *Indica* trifolia, fructu rotundo monopolyreno, *Raij. Cat. Jam. 170.*

Ibid. ad lin. 7.

Black with. à *Colonis* nostratibus illis degentibus nominatur; hujus Fructus
tetrapyrepe lignosus, suis cum calyculis à *Promontorio Bon. Spei* sub titulo *Piens-*
jale ad nos aliquando allatus est, & à fructu *Nirnorsjil, Hort. Malab. Part 5.*

Tab. 49. quædam formam externam haud multum abhudere videtur. An forte
Tsjera Teka, Hort. Mal. Part. 4. Tab. 29.

Ibid. post lin. 15.

Arboscula claviculara *Petiplocæ* foliis heptaphyllos, ex *Insula Johanna.* An *Acer-*
ſcandens minus *Apocyni* facie, folio subrotundo, *Cat. Jam. 138.*

Ibid. ad lin. 17.

Fortè *Cacasponton Nova Hispan. Hernandez. apud Reco. fol. 69.* An *Pruno* (forte)
affinis arbor, folio alaro, flore herbaceo pentapetalo racemoso, *Cat. Jam. 182.*

Fol.

Fol. 48. post lin. 17.

Arbuseula Convolvulacea Salicis odorata latioribus foliis, *Provincia Mariana.**Ibid. ad lin. 19.*

An Arbor maxima (forte) Prunifera, cortice cannabino, folio longissimo latissimoque. *The Broad-leaf Tree, Cat. Jam. 184.* Huic nostrae haud multum dissimilis est Nalugu, *Hort. Malab. Part. 2. fig. 26.* & forte sit eadem.

Ibid. post lin. 20.

Arbuseula baccifera circumplexatilis virgineo folio subtus lanato, fructu racemoso fervidiore odore. *Perreaurulla Malabarorum.* Amomum (forte) legitimum Vitis albae folio *Dioscoridis lib. 10. cap. 14.* Amomum arborem foliis *Bryoniae* floribus Violae pingit *Castor Durantes* sed quid sit cum *C. Bashino*, & nos ignoramus.

Arbuseula baccifera scandens spinosa foliis Buxi pallidioribus. *Coodemoocatarre Malabarorum.*

Arbuseula amplexicaulis Ligustri foliis siliquifera, longe lateque se spargens. *Ponelleechedde Malabarorum.*

Fol. 49. ad lin. 28.

Huc forte spectat Iztacpatli *Quizalopin, Nova Hispan. Terentii apud Recc. 381.*

ARISTOLOCHIA *Indiana minor.* *Ardanapalle Malabarorum,* forte *Clematidis* species, sed a priori diversa.

Aristolochia Clematidis Mexicana, radice longa crassa, fructu triangulari sulcato.

Phehuame Michuacanensium Hernandez apud Recc. 162.

Ibid. ad lin. 34.

Hanc autem & proximè subsequentem esse revera de Aristolochiarum censu nunc sane dubitamus; Hujus valde similem sub titulo *Paatchurcha Malabarorum* ex *Ind. Or.* aliquando accepimus.

Ibid. ad lin. ult.

Virginiam nostram, pro natali solo sibi vendicat.

Fol. 50. ad lin. 8.

Hujus etiam varietas est major latifolia, ex *Aleppo.*

Ibid. ad lin. 21.

Masiapattree Malabarorum.

Ibid. ad lin. ult.

Prosp. Alpinus cum in *Aegypto* viderit in usum alimentorum frequentissime cedere hujus radicem, nimis erroneè *Colocastiam* esse pronunciat.

Fol. 51. post lin. 15.

ARUM *Americanum* foliorum auriculis magnis subrotundis ex *Insulis Caribaeis.* Huic forte spectat *Ni-tsjeribby, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 16.* *Arifurum* aquaticum cum pistillo rubro, pediculo, globulo adhaerente, *Commelin. Nor. Supr. loc.*

Fol. 51. ad lin. 21.

Arum minus esculentum *Sagittariae* foliis viridinigris, *Cat. Jam. 63.*

Arum minus. *Acetosa* folio ex *Insula Johanna.*

Arum Americanum latiori folio radice esculenta. *Arum Byzantinum* Clus. Hist. 2. 74.
Huic nostro optime convenit, an *Kaischucpenauk* radice alba *Ovirgallinacci* magnitudine & formâ, quâ elixâ vescuntur, *Harior*. CBP. 91.

Fol. 51. post lin. 27.

Arum majus palustre Aegyptiaci facie, radice arundinacea *Insula Johanne*. Idem fortè precedenti.

Arum Americanum scandens, pampineis foliis amplissimis, caule maculato. *Clematitis Malabaror.* foliis *Vicis*, colore *Dracunculi*, CBP. 301. Lignum colubrinum alterum *Acostæ* CBP. *ibid.* Hist. Lugd. 1911. *Park. Theatr.* 1665. *Colocasia hederacea* sterilis & laciniata *Plumier.* fol. 38. fig. 51. & 53. *Xalquaubiel* stipite punctato, *Hernandez apud Recc.* fol. 130. Huic congener est, si non idem. *Arum max.* altissimas scandens arbores foliis *Nymphææ* laciniatis, *Cat. Jam.* 63.

Ibid. post lin. 35.

Arum aquaticum minus, s. *Asifarum* fluitans pene nudo *Virginianum* D. *Banisteri*.

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum humilius, fructu & summitate caulis prodeunte, *Cat. Jam.* 45. Sed nihil præter spicam, cum *Pipere* commune habet.

Fol. 52. ad lin. 6.

Arum sive *Asifarum* *Marianum* triphyllum, *Zeylanica* *Breyn. Prodr.* 2. 90.

Ibid. post lin. 11.

Arum sive *Asifarum* *Marianum* triphyllum, flore striis purpureis elegantè virgato. Idem fortè cum precedenti. *Variat etiam* flore ex atro-purpureo; & interdum flore ex viridi albicante.

Ibid. ad lin. 36.

JB. Tom. 2. lib. 17. 404. Ut & *Manihot* foliis *Poeoniae*, *Part. 3. Amer. Epist. 2. de Bras.* quæ ad *Manihot Indorum* à *Casp. Baubino* refertur in *Pinac.* pag. 91.

Ibid. post lin. 36.

ARUNDO vallatoria *Ind. Or.* nostrati similis. *Peacaramboopu Malabarorum.*

Arundo vallatoria crassior & elatior *Ind. Orient.* *Corkipillu Malabarorum.*

Fol. 53. ad lin. 4. post arbor.

Tabaxir folio *Olezæ*, *JB. Tom. 1. lib. 8. 222.*

Ibid. post lin. 7.

Arundo arbor *Indica* procera, fructu *Sesami* in verticillas densius stipato, *Mungell Malabaror.* *Arundo Indica* *Ily* (*Hort. Malab. Part. 1.*) foliis & formâ, sed fructu diversa. *Mambu* vel *Bambu* altera species *Orientalis*. An *Noly-Ila*, *Hort. Malab. Part. 5. fol. 119.*

Fol. 54. ad lin. 7.

Tannemutancatunga Malabarorum.

Ibid. ad lin. 9.

Asparagus aculeatus Sarmentosus maximus tricoccus.

Ibid. post lin. 9.

ASPARAGUS aculeatus *Africanus* spinis aduncis ex *Promont. Bonæ Spei* à precedenti parum recedens.

Fol. 54. post lin. 24.

ASPERULA Americana radice bulbosa ex Provincia Carolina. An Neycoti-
lapatli, Nov. Hisp. Hernandez. apud Recc. 391.

Ibid. post lin. 33.

ASPHODELUS albus minor *Ethiopicus*, ex Prom. Bon. Spei.

Asphodelus minor albus ex Provincia Mariana.

Fol. 55. post lin. 7.

Asphodeli Indicae affinis floribus hexapetalis spicatis *Commelin.* Katu-Kapel; Hort.
Malabar. Part. II. Tab. 42.

Ibid. ad lin. 21.

An *Aster* folio oblongo integro incano, flore pallide caeruleo; Cat. Jam. 124.

Ibid. post lin. 29.

ASTER caeruleus ex Provincia Mariana quasi perfoliatus, floribus parvis spicatis.
Idem foliis minus acuminatis, summo caule, flore unico majori.

Ibid. ad lin. 32.

Huic fortè accenseri meretur *Aster* purpur. Americanus urens, s. Tzitziqui Mexi-
censis Hernandez apud Recc. 435.

Aster purpureus Americanus foliis tridentatis ex Carolina. Fortè Tlanpanxihuit,
Nov. Hispan. Terentii apud Recc. 426.

Fol. 56. post lin. 3.

Aster caeruleus polyanthos *Alypi* foliis incanis ex Terrâ Mariana.

Aster caeruleus *Pilosellæ* foliis *Marianus* floribus umbellatis.

Aster Marianus flore albo majore simplici, foliis magis mucronatis hirsutis pube-
scentibus.

Ibid. post lin. 12.

Aster Tripolii facie, crassius amplioribus foliis subtus incanis, ex Insula St. Helenâ.

Ibid. ad lin. 19. add.

Vid. *Phytograph.* Tab. 326. fig. 1.

Ibid. post lin. 29.

Aster Virginianus frutescens minor *ericoides* *Linariæ* folio, flore albo parvo, Breyn.
Prodr. 2. 21. ex Terr. Mariana.

Aster Cormandelienfis Virgæ aureæ foliis.

Ibid. post lin. 36.

Aster Marilandicus *Parmicæ* capitulis, flore albo, *Baccharidis Monspeliensis* folio,
& effigie.

Ibid. post lin. 39.

Aster Marianus *Parmicæ* capitulis, *Mezerai Arabum* folio latiori, flore caeruleo. Variat
etiam flore purp.

Aster Marianus flore albo *Parmicæ* capitulis, latiori folio rigescente, margine leni.

Aster Marianus *Parmicæ* capitulis, *Conyzzæ* albæ acris folio angusto splendente
glabro.

Aster Marianus *Parmicæ* capitulis, flore albo, foliis & facie *Bellidis Umbelliferæ*.

Aster maritimus fruticosus *Hyslopi* foliis confertis, flore albo ex Prom. Bon. Spei.

Aster Capiti Bon. Spei. *Elichrysi* folio lanuginoso, flore albo. An *Aster-Gnaphaloides*
flore albo, Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent. 179. à D. Stonestreet habuimus.

Fil.

Fol. 56. post lin. extrem.

Aster perexiguus ex *Insula Johanna*.

Fol. 57. post lin. 1.

Aster Virgineus Conyze mediz foliis, Bellidis ramosae Cornuti, floribus ferè umbellatis.

Ibid. post lin. 31.

Aster Marianus Majoranae foliis, flore luteo magno singulari.*Aster luteus* Polygalae foliis Africanus, ex Prem. Bon. Spei. An *Virga aurea* Afric. foliis Ericae bacciferae, Broyn. Fosc. 25. Fortè etiam *Virga aurea* Africana foliis Linariae minoribus ejusd. ibid.

Ibid. post lin. 33.

Aster luteus Marianus Saligneis brevioribus foliis hirsutis pubescentibus, summo caule ramosus.

Fol. 58. ad lin. 25. post Sapore add.

Vid. *Phytograph. Tab. 326. fig. 2.* *Aster luteus* Absinthites ex Prem. Bon. Spei.

Ibid. ad lin. 42.

Fortè Tezonpatli, Hernandez apud Recc. 193.

Ibid. post lin. 42.

ASTRAGALUS (fortè) Marianus, Apios Americanae floribus convolvulaceis, ternis tantum foliis perpetuo donatus.

Fol. 59. post lin. 39.

Astragalus Marianus angustioribus foliis, petiolis albis tumidiusculis, spicae florum densius stipata, a proximè præcedenti haud multum discedens.

Fol. 60. ad lin. 9.

An *Astragalus Dioscoridis* vulgò Christianae radix Rauwolf. Hist. Lugd. app. 26.

Ibid. ad lin. 19.

Pelecinus vulgaris, Turnesfortij Elem. Bot. 331.

Ibid. ad lin. 23.

Anonis maritima lenis rigidiusculo folio integro, altè crenato, Cupani H. Cath.

Fol. 62. post lin. 4.

AVENA major Belgarum, granis amplioribus albis.

Ibid. ad lin. 8.

Ad hoc genus Plantarum spectare videtur Coacivizpatli Mexicensis, s. Medicina doloris, Hernandez apud Recc. fol. 301.

Ibid. ad lin. 23.

The Bread Tree, sic dicta quia ejus fructus Sphaerularum precatoriarum usum præbet.

Ibid. ad lin. 27.

Mallewamboo Malabarorum & interdum Trucawcampavee. *Lufitanis* Margosa de maro.

Ibid. ad lin. 31.

Necrallagoc Malabarorum.

B

Fol. 63. ad lin. 33.

AN Yztac-Quauxiotl, seu Quauxiotl alba Galloptera, Hernandez apud
Reccm. 57.

Fol. 65. post lin. 10.

BELLIS *Ethiopica* Erucæ foliis incana Capit. Bon. Spel. Brey. Fasc. rarior. 19.

Ibid. post lin. 33.

Bellis *Americana* minor, Umbelliferæ affinis hirsutior, summo caule cærulescente
flore singulari.

Bellis *Africana* major surrecta, rigidioribus Agerati foliis, floribus fere umbellatis
parvis.

Fol. 66. ad lin. 4.

Matricaria Tanacetii folio, flore majore, semine umbilicato, Turnesortij Elem.
Botan. 394.

Ibid. ad lin. 8.

Matricaria Tanacetii folio, flore minore, Turnesortij Elem. Botan. ibidem.

Fol. 67. post lin. 1.

Berberidis affinis Mail-Ombi Malabarorum, Horr. Malab. Part. 5. Tab. 26.

Ibid. ad lin. 18.

Betonica montana lutea latifolia, Boccon. Museo Plantar. pag. 82. Tab. 72.

Ibid. ad lin. 23.

Sideritis *Canadensis* altissima, Scrophulariæ folio, Turnesortij, monente D. Preston.

Ibid. ad lin. 24. post venosus add.

Floribus luteis, summo caule in breviorē spicam glomeratis.

Ibid. ad lin. 25.

An **Althæa** spicata *Betonicæ* folio villosissimo, Cat. Jam. 97.

Ibid. ad lin. 27.

Fortè etiam **Althæa** spicata, *Betonicæ* folio villosa, spica breviori & laxiori ejusd.
Cat. Item **Althæa** spicata *Betonicæ* folio glabro, flore luteo, habitiori spica
ejusd. ibid. quæ nil nisi præcedentis varietas à nobis habetur, & non species
diversa.

Ibid. post lin. 27.

BETONICA arborefc. villosis foliis profundè venosis, floribus ex alis foliorum
glomeratis. Cheddecootan Malabarorum.

Ibid. ad lin. 34.

Fortè **Pië pã**, *Sinenfium* Andr. Cleyeri Medic. Simpl. Chinenfib. ustat. pag. 39.

Ibid. ad lin. 37.

Terebinthus major *Betulæ* cortice, fructu triangulari, Cat. Jam. 187. Ubi varia
miscuit Autor de quo hoc dicam. Si eam diligentiam operamque in vestigandis
Plantarum notionibus differentiisque impendisset, quam in emulandis Synonymiis ad-
hibuit.

hibuit, utilius profecto aliquid vitæ excogitasset, nec se, nec libellum suum tot & tam foedis erroribus inquinasset.

Fol. 68. post. lin. 14.

BLATTARIA Ceylanica flore amplo coccineo *H. Med. Amst. cum Icone. fol. 12. cap. 6.* At potiori jure, Alceis esse accensendam putant *Observationum Autores*, qua propter à *Cl. Breynio* Alcea Indica lucido hastato folio, flore Blattariae phæniceo ritè nuncupatur.

BLITUM f. Atriplex Pes anserinus dicta, latifolium majus spicatum, laceris laciniis. Atriplex sylvestris latifolia, *CBP. 119.* Atriplex dicta Pes anserinus, *JB. Tom. 2. 975.* Chenopodium pes anserinus primus, *Tabern. Icon. 427.*

Blitum f. Atriplex Pes anserinus dicta, laceris laciniis, latifolium minus spicatum. Blito Pes anserinus dicto similis, Atriplex vulgaris sinuata spicata, *D. Plot. Hist. Oxon. Raij. Synops. Stirp. Brit. 64.* Hanc quoque sapius ab *Ind. Or.* habuimus, & Saccaravettum Malabarorum nuncupatur, ubi benè cocta pro cibo utuntur. *Indigena.*

Blitum f. Atriplex Pes anserinus dicta procumbens, folio virente lucido crasso. Atriplex procumbens folio sinuato lucido crasso, *Morif. Hist. 2. & HRB. 26.*

Blitum f. Atriplex Pes anserinus dicta, laceris laciniis latifolium majus, semine racemoso. Atriplex dicta Pes anserinus alter f. ramosior, *JB. Tom. 2. 976.* Chenopodium Pes anserinus secundus, *Tabern. Icon. 428.*

Blitum f. Atriplex Pes anserinus dicta, Stramonij acutiore folio racemosum. Atriplex sylvestris latifolia, acutiore folio, *CBP. 119.*

Ibid. post. lin. 19.

Blitum Giganteum humisternum ex *Prom. Bon. Spei. in Hort. Med. Chelſeiano* enutritum conspeximus.

Ibid. ad lin. 26.

An Blitum minus album polyspermon folio subrotundo, *Car. Jam. 49.* Fortè Nexhoautli, *Mexicana Hernandez apud Recc. 269.*

Ibid. ad lin. 37. adde.

Lob. Adv. 453. Planta Pectitidis folio, *Cap. Bon. Spei. ten Rhine Breyn. Cent. 179.*

Blitum unctuosum perenne, foliis Ari modo alatis, *Bonus Henricus* vulgò, *Teta Boni Spinachia* facie *Lobelij*, &c.

Fol. 69. ad lin. 8.

An Kali fruticosum *Hispanicum* Tamarisci folio, *Turnesortij Elem. Bot. 213.* Et fortè præcedentes potiori jure ad genera Kali revocanda sunt.

Ibid. post. lin. 36.

BRASSICA sylvestris f. Turrilis Mariana Irionis *Afulæ* foliis, siliquis uno versu, longâ serie dependentibus.

Fol. 70. ad lin. 4.

An Turrilis pulchra nova, *D. Frederici Meyeri JB. Tom. 2. 837.*

Ibid. ad lin. 7.

Hesperidum inter species quoad *Turnesortium* adnumerari oportet, quia ad illarum profusam foliis, floribus, siliquis appropinquat, cum propriè loquendo, flore duntaxat Nasturtium referat.

Brassica

Fol. 70. post lin. 7.

Brassica alpina spuria minor Burfæ pastoris folio ex *Virginia*.

Ibid. post lin. 16.

Brassica spuria exilis ex *Terr. Marian* Bellidis minoris folio parvo non laciniato.

Ibid. post lin. 27.

BRUNELLA major *Mariana* flore amplo cæruleo. *Prunella* glabra flore cæruleo major *Banister* Cat. *Virg.* Eadem fortè cum præcedenti.

Ibid. ad lin. penult.

Prunella Lithospermi minoris atrovirenti folio, amethystino flore pulcherrimo, *Cupani Hort. Catholic.* 32. ubi Synonymia sunt malè adhibita.

Fol. 71. ad lin. 2.

An *Bryonia racemosa* foliis ficulneis, Cat. *Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 9.

Et à *Clarissimo Breynio*. Ubi supra.

Ibid. ad lin. 17.

(i.e.) *Radix Caroli Sancti* foliis *Lupuli*, *JB. Tom. 2. fol. 153.* *Carlo Santo Monardes*. An *Bryonia alba* geniculata *Violæ* foliis, baccis è vitidi purpureiscentibus, Cat. *Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 20.

Wild Potato-Slip, (i.e.) *Batata sylvestris* aliquando vocatur. An *Hatle* radix in *Florida* ex cujus farina in annonæ penuria, panis fit, *Part. 2. Amer. CBP.* 91.

Ibid. ad lin. 33.

An *Bryonia alba triphylla* maxima, Cat. *Jam.* 106.

Ibid. ad lin. 37.

Bryonia alba triphylla geniculata foliis crassis acidis, Cat. *Jam. ibid.* Ubi nimis ineptè querendum proponitur, an sit *Chamædrifolia* scandens claviculata & *Corymbifera* (corymbosa) *Jamaicens.* *Plukenet. Phytogr. Tab. 81.* Satis enim superque ex eo apparet Autorem nescivisse de quâ plantâ scriberet, ac quidem, per totum istum Catalogum peccatum est toties, & tam enormiter, in apponendis Plantar. Synonymiis, ut quod ibi primum inter legendum occurrerit, summam sapere videatur *Tyronis alicujus Oscitantiam*.

BRYONIAE nigra nervosis foliis, subtus cæsiis. *Virginiana*.

Bryonia Africana *Hederæ* folio parvo hispido.

Bryonia ferè foliis antagonistis, radice fibrosa *Caryophylli* odore, Planta convolvulacea *Carolinienfis* in *Hort. Gulielm. Darby* apud *Hocksdon* hanc peculiarem plantam excultam invenimus.

Ibid. ad lin. 39. post 192. add.

Chichiltic-Tepetlauchxochitl, *Hernandez* apud *Recc.* 368. Huic nostro quibusdam convenit, cæteris non.

Fol. 72. ad lin. 15.

Omphalodes pumila verna *Symphyti* folio, *Turnesfortij Elem. Bot.* 117.

BUGLOSSUM Africanum *Echij* folio, flore purpureo. An *Bugloss. Afric.* *Echij* folio *Breyn. Fasc.* *Echium Lycopis* facie *Africanum* erectum perenne, *PBP.* 332.

Buglossum Echiodes argenteum, floribus purpureis, ex *Promont. Bon. Spei.*

Buglossum

Buglossum Borriginis flore & facie *Æthiopicum*.

Fol. 73. ad lin. 5.

Et fortè Bugula Hungarica glabra, *Bocc. Mus. Pl. pag. 146. Tab. 112. & Tab. 129.*

Ibid. post lin. 7.

BUGULA Lusitanica odorata *Cornut. de Pl. Canad. cap. 20.*

Ibid. ad lin. 10.

Matricaria Pyrenaica Buphthalmi folio, *Turnesortij Elem. Bot. 394.*

Ibid. ad lin. 20. add.

Si hujus color aureus floris non repugnaret.

Ibid. post lin. 30.

BUPLEURUM Hispanicum frutesc. angustifol. *Sch. Bot. 24.*

Ibid. post lin. ult.

Bupleuri angustioribus & gramineis foliis, Planta umbellata flore rubro monopetaloides, calyci trigonali ex involucrio tomentoso prorumpente innato, cauliculis ad nodos villosis, *Præm. Bon. Spei. Hæc est illa Perfoliato angustifolio montano Cermææ similis Planta umbellifera nova, fructu triplici membranaceo, Cap. Bon. Spei. Breyn. Fascic. 25. & sub Graminis tomentosi pumili falso titulo exhibetur, in Phytograph. nostrâ Tab. 339. fig. 5.*

Fol. 74. ad lin. 10.

An Buxi folio majore acuminato Arbor baccifera, fructu minore, croceo dipyrreno, *Cat. Jam. 171.*

BUXIFOLIIS Frutex Africanus *D. ten Rhine Breyn. Fasc. 22.*

Ibid. ad lin. ult.

Quæ repetitur sub titulo Dauci Siculi Pastinacæ sativæ foliis, *fol. 129. Hujus Almagesti.*

C.

Fol. 75. ad lin. 2.

ET multo accuratius, *Phytograph. Tab. 326. fig. 4. Mespilus Americana Alni vel Coryli foliis, fructu mucaginoso albo, Hort. Med. Amst. cum Icone. cap. 80.*

Ibid. ad lin. 3. post 319. add.

Vid. *Phytograph. Tab. 326. fig. 5. An le Cormier D. Rochfort Histoire des Antilles 59. Sorbi species? Mespilus Americana Laurifolia glabra fructu rubro mucilaginoso, Hort. Med. Amst. cum Icone. cap. 79. Maximo in errore de hac plantâ versatus fui, vel nominum similitudine deceptus; Quapropter deleantur cætera hujus Paragraphiæ hoc loco, & quæ sequuntur verba. An fortè Samaca, JB. & transferantur ad Almag. Bot. append. fol. 399. ad finem lin. 7.*

Ibid. ad lin. 17.

Clinopodium perenne Pulegii odore, *Bocc. Mus. Pl. pag. 60. Tab. 45.*

Fol.

Fol. 75. ad lin. 20.

Mentha Cataria Hispanica olim mihi *Sideritis* altissima flore subcaeruleo & albo, JB. Tom. 3. 226. *Cataria Hispanica* *Betonica* folio angustiori, *Turnefortii*. Elem. Bot. 17. An *Nepertha montana* purpurea major sparsa spica, *Boccon. Mus. Pl. Tab. 36.*

Ibid. post lin. 20.

CALAMINTHA *Mariana* mucronatis rigidioribus & crenatis foliis, flosculorum calyceulis villis argenteis summo margine fimbriatis *Dittam*, (i. e.) *Dittamnus* vulgò vocatur. *Chamaedrys verna* odoratissima, *Barbist. Cat. Mss.* ab hac haud multum discedit.

Ibid. ad lin. 27.

Hujus datur & altera species, aut saltem varietas grandiuscula procumbens & omnino prostrata.

CALENDULA *Africana* surrecta *Roris marini* foliis ex *Prom. Bon. Spei.*

Calendula humilis Africana *Coronopi* foliis hirsutis.

Calendula Africana procumbens, *Hyoseridis* angustissimo folio glabro, seminibus *Tordylii* amplissimis. An *Calendula Afric.* fructu compresso rotundo max.

Breyn. Prodr. 2. 24.

Calendula affinis folio *Cotulae Africanae*.

Fol. 76. ad lin. 2.

An *Atlinam* circinata, *Hernandez apud Recc. 286.*

Ibid. ad lin. 31.

Huc forsitan accenseri meretur *Tlallaala*, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc. 419.*

Ibid. post lin. 35.

CANPANULA f. *Rapunculus nemorosus caeruleus* *Lamij* folio, floribus spicatis minimis ex *Provincia Mariana*.

Fol. 77. ad lin. 9.

Convolvulus saxatilis erectus villosus perennis, flore ex albo purpureo, *Hispan. Boccon. Mus. Pl. rarior. pag. 79. Tab. 70.* *Convolvulus rectus* villosus argenteus angustissimo folio ejusd. pag. 138. Tab. 96.

Fol. 77. post lin. 33.

Campanula laevis, sive *Rapunculus Pyramidalis minor*, folio magis acuminato ex *Virginia*,

Fol. 78. ad lin. 14.

Huc forte spectat *Mimiyca Huatzin*, *Novae Hispan. Terentij apud Recc. 387.*

Ibid. ad lin. 20.

Ad hoc genus referri potest *Mihuiyctilmoyoye-Cuitlatonpit-Zochitl*, *Novae Hispan. Hernandez apud Recc. 388.*

Ibid. post lin. 30.

Campanula spicata minima flosculis elegantissime rubris, longo tubulo donatis, *Prom. Bon. Spei. à D. Stonestreet habuimus.*

Fol. 79. ad lin. 15. post 25. add.

Euphrasia frutescens *Coridis* folio, flore albo spicato, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 46.* *Coridi* similis planta, *Capit. Bon. Spei. flore odorato ejusdem Prodr. 1.*

F 2

Fol.

Fol. 79. ad lin. 20.

Daphnoides (forte) sive *Ifocinnamon*, *Plinij Hist. Nat. lib. 12. cap. 20* *Pim-*
piu Sinenfium Cleyeri. de Simplic. Medicam. Chinenf. pag. 45.

Ibid. ad lin. 25.

Le Balifier de Rochfort, Hist. des Antilles 114.

Ibid. ad lin. 29.

Petits Balifiers de fleurs rouges du Tèrrè 126.

Ibid. ad lin. 39.

Hanc autem *Arum* esse velit *D. Sloan*, & forte ita sit; à quo nominatur *Arum* caule geniculato *Cannæ Indicæ* foliis, summis labris degustantes mutos reddens, *Cat. Jam. 63.* *Cannæ* ad ripas fluminis *Caurivo* *Sacchari Cannis* similes *Veneno-*
ke, & linguam supra modum instantes, & loquendi facultatem impediētes, *Laët. fol. 646.* At ab *Aro* caulescente *Cannæ Indicæ* foliis *Plumier* diversam esse putamus.

Fol. 80. ad lin. 2. post 14. add.

Item *Clematidis Indica* septima sive *Radix* quædam in *Malaca* quæ adversus *Vul-*
nera sagittis toxico illius facta, præsentaneum remedium est *Garcias, ejusd. CBP.*
301. Cur autem (inquit frater) non ostendit ob quam causam Radicem hanc ad
Clematididem referat: *Indicare* debebat si *Clematidis* sit appellanda; qua in par-
te aliquam cum eâ habet cognationem. *Radix Malaca* quædam toxicis sagittis
resistens, *JB. Tom. 2. 173.* *Canna Indica* radice alba alexipharmaca, *Cat. Jam.*
122.

Ibid. ad lin. 111.

An forte *Zinziberis* genus, sive *Cardamomi*. *Herb. Wiapossâ Part. 8. Ind. Oc-*
cid. fol. 108. CBP. 326. Idem est cum *Cardamomo* primo paginâ proximè sub-
sequente in *Almagesto*, ut mecum existimo.

Ibid. ad lin. 23.

Hujus Icon habetur in *Phytograph. Tab. 273. fig. 3.*

Ibid. post lin. 30.

● A P P A R I S *Orientalis* amplissimis subrotundis foliis. Adundee *Malabarorum*.
Capparis Indica spinosa angustiori *Salicis* folio. *Paulpronee Malabarorum*.
Capparis Indica spinosa folio minore subrotundo brevi. *Gentilibus Indis Nalauppa*,
à *Malabareis* autem *Mucotarre* nominata.

Ibid. ad lin. 35.

Muladundee Malabarorum. Huc forte spectat *Badukka*, *Hort. Malab. Part. 6.*
Tab. 57. *Capparis* arborescens *Indica* *Badukka* dicta flore tetrapetalo, *Raij.*
Hist. Pl. 1630.

Ibid. post lin. 37.

● C A R A M B O L A *Malabarorum* *Tamaratonga*, *Hort. Malab. Part. 3. Tab. 43. 44.*
Errat *Casparus Bauhinus* in *Pinac.* Ut rectè monet *Commelinus* quum *Carambolos*
vocat *Malâ Goensâ* fructu octangulâri, *Pomi vulgaris* magnitudine; seductus
nimirum illis, quæ de *Octangulâri* horum fructuum figura, malè refert *Lin-*
schotus.

Carambola parva Ind. Orientalis. *Billingbing Bontij lib. 4. cap. 42.* *Bilimbi Hort.*
Malab. Part. 3. Tab. 45. 46.

Fol.

Fol. 81. ad lin. 3.

Hæc Arbor ex quorundam sententia Gummi Gottæ copiose fundit.

Ibid. ad lin. 4. post minore add.

Cardamomum minus *Indianum* fructu in pediculo ad radicem racematim prodeunte. Cardamom. *Brazilian.* latifol. sylvestre Pacozeraco *Brazilienfis* dicta *P. sonis*, & *Marcgr.* 48. *Breyn. Prodr.* 2. 107.

Ibid. ad lin. 9. post longiore add.

Cardamomum *Indianum* majus fructu è summo caule spicatum prodeunte.

Ibid. ad lin. 12.

Mala-intschi-kua ejusd. *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 14. hæud male refert.

Ibid. post lin. 12.

CARDAMOMUM maximum *Ger. emac.* 1542. Melligette s. Cardamomum maximum & Grana *Paradisi Park. Theatr.* Grana *Paradisi Officinar.* cujus folia sub Melegueta in *Prodr.* descripsimus, *CBP.* 413.

Ibid. post lin. 27.

CARDIACA s. Leonuros *Insulæ Johanne Stachydis* folio crasso & incano, floribus albicantibus villosis.

Ibid. post lin. 30.

Cardiaca *Coromandeliana* *Lithospermum* angustioribus foliis, ex verticillis florum sobolifera.

Fol. 82. ad lin. 3. vel 4.

Pro voce annuus, lege *Africanus*.

Fol. 83. ad lin. 2.

An Carduus mollis alpinus foliis eleganter laciniatis, *Sch. Bot.* 214.

Ibid. post lin. 34.

CARDUO-cirsium *Aethiopicum* *Pulmonariae Gallicæ* rigidioribus foliis, capitulo singulari.

Ibid. post lin. 36.

Carduus *Virginianus* Cirsij foliis incanis, capitulo singulari.

Fol. 84. post lin. 6.

Carduus *Pyrenaicus* elegantissimus caule crispo, *Sch. Bot.* 214. in *Horto D. D. Uvedale* apud *Enfeldiam*, Anno 1697. sub finem Aestatis, floribus ornatum conspeximus.

Ibid. post lin. 11.

Carduus *Pycnopolycephalus* palustris alato caule, foliis ex una parte atrovirentibus ex opposita albidis, *Triumfetti*, *ibid.* in *Horto Chelseiano* ex seminibus a *D. Sherard* communicatis auspitiis *D. Doodey*, enutritum Observavimus.

Ibid. post lin. 21.

Carduus alatus lanceato angustiori folio ferocior ex *Insula Co.* An Carduus palustris altissimus lanceato folio ramosus, caule folioso spinosissimo, capitibus compactis, *Francisc. Cupan. Hort. Catholic.* 36.

Carduus lanceolatus *Provinciae Marianaë* folio subtus villosa, capite magno singulari.

Fol.

Fol. 84. ad lin. 31.

Carduus albis maculis notatus capitulis *Cirsij* vulgo: An potius *Carduo-cirsium* foliis instar *Silybi* obscure maculatis capitulo singulari.

Fol. 86. post lin. 10.

Carduus Lusitanicus capite araneosa lanugine obsito *Turnefortij*, ex dono laudati *Viri D. Preston* accepimus. Hæc est fortè *Carduus Solstitialis* major seminibus *Crupinæ Belgarum D. Bobart*, quam habuit à *Doctore Richardsono* ut nobis rescripsit.

Carduus Lusitanicus *Erucæ* folio *Turnefortij* in *HRH.* Cultum observavimus, & à *Jacca Sicula Cichorei* folio, flore luteo, capite spinoso *Boccon.* haud multum abhorret.

Ibid. ad lin. 29.

Hujus radice (ut creditur) sibi per somnum ostensa *Carolus Magnus Imperator* Exercitum pestiferam luc infectum sanavit, & inde nomen accepit.

Ibid. post lin. 32.

CARLINA angusto longo, & incano folio *Alpina Boccon. Museo Plantar. pag. 32. Tab. 14.*

Ibid. ad lin. 35. post *Comptoniano. add.*

Phytograph. Tab. 154. fig. 6.

Ibid. ad lin. 37.

Fortè *Attractylis Pyramidalis* multicaulis, capitulis cornucopoides, *Bocc. Musc. Plant. 112. Tab. 97.*

Ibid. post lin. 37.

Carlina Chrysanthemos Gaditana floribus ad caulium nodos spicatum emergentibus.

Ibid. post lin. 39.

Carlina sylvestris Æthiopica, vulgaris foliorum æmula, flore aureo, capite spinosiore.

Fol. 87. ad lin. 8.

Hujus Icon accuratissime exsculpta in *Parad. Batav. ad pag. 111. exhibetur.*

Ibid. ad lin. 10.

Caryophyllata foliis alatis, *Cat. Jam. 99.*

Ibid. ad lin. 24.

Caryophyllata alpina tenui folia incana longius radicata, *Bocc. Mus. Pl. pag. 160. Tab. 128.*

Ibid. ad lin. 30. post fig. 1. add.

Hæc autem revera est *Gladiolus* aut *Gladiolo* affinis *Caryophylloides Æthiopica* foliis cavis, flore cæruleo, cauliculis secundum longitudinem alatis. An *Gladiolus* radice eduli flore cæruleo, *Breyn. Cent. 180.* An fortè *Gladiolus minor* gramineus flore parvo cæruleo *ejsd. Fasc. rar. 24.*

Fol. 88. ad lin. 14.

Caryophyllus fructu oblongo abortivo magis squamoso ex *Insula Machian Breyn. Prodr. 2. 26.* Item *Caryophyllus* fructu oblongo abortivo minus squamoso ex *Insula Amboyna ejusd. ibid.* *Garyophyllus denticulatus, & Garyophyllus*

lus regius *Wormij* in *Museo*. *Caryophyllus* spicatus *Tshinka-Papova Moluccanis Pison.* in *Mantissa*. *Caryophyllus* regius in *Machian* regno olim natus, jam verò nullibi existens, *Cl. Rumphij. Miscell. Curios. decur. 2. Ann. 82.* Item *Caryophyll-regius Amboinicus, Rumphij.*

Fol. 88. ad lin. 16.

Apud *Persas* ubi etiam invenitur *Jamberzade* nuncupatur. Hujus fructus odore & sapore *Aquæ rosaceæ* proximus verum longè jucundior, ut aliorum relatu monuit nos *D. Petiver.* An *Caryophylli* odore fructus exoticus, *CBP. 411.* Fructus *Caryophyllum* olens *Avellanæ* magnitudine *Garc. Fragofo.* Fructus *Avellanæ* nucis magnitudine cujus folia *Garyophyllos* odore referunt in *Bayæ. Part. 3. Ind. Or. 15.* Folia saporem *Garyophyllorum* referentia in *Insula Sancta Maria.* ad littus *Madagascar CBP. 410. ex Part. 3. Ind. Orient. cap. 12.* Idem (fortè) cum *Perin-Niara* f. *Inalel Malabarensum, Hort. Mal. Part. 5. Tab. 29.* Baccifera *Malabarica* fructu umbilicato pruniiformi, unico intus nucleo, *Raij. Hist. Pl. 1499.*

Ibid. post lin. 16.

CARYOPHYLLUS aromaticus *Ind. Orient.* acuminato folio minore, fructu rotundo monopyrene. *Naucleum* *Malabarorum.* Hujus *Caryophylli* Arbor eadem est cum *Belluta-Kanneli, Hort. Malab. Part. 5. Tab. 20.* Baccifera *Indica* fructu umbilicato racemoso candido monopyrene rotundo, *Raij Hist. Plant. 1498.*

Nostris autem fructus instar *Caryophyllorum* vulgarium colore sunt nigri. An fortè *Garyophyllon* legitimum, *Plinij lib. 12. cap. 7.* Ubi dicit, est etiamnum in *India* *Piperis* grani simile quod vocatur *Gariophyllon* grandius fragiliusque tradunt in *Indico* luco id gigni, advehitur odoris gratia.

Ibid. ad lin. 35.

Præcedentes has duas *Caryophyllorum* aromaticorum species, licet à me tam graphice adnotatas & depictas in *Phytographiâ nostrâ* *Myrto* ejus arboreæ unice assignavit, *D. Sloan* in *Cat. sua Jamaic.* Sed quàm rectè harum sit reductio cujusvis æqui rerum existimatoris Judicio relinquimus, & quàm iniquè hæc perversa methodo clarissimarum Plantarum notitiam confundere molitus est plurimis in locis hujus Catalogi, in quo non falsa modo, sed incitæ & temeritatis plena cuncta congestit. *Cujusvis hominis est errare (inquit Cicero) nullius nisi insipientis in errore perseverare.*

Ibid. ad lin. 40.

Hujus cortex *Quei pi Sinensibus* nuncupatur; *Cleyeri de Medic. Simplic. Chines. usitat. 43.* Huc fortè spectat Arbor *Sinens.* pinguedinem *Sebi* instar ferens, *Mart. Atl. Sinic. 119. Jonst. Dendrol. fol. 42 & 477.*

Ibid. ad lin. ult.

Cadegi Indi (i. e.) *Folium Indum Arabibus* *Casp. Bauh. Pin. 410.*

Fol. 89. ad lin. 2.

An Arbor *Canellifera Indica* cortice acerrimo viscido f. mucilaginoso, qui *Cassia lignea* *Officinar. Breyn. Prodr. 2. pag. 18.* *Cassia* lignea fusca aromatica *CBP.*

Fol. 89. ad lin. 5.

An Arbor Canellifera sylv. Ceylonica odore & sapore Lauri, vel Myrrhæ Hermann Breyn. Prod. 2. pag. 18. Cujus etiam (ut ipse dicit) in Officinis folium pro Malabathro divenditur.

Ibid. ad lin. 32.

Arbor baccifera Laurifolia aromatica, fructu viridi, calyculato, racemoso, Cat. Jam. 165. Ubi variae inter se plurimum diversae plantae, per Illarum ignorantiam planè confunduntur.

Fol. 90. ad lin. 4.

An Cassia minor fruticosa hexaphylla Senæ foliis, Cat. Jam. 146. Fortè Cassia fistula Indica flore carneo Cl. Sebastiani Jagërij Breyn. Prodr. 2. 26. Cassia fistula Orientalis, ovâli folio Coluteæ non hirsuto, Cheugunnee Malabarorum.

Ibid. post lin. 14.

CASSIA sylvestr. Americana siliquâ subrotundâ crassâ, uncialem longitudinem vix excedente, ex Insula Barbados ad nos allata. An Cassia Americana Fabacea D. Seyn. Not. in Hort. Malab. Part. 1. fol. 48.

CASSINE vera Floridanorum Arbuscula baccifera Alaterni fermè facie, foliis alternatim sitis, retrapyrene. An fortè Abelicea f. Santalus adulterina Cretica Honnor. Belli J.B. Tom. 1. 490. è Carolinâ nobis allata est, & in Hortis Curiosorum apud nostrates circa Londinum plurimis in locis, hodiè dum viget. Pseudo-Santalum Creticum, CBP. 393. Park. Theatr. 1606.

Cassine vera perquam Similis Arbuscula Phillyreæ foliis antagonistis, ex Provinciâ Caroliniensi. The Cassinberry Bush nostratibus dicta. Hujus folia sunt sapore perquam amara.

Ibid. post lin. 28.

CASTANEÆ facie diphyllas Arbor Æthiopica Capitis Bonæ Spei. An Nalagu Hort. Malab. Part. 2. fol. 43.

Fol. 91. ad lin. ult.

Kitra & Alkitra, Significatur enim hac voce Arabibus Cedrus, quæ Chaldaicè Cadros dicitur. Dion (ut Hermolaus refert) in Neronis Vita, non Citrias sed Cedrinas mensas nuncupare maluit, ut Cedro potius quàm Citro similes viderentur Arbores; Monardes de Aurantiis apud Carol. Clus. fol. 52. Hinc etiam factum ut Calepinus & Lexicon Græcum collatitium Basil. pro una arbore declarent Citrum & Cedrum. Quin nec Henricus Stréphanus Thes. Tom. 2. fol. 1632. planè se expedit, nisi quatenus Plinio se jungit, qui distinguit, lib. 13. cap. 16. In eadem dubitationis alea fuisse patrem Robertum constât, cum Tom. 1. Thes. Lat. f. 494. ex Calep. Et Citrum Atlanticam submurmurât, & Citreas Mensas. De Cedro enim utrumque est capiendum. Dioscoridem huc trahunt, qui pro καδρόν, legunt καδρόν. Pretiosissima fuisse hac Tabulata, vel ex hoc Martialis disticho cognoscere licet,

Accipe felices Atlantica munera Mensas

Aurea qui dederit dona, minora dabit.

De hujusmodi Mensis *Seneca* loquebatur *libell. de Anim. Tranquil.* Placet Mensa non varietate macularum conspicua sed in usum posita, quæ nullius convivæ oculos, nec voluptate moretur, nec accendat invidia. *Et idem. 7. de Benefic.* Video istas Mensas, & æstimatum lignum Senatoris censu eò præstantius, quo illud in plures nodos arboris infelicitas torfit. Ex Citrò nempe ligno & quidem parte nodosa illæ maculæ in Mensis elucebant, hinc venuste *Petronius Arbitr.*

Ecce Afris eruta terris

Citrea Mensa greges servorum ostrumque renidens

Ponitur, ac maculis imitatur vilibus aurum.

Nec apud nostrates ex variis & eleganter striatis *Indiarum* lignis Mensulæ confici desière, atque iis multò pretiosiores ex versicoloribus marmoribus, lapide lazuli, gemmisque quas *Orientales plagæ* subministrant confectæ nunc dierum in deliciis habentur; Visa nobis fuit ante paucos annos apud *Hatsfeldiam* in *Illustriss. Comitris Salisburienf.* *Ædibus* lapidea ejusmodi Mensa intertextis artificiose lapillis nobilioribus *Mosaico* opere ut vocant coagmentatis, Viginti aureorum millibus æstimata. Fortè etiam *Thuia Theophrasti*. Nos (inquit *Goropius*) in eâ sumus opinione *Thuiam Theophrasti* esse *Cedrum* s. *Cedrelatem* masculam, *Romani* melius fecissent si Mensas *Cedrinas* nominassent; *Thuia* tandem geminâ de causâ ita vocatur, Altera quod in *Sacrificiis* *Thuris* loco haberetur; Altera, quoniam *Cimbris* *Thui* & inde *Thui* nihil aliud est quam custodia, perdurat (*Theophrasto* teste) materies hæc omnino incorrupta, undè merito *Arborem Vitæ* vocant: *Thuium*, sive *Thuia* dicas, quam *Sacra Littera* ex *India* adferri dicunt, eam *Theophrastus* ex *Cyrenaica* *Plinius* ab *Atlante* & *Anchorario Mauritanie* monte adferri scribunt: Concludit tandem dicens, ad *Templum Salamonis* non solum aurum ex *Atlantico* orbe petebatur, sed ligna quoque *Thuina* eadem *Navigatio* ne adferebantur, quæ an ex *Atlanticis* saltibus è quibus post à *Romanis* magnis sumptibus petita legimus an ex *Orbe* quoque *Opher* adjecta sint, cum utrumque commodè fieri potuerit, ignoro.

An fortè *Sethim Hebræorum*: Est alia Arbor Medica (inquit *Lemnius in Conjectur. de lignis Sethim*) etiam vocata *Citrus*, sed quæ Mala aurea non profert, *Sylvestri Cupresso* aut *Cedro* non absimilis, ut Nonnulli existimant esse *Sethim*, Lignum est à carie, teredine, vermiculisque alienum, nec ullo ævo corruptioni obnoxium. Nec est prætermittendum quod apud *Sanctum Hieronymum* legit me memini *supr. Exod. ad cap. 27.* Facies (inquit Dominus) Altare de lignis *Sethim*, &c. Ecce (inquit) Altaris ligna quæ de lignis. *Paradisi* sunt, igne vicino non cremantur, sed puriora redduntur, nec mirum cum etiam *Amithon* genus ligni, quanto plus arserit, tantò mundius invenitur, Ita ille, quod etiam scripsit, *Vincent. Hist. Nat. lib. 10. cap. 43.*

An Lignum purpureum in quo *Plutarchus* scribit *Caicum Marium Rutilium* primum Dictatorem Ordinis Popularis inter *Romanos*, curasse sculpi Bellum, Personarum imagines 369. digitis minores, delatum fuerat lignum ex *suprema Africa*, ex quo pulcherrime Sculpturæ parari possunt. *Ettalche* forsan *Ugon*.

Africanam in *Descript. Afric. lib. 9.* quo utuntur Medici ad Luem Veneriam curandam. *Juniperus maj. Scaligeri Exercit. 181. part. 19.* Cujus meminit his verbis. Grandiorem Juniperum quæ Cedrum maxime æmularur Harar vocant *Arabes. Afri* nominant *Ettalch, &c. Vid. JB. Tom. 1. Part. 2. fol. 302.* Arbor *Americana. Oxyacanthæ* (melius *Oxycedro*) similis, *CBP. 489.* Lignum exoticum; *Clus. lib. 1. Exot. cap. 6.* An affinis arbori *Ettalch* in *Africa* nascentis cujus, *Joh. Leo in descriptione Africæ* meminit, dubitat ipse *Clusius.* Incolæ ignee resinam eliciunt & fortè eadem est cum *Damar Indorum*, quâ *Picis* loco cum nostrates *Angli*, tum *Indi* picandis navibus utuntur.

Fol. 92. ad lin. 4.

Pruno fortè affinis arbor maxima, materie rubrà laxâ odoratâ, *Cat. Jam. 1822.* At minùs propriè illic nominatur hæc peculiaris & sui generis Arbor; nihil enim cum *Pruno* habet commune, nisi quod sit Arbor.

Ibid. ad lin. 10.

Deleantur quæ sequuntur verba, viz. An *Pithahaya* quæ *Saxorum Scissuris* nascitur, *Nieremberg. exot. 326.*

Ibid. ad lin. 13. post loquitur add.

Hujus autem nominis, viz. *Tepeamarl*, & fortè ejusd. generis altera exhibetur, *Icon. fol. 409.*

Ibid. ad lin. 16.

Huc (fortè) spectat Arbor resinifera, *Tabacensis de Laet. Ind. Occid. lib. 17. cap. 28.* *Terabinthus* folio singulari, non alato rotundo, succulento, flore tetrapetalo, pallide luteo, fructu majore monopyreno & si placet (sibi, minime vilo). *D. Sloan. Cat. Jam. 187.* alioquin enim quàm absurdum esset pro epitheto, vocem *Monopyreno* adungere, huic fructui, qui mille ferè seminibus scatet.

Ibid. ad lin. 24.

Alni fructu *Morifolia* arbor, flore pentapetalo, *Cat. Jam. 135.* Sed *Alni* fructui satis ineptè dicitur arbor quæ capsularem fructum profert.

Ibid. ad lin. 37.

Huic congener est *Pongu*, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 35.* ut nobis videtur, licet *Jaca* species esse censetur *Commelino*, quapropter & nominatur ab illo, *Jaca* minor sylvestris *Malabarica* *Not. in loc.* Folia quidem sibi invicem, non bene assilantur.

Fol. 93. ad lin. 14.

Serratula non lacinata *Sutherland. Hort. Edinburgens.* *Serratula* præalta angustio *Plantaginis* aut *Perlici* folio, *Bocc. Mus. Ph. pag. 45. Tab. 32.*

Ibid. ad lin. 17. post calcem. add.

Forfan rectius *Serratula Novæboracensis* folio levitè crenato molli incano, *PBP. 375.*

Ibid. post lin. 21.

CENTAURIUM medium *Marianum* folio integro, *Cirsij* nostratis more *Spinulis* simbratio.

Ibid. post lin. 36.

Centaureum minus *Arabicum* longiori folio, flore purpureo. Variat etiam flore albo.

Fol.

Fol. 94. post. lin. 6.

Centaurium luteum Ascyroides Virginianum Banisteri. Cat. Stirp. Virg.

Centaurium minus luteum, folio subrotundo membranaceo transparenti, Capitulis Bon. Spei.

Centaurium minus Hypericoides, flore luteo Lini capitulis. Narrecomptee Malabar. Huic fortè congener est Kansjan-cora, Hort. Malab. Part. 10. Tab. 52. Quamquam alibi à nobis nominatur Lychnidis æmula, alato caule summis ramulis perfoliata.

Centaurium minus spicarum angustissimo folio, sive Scoparium, Marilandicum novum.

Fol. 94. ad lin. 25.

An Baccifera racemosa fruticosa Buxifolio nervo ad summitates latiori, fructu amaro monoppyreno, Cat. Jam. 170. Si fortè non sit Buxus nostra Lauri Alexandrinæ foliis accedens Americana, Phytograph. Tab. 80.

Ibid. ad lin. 34.

Ceraso affinis arbor baccifera racemosa flore pentapetalo herbaceo guttato, fructu coccineo monoppyreno viscido, semine rugoso, Cat. Jam. 169.

Ibid. ad lin. 42.

Arbor baccifera folio subrotundo, fructu cerasino sulcato, rubro polypyreno, ossiculis cannularis, Cat. Jam. 172.

Fol. 95. ad lin. 10.

An Arbor baccifera Myrtifolio latiore, fructu nigro Cerasino dippyreno, Cat. Jam. 172.

Ibid. post lin. 12.

CERASI similis *Arbuscula Mariana, Padi folio, flore albo parvo racemoso.*

Ibid. ad lin. 15.

Deleantur Fortè & quæ sequuntur verba; & eorum loco post vocem dicta add.

An Ceraso affinis Arbor baccifera racemosa flore albo pentapetalo, fructu flavo monoppyreno eduli dulci, Cat. Jam. 169. Huic nostro ut à pictura conjicere licet, haud parum convenire videtur, Quauh-tezhoatl, Nov. Hisp. Terentij apud Recc. 405.

Ibid. ad lin. 21. post folio add.

Fructu parvo Fragiformi, Ossiculo tuberculoso.

Ibid. post lin. 22.

Cerasus Ind. Orient. Fragiformis grandiori fructu, Ossiculo ferè orbiculari compressi usculo molli, hirsutie villosa. Brindone (fortè) Indici Fructus rubentes acidi, JB. Tom. 1. fol. 89.

Ibid. ad lin. 30.

Redbuds nostratibus vulgo; an forte Comatotoncapatl, Nov. Hisp. Terentij apud Recc. fol. 360.

Ibid. post lin. 36.

CERATIA *Brasliana pinnatis Fraxini foliis, Ornus Hispanica, sive Spanish Ash Barbadenfis dicta; Caaroba Pisonis 134. Vid. Almagell. Bot. Append. fol. 399.*

Ibid. ad lin. 40.

An Acacia arborea maxima non spinosa, pinnis majoribus, flore albo, siliqua contorta coccinea ventriosa elegantissima, Cat. Jam. 151.

G 2

Fol.

Fol. 96. ad lin. 6.

Acacia arborea major spinosa, pinnis quatuor majoribus subrotundis, siliquis variè intortis, *Car. Jam* 152.

Ibid. ad lin. 18.

An hæc sit fortè *Cassia Americana* fabacea, *D. Seyn. Not. in Hort. Malabar. Part. 1. Tab. 38.*

Ceratia cariola *Caribearum* folliculis teretibus tuberosis, cortice foris ex fusco rubescente scabro, intus miniato, Mali Citrij Semine. An Lobus *Brasilianus* minor *Clus. exor. lib. 3. cap. 2.* Lobus *Brasilianus* crassus humidus Citrij Semine alter, *J.B. Tom. 1. lib. 12. 437.* An *Ceratonix* affinis arbor siliquosa Oleæ folio, flore tetrapetalo albido, siliqua tereti ventriosa, cujus interior tunica est mucosa, & eleganter miniata, *Car. Jam. 154.*

Ibid. ad lin. 39.

Hæc est Arbor illa quæ apud *Guadelupenses* nec non in *Insula Martinico* aliisque *Caribearum* Insulis *Courbary* nuncupatur, quam à similitudine solum nominis per nudam conjecturam ad *Calaburam* rubram nos aliquandò tribuimus; tam arduum est (inquit *Seneca*) de iis quæ conjecturâ sequenda sunt, aliquid certi pronuntiare. De hoc autem non ita pridem *D. Andreas Gundelsheimer MD. Germanus*, Vir ornatissimus & insignis *Botanicus* quod ab ipso *Carolo Plumier* erudito Monacho cum esset *Parisiis* addiscebatur nos candidè monuit. Lè *Courbary Rochfort. Histoire des Antilles 58.* At malè inter *Pruniferas* ab illo sortitur. Datur & altera varietas vel species distincta, cujus Lobi sunt minores & Pyriformes ex *Insula Barbados.* An *Ceratonix* affinis siliquosa Lauri folio singulari, flore pentapetaloide, purpureo, striato, siliqua crassa brevi, pulpa esculenta, & purgante, semina ambiente. *The Bitch Tree, Car. Jam. 154.* Huic autem nostræ sunt flores papilionacei, ut idem *Plumier* affirmabat.

Ceratodendros folio singulari platyphyllos, siliqua & seminibus *Acacia.* Nomenaumarum *Malabarorum.*

CEREFOLIUM rugoso Angelicæ folio aromaticum, *Boccon. Mus. Pl. rar. pag. 29. Tab. 19.*

Cerefolium Virgintanum Angelicæ trilobatis fol. semine longo splendente lævi. *Cerefolium Canadense* trilobatum *D. Bobart.* An fortè *Cerefolium latifol. Canadense. Corant de Pl. Canad. pag. 176.*

Ibid. post lin. antepenult.

CHAMÆDRIFOLIA pusilla planta, flosculo oblongo monopetalo, capsula membranacea, ex *Coromandel.* An *Katu-pee-Tsjanga-puspam, Hort. Malabar. Part. 9. Tab. 58.* Huic etiam proximè accedere videtur, *Nanichera-Canschabu ejusd. Hort. Malab. Part. 10. Tab. 50. (i. e.) Veronica Indica Teucrij folio, Commelini Not. in loc.* Huc etiam refertur libet *Tsjeria-manga-nari ejusd. Hort. Malab. Part. 9. Tab. 85.* Alline spuria s. *Veronica Indica*, flore cæruleo, *Chamædrifolia, Commelin. supr. loc. at sub eodem fere titulo, alterius Icon exhibetur in ejusd. Hort. Malab. Part. 10. Tab. 89. fol. 177.*

Fol. 97. post lin. 3.

Chamædrys multiflora Hispanica Turnesortij monente Doctore Preston.
Chamædrys Verna Virginiana odoratissima, Banisteri Cat. Stirp. Virginian. MS.

Ibid. ad lin. 5.

Polpium Pyrenaicum supinum, *Hedera terrestris* folio, Turnesortij Elem. Bot. Huic multum assimilatur ut ex picturâ conjicere licet, Scordotis Prosp. Alpini lib. de exot. 284. & eandem esse nobis videtur. Hue fortè spectat Chichilticcihuapatli, Novæ Hispaniæ Terentij apud Rec. fol. 367. Huic etiam accedunt & *Polium saxatile* Chamædryoides amplâ comâ, Bocc. Mus. Pl. rar. pag. 75. Tab. 61. & *Polium Saxatile* Chamædryoides, rotundo folio, flore rubello, ejusd. pag. 76. Tab. 62.

Ibid. ad lin. 8.

An *Verbenæ* aut *Scorodoniæ* affinis *Anomala*, flore albido, calyce aspero, Allij odore, Cat. Jam. 64. An fortè *Scordium maritimum* fruticosum procumbens, flore cæruleo, ejusd. p. 66.

Ibid. ad lin. 10.

An *Rubia parva* foliolis ad geniculum binis, flore cæruleo fistuloso, Banister. Cat. Stirp. Virg.

Ibid. post lin. 23.

CHAMÆLÆA *Africana* triccocos & tetracocos Taxi folia, fructu nigro, summis ramulis, plumulis, sive villosâ cæsariæ coronato. An *Cupressus Æthiopica* coronata, fructuatro quadrifido Breyn. Prodr. 2. 39.

Fol. 98. post lin. 8.

CHAMÆMELUM *Leucanthemum* crassioribus foliis ex Prom. Bon. Spei. Anthemis fortan crasso *Sophiæ* folio, Boscon. Mus. Plantar. rar. pag. 150. Tab. 110.

Ibid. ad lin. 9.

Variat interdum floribus plenis, unde

Chamæmelum Æthiopicum lanuginosum, flore pleno, Breyn. Prodr. 2. pag. 30.

Ibid. ad lin. 11. add.

Phytograph. Tab. 274. fig. 3. *Chamæmelum Curassavicum* inodorum Doctoris Uvedale à Sberardo communicatum. Fortè *Chamæmelum Æthiopicum* tenuissimis foliis glabris, PBP. 322. nostra tamen folia pilis tenuissimis scatent.

Ibid. post lin. 14.

CHAMÆPITYS *Æthiopica* foliis latè virentibus, flore oblongo, phæniceo, plusquam eleganti, sive *Plusqueneti*. Rara quidem certè, & aspectu pulcherri-
 ma, hæc est planta.

Chamæpitys incana exiguo folio, CBP. Vid. *Lysimachiæ spicatæ purpureæ* affinis *Thymi folia*, Sc. in Almagest. Bot. fol. 236.

CHARAMEI *Acostræ* folio Pyri, JB. Tom. 1. fol. 88. Arbor exotica fructu ramoso, Charamais dicta CBP. Charamei purging-corner d. hazel-out, Park. 1638. Lusitanis Cheremelas Turcis & Persis Ambela: Paringee-Nellekai Malabareis, & Christianorum Myrobalani s. Christianorum-Nellekai ab iis nuncupatur.

Fol.

Fol. 98. ad lin. 20.

An Urtica iners racemosa sylvatica, folio nervoso, Cat. Jam. 38. quæ (ut suspicor) iterum recensetur, sub hujus nostræ titulo, pag. 164.

Fol. 99. post lin. 15.

CHRYSANTHEMUM angustiori folio repens, sulphureo flore, hirsutie villosum, ex Provinciâ Marianâ.

Ibid. ad lin. 21.

An Conyza major inodora Helenij folio integro, sicco, & duro, Cichorei flore albo è ramorum lateribus exeunte, Cat. Jam. 123.

Chrysanthemum American. latiori folio aspero, caule quadrangulo, ad singulos angulos membranaceis appendicibus, per longitudinem discurrentibus, alato. An Naviytepuzt Mexicensis sive Quadrilatera, Hernandez. 189. Cui fortè congener est Mamatzlacotl, Novæ Hispan. Recc. 383.

Ibid. post lin. 21.

Chrysanthemum Americanum, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus è pallidè lutescentibus parvis; ~~Stickwerth~~, à nostratibus Colonis apud Provinciam Marianam degentibus, vulgo dicitur.

Ibid. ad lin. 26.

Hæc autem non est de Chrysanthemorum genere, sed planta sui generis. & sibi peculiaris, Singhaerhar Benghalensium nomine, & aliquando sub Arbore tristi transmissa est, ex plagis Orientalibus. An Arbor tristis Acoftæ Hist. Lugd. 1852. cujus fructus magnitudine Lupini, cordis effigie, per medium sectus; descriptioni optime congruit, & a similitudine fortè hujus, fructui Manjapumarum, Hort. Malab. Part. 1. fig. 21. sive Pariatacu Bramanum quod cum Canariensium Parizataco, quæ Arbor tristis est, non malè convenire Doctori Syen (in Notis) videbatur, qui rotundo-planus est, ac compressus, colore viridi, in medio unâ Suturâ extuberante, ad verticem utrinque perductâ, Arbor tristis nuncupari merebatur. Poulamulle Malabarorum.

Ibid. ad lin. 36.

Tecpatli fortè Mexicana Hernandez apud Recc. 191.

Ibid. ad lin. 39.

An Tlatlocotit Tepoztlanensis, Scabiosa fruticosa Mexicana Hernandez apud Recc. 106. Sed in quibusdam minus convenit.

Fol. 100. ad lin. 6.

Huic & proximè præcedenti sunt folia magis frequenter ad caulem inordinatè posita, interdum autem Variant ambæ, ternis simul ad nodos ambientibus foliis.

Ibid. post lin. 6.

Chrysanthemum Marianum Virgæ aureæ Americanæ foliis, florum petalis tridentatis.

Ibid. ad lin. 10.

An Conyza inodora, Helenij folio integro, duro, angusto, oblongo, capitulis in lateribus ramorum conglomeratis, Cat. Jam. 123.

Chry.

Chrysanthemum Americanum, minus, angustis foliis Buglossi asperis, strumosa radice.

An *Cocoz Xochipatl*, seu *Medicina lutei floris*, *Hernandez apud Rec.* 188.

Chrysanthemum fruticosum Monomotapense, foliis *Chenopodij* glaucis.

Chrysanth. *Tuberariae* f. *Cisti Plantaginis* folio, & facie, *Insulae Johanna*.

Fol. 100. ad lin. 13.

Chrysanthemum Marianum, *Pilosellae majoris* folio, & caule, petalis speciosis luteis, umbonem nigrum radiantibus.

Ibid. ad lin. 18.

Bidens Indica *Hieracij* folio, caule alato, *Turnefortij Elem. Bot.* 367.

Chrysanthemum Virginianum, *Viticis* folio trifoliatum, florum petalis, ex purpureo & aureo varium.

Chrysanthemum Indicum, *Sassafras* trilobato folio, flore luteo, radice glandulosa.

Aumaunadundoo Malabarorum. Ad *Hæmorrhoidas* celeberrimum Specificum.

Hujus semina sunt hastæ cuspidi perquam Similia. Item ex *Provincia Mariana* *Novi Orbis* in *Europam* nuper advecta est.

Ibid. post lin. 20.

Chrysanthemum fruticosum Limonij foliis *Africanum*, caule glabro, floribus parvis.

Chrysanthemum fruticosum Polygoni foliis *Africanum*, cauliculis scabris, flore minore.

Ibid. ad lin. 22.

An fortè *Chrysanthemum sylvaticum* repens minus, *Chamædryos* folio, flore luteo nudo, *Semine* rostrato, *Cat. Jam.* 126.

Chrysanthemum Africanum, *Cyani minoris* folio parvo ramosissimum.

Chrysanthemum Conyzoides Æthiopicum, capitulo aphylo, *Tithymali paralii* foliis subrotundis, hiulculis in superficie conspicuis. An *Chrysanthemum Conyzoides Æthiopicum* capitulo aphylo, foliis *Majoranæ*, *Breyn. Cent.* Nostri tamen folia, *Paralii* in modum, ad caulem sibi invicem incumbunt.

Chrysanthemum Africanum, vermicularis foliis fruticosum, capitulo aphylo. An *Chamæcyparissus* viridis, *Indica*, *Ericæ* folio, flore albo maximo, *Breyn. Prodr.*

2. 30.

Chrysanthemum Ericoides coronatum, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 165. *Icon.* 82.

Chrysanthemum fruticosum. *Corios* folio *Africanum*, cauliculis hirsutis, flore ampliore luteo.

Ibid. ad lin. 34.

An *Chrysanthemum palustre* minimum repens, *Apij* folio, *Cat. Jam.* 126. *Bidens Americana* *Apij* folio, *Turneforti. Elem. Bot.* 367.

Ibid. ad lin. ult.

An *Novangliæ* *Colonis Pricklause*, (i. e.) *φθειρανεωλ*, f. *pediculus aculeatus* nominatur. An fortè *Bidens Canadensis* latifolia, flore luteo, *Turnefortij Elem. Bot.* 367.

Ibid. post lin. ult.

Chrysanthemum bidens trifidum latiori & breviori folio *Marilandicum*.

Chrysanthemum Marianum *bidens*, sive aquatic. foliis angustissimis tripartito divis.

Fol.

Fol. 101. post lin. 3.

Chrysanthemum bidens *Marianum* foliis integris glabris, flore amplo, ex luteo & sanguineo versicolore.

Fol. 101. ad lin. 7.

Huic (fortè) referatur Chrysanthemum palustre repens, minus, odoratum, folio scabro trilobato, *Car. Fam. 126.*

Ibid. ad lin. 9.

Huic (fortè) referenda sit Tecpatli *Mexicensibus Hernandez apud Recc. 191.* cui folia itidem sunt aspera.

Ibid. ad lin. 11.

Charungullee *Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 14.

Chrysanthemum Ciceris triphylli folio *Americanum* Leucanthemi flore, semine nigro bicorni. An Chrysanthem. trifoliarum scandens, flore luteo, semine longo rostrato bidente, *Car. Jaw. 125.* Nostri autem flores sunt Bellidis majoris amplitudine candidissimi.

Ibid. ad lin. 21. adde.

Vid. Phytograph. Tab. 274. fig. 6. ex Insula St. Helena nobis allata est.

Fol. 102. ad lin. 2.

Chrysanthem. fruticos. maritim. foliis glaucis oblongis, flore luteo, *Car. Fam. 125.*

Ibid. post lin. 38.

Chrysanthemum Thapsiæ foliis *Æthiopicum* flore parvo singulari.

Ibid. ad lin. 40.

Frequentius est flore melino, variat autem flore pallido flavescente, l. colore buxco, minore, & aliquando, flore candido majore, ut nos cum eximio Botanico D. Samuele Doody in *Hort. Med. Chelseaiano* haud semel observavimus.

Fol. 103. post lin. 2.

Chrysanthemum parvum *Cotulæ* foliis, caule nodoso, ex *Insula St. Helena.*

Ibid. post lin. 17.

Chrysanthemum *Marianum*, Scabiosæ tenuissimè divisis foliis, ad intervalla confertis.

Ibid. post lin. 18.

Chrysanthemum *Peucedani* foliis *Provinciae Marianaë.* An fortè *Idem* cum precedenti in *Almag.*

Ibid. ad lin. 36.

Santolina Africana corymbifera *Coronopi* folio, *Elem. Bot. 366.*

Fol. 104. post lin. 30.

CICHORIASTRUM *Gaditanum*, Thlaspeos sempervirentis folio, & facie.

Ibid. ad lin. 34.

Cicutaria latifolia fetidissima, *Lekolij Hist. Lugd. 790.*

Ibid. ad lin. 38.

Cicutaria maxima fetida, *Lobelij Hist. Lugd. Ibid.*

Ibid. ad lin. 39. post Icon. 732. add.

Quam Thapsiam esse dicit *Meriscus de Umbellif. fol. 79.*

Fol. 104. post lin. penult.

CICUTA arbor *Virginiana* D. Banisteri Cat. Stirp. Virg. Mss.

Fol. 105. post lin. 1.

CIRCÆÆ foliis incanis, floribus tubulosis plurimis, summo caulis fastigio umbellatim positis, ex *Insula Joannâ.*

Ibid. ad lin. 24.

Ad hoc fortè genus accenseri meretur *Cœrticacuilotl-Xochitl*, Nov. Hi'pan. Terentij apud Rec. fol. 374.

Ibid. ad lin. 29.

Fortè etiam *Cistus* folio oblongo integro glabro, subtus albido vasculis trigonis, *Car. Jam.* 36.

Ibid. ad lin. 39.

Hujus Iconem nimis fastuose depictam invenies in *Hort. Medic. Amsteiod.* ad cap. 20.

Ibid. ad lin. 41.

An *Cistus Marinus*, foliis in ambitu undulatis, *Hist. Lugd. lib. 12. fol. 1361.*

Ibid. post lin. ult.

CISTUS latifolia major trinervis incano folio, floribus purpureis ex *Insula Pico*. An *Cistus*, *Ledon latifolium Creticum*, JB. Tom. 2. fol. 9. *Ledum tertium Cyprium Clus. Hist.* *Cistus Ledum quartum*, s. *Cretense CBP.* *Ledon à Græco diversum*, & longè majus in *Monte Olympo Bellonius* notavit. *Cistus Ledon latifolium Creticum Triumphetti Mss.* apud Fr. Cupani in *Hort. Catholic.* pag. 51.

Fol. 106. post lin. 8.

Cistus Ledon foliis Thymi, CBP. 467. *Ledon decimum Clus. Hist. Plantar.*

Ibid. post lin. 16.

Cistus humilis Æthiopicus inferioribus foliis *Rorismarini* sylvestris puncticulatis, cæteris autem *Serpylli* subrotundis, flore carneo.

Ibid. ad lin. 37.

Cistus pulpifer Indicus D. Hermann.

Ibid. post lin. 37.

Cistus Orientalis pulpifer *Jujubinis* foliis trinervis, capsulâ parvâ. *Tsjerou-Kadali*, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 44.*

Cistus Chamaerhododendros Mariana, *Laurifolia*, floribus expansis, summo ramulo in umbellam plurimis.

Ibid. ad lin. 39.

Rectius fortè hæc est *Tzatzequa*, *Novæ Hispan. Terentij* apud Rec. 433. Cui *Bellillam*, *Hort. Malab. Part. 2. fig. 18.* spectare putarem, si non diceretur *Scandere*.

Ibid. post lin. 43.

Cistus Virginiana Periclymeni flore ampliori minus odorato.

Fol. 107. ad lin. 3. post vocem *Cretica* adde.

(i.e.) *Laureola Cretica humilis*, *Prosp. Alpin. de exot.* pag. 43.

Fol. 107. ad lin. 11.

Anonymos fruticosa, foliis *Ericæ bacifera Martialis*, JB. Tom. 1. 527. *Rosa alpina* altera species, foliolis minimis, *Acinaria palustris* nostræ persimilibus *Gesneri de Hortis.*

EH

Fol.

Fol. 107. ad lin. 13.

Helenium ex *Helena* lachrymis natum, *Plin. lib. 21. cap. 10. & c. 31.* Est enim frutex humi se spargens, dodrantalibus ramulis, folio Serpylli. Helenium *Aegyptium Smetij à Leda Miscellan. Medic. pag. 592.* ubi dicit quod *Avicenna* Tract. 2. cap. 240. Utrumque Helenium turpiter confundit neutrumque novisse videtur, & librum suum nonum his verbis concludit. Hoc Helenium *Aegyptium* cum hodie nemo Eruditorum sit, qui se novisse venditet, non est quod de illo pluribus laboremus præsertim cum contra Serpentum ictus, præcipuus illius prædiceretur usus.

Ibid. post lin. 21.

Cistus humilis *Chamaedryos* crispatis foliis, *Promont. Bon. Spei. Kurundoti* forsân *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 18.* Cistus humilis *Indica* Ciceri folio flore flavo *Camelin. Notis supr. locum.*

Ibid. post lin. antepenult.

Cistus *Helianthemus* *Rorismarini* foliis viridibus, flore luteo, vasculo seminali trigono, ex *Insula Chio.*

Fol. 108. ad lin. 3.

Chamaecistus capillaceis, sive *Camphorata* foliis pluribus ad eundem exortum, uno aliis longiori *Fr. Capani Hort. Catholic. 46.*

Ibid. post lin. 7.

Cistoides frutex *Ethiopiæ* parvis *Coronopi* foliis ad nodos, caulem radiatim ambientibus.

Ibid. ad lin. 19.

An *Barberis* fructu, fruticosata *cemosa* *Fraxini* folio alato, fructu nigro dipyræno, *Cat. Jam. 170.* Nostræ enim Arboris fructus, est sanè dispermos.

Ibid. post lin. 30.

CLEMATIS daphnoides *Carolinensis Horti Comptoniani.*

Ibid. ad lin. 37.

Datur & hujus altera varietas minor. *Apocyno* affine *Gelseminum Indic. hederaceum* fruticosum minus. *Cat. Jam. 216.* *Bignonia* forsân *Americana* lutea, *Fraxini* folio, siliquis angustioribus *Sirinami, Turnesortij Elem. Bot. 133.*

Ibid. post lin. ult.

Clematis triphylla *Ind. Orient. Ciceris* majore folio bæcifera. *Muurlachedde Malabarorum.*

Fol. 109. ad lin. 12. post Imago, add.

An *Nerium* arboreum folio maximo obrufiore, flore incarnato, *Cat. Jam. 154.* Ubi *Synonymia* sunt serè omnia confusa.

Ibid. ad lin. 28.

Clematis (fortè) tetraphylla alia pulcherrima, ex *Guiana Breyn. Prodr. 1. 30.* *Apocyno* affine *Gelseminum Indicum, hederaceum, herbaceum, tetraphyllum,* folio subrotundo acuminato, *Cat. Jam. 90.*

Fol. 109. ad lin. 43.

Clematis cujus folia in *Jamaica* semper terna observata sunt, *Cat. Jam. 85.* An *Flammula* s. *Arragine Ceylanica, sylvestri latifolia* similis, *Breyn. Prodr. 2. 46.*

An

An hæc sit Clematidis Peruviana CBP. 300. Bexugo del Peru Clusij Not. in Mo-
nard. fol. 140. Cujus radix (fortè) Radix Quimbaya Petri Cieca Hist. Peruv.
Part. 1. Carthagena's Purging-Roots, Parkinson. Theatr. 1619.

Fol. 110. ad lin. 3.

Huic generi Plantarum (fortè) pertinet Miachihuitl, Nov. Hispan. Hernandez.
apud Recc. 385. Quam nominare lubet Clematidis s. Flammula recta Cinerariz
foliis, flore luteo Americana. Fortè etiam Tequamecarl, Nov. Hispan. apud
eundem Recc. 412. Inter erectas Clematitidum species adnumerari meretur, ut &
ipse Terentius in Notis suis suspicatus est.

Ibid. ad lin. 5.

An Tlacuitlapilli, Nov. Hispan. Terentij apud Recc. fol. 421.
Clematis Virginiana Pannonica similis, foliis amplioribus subrotundis.

Clematis erecta humilis non ramosa, foliis subrotundis, flore unico ochroleuco,
Banist. Cat. Stirp. Virg.

Ibid. ad lin. 9.

Clematis purpurea repens petalis florum coriaceis, Banist. Cat. Virg.

Clematidis anguloso Citrulli folio, Aceris fructu, Plumier. Tab. 92.

Ibid. ad lin. 13.

An Prunella flore dilute cæruleo pentapetaloidæ, Cat. Jam. 65.

Ibid. post lin. 18.

CLINOPODIUM arvense, s. Acinos Hispanica foliis admodum lanuginosis.

Ibid. ad lin. 20.

Ad hoc Plantarum genus accenseri meretur, Tragoriganum Quahuahuacense,
Hernandez apud Recc. 196.

Ibid. ad lin. 39.

Pulegium Virginianum floribus in cymis congestis, Banister. Cat. Stirp. Virg. Ser-
pentaria Virginiana, Dracunculi hortensis foliis odoratis, Boec. Mus. Plant. pag.
153. Tab. 108. & Tab. 115. Hujus datur & altera varietas, latiori folio, ex
Terra Mariana.

Clinopodium Africanum procumbens Psyllii foliis & capitulis cum cauliculo lanu-
gine vestitis.

Ibid. post lin. 39.

Clinopodium Serpentaria dictum, latiori folio capitulis grandioribus, ex Provincia
Mariana.

Ibid. ad lin. ult. post 1926. add.

Ab hac tamen diversa est; magis enim convenit Origanum foliis ad summitatem
caulium canis, floribus multis, pallide cæruleis in cymis ramorum, dense stipa-
tis, ejusd. Banister. ibid.

Clinopodium Carolinianum magis incanum, summo caule flosculis purpureis coro-
natum; In Horto rariorum exoricarum instructissimo amplissimi Viri D. Samu-
elis Reynardsoni apud Hillingdonam observavimus. Fortè Houtz-Xilxochitl.
Origanina Hernandez apud Recc. 103. An fortè Quaxoxouhqui, Nov. Hispan.
apud eund. Recc. 406. Attamen nostri flores non senescunt; Origanum ejus ra-
morum summitates, floribus dilute rubris in verticillos congestis coronantur,
Banist. Cat. Virg. apud Raij. Hist. Pl. 1926.

Fol. 110. post. lin. ult.

Olinopodium *Origanum fistulosum Canadensis* folio coronatum, *Oamphoram* spirans: *Mittanp* (i.e.) *Dictamnus Terræ Mariçnæ* degentibus vocatum, à præcedenti haud multum discrepat.

Fol. 111. ad lin. 4.

Huic convenit *Olinopodium fruticosum Arabicum* summo caule coronatum, *Ziziforan Chalepensis* dictum, *Herbarij Viri à Judæo* quodam apud *Chalepenses* collecti & compaginati, Anno 1690. Fortè etiam *Atochietl* tertia quam alii *Dictamnus* vocant *Nieremberg. 316.* Hujus & altera varietas, angustiori folio, ex *Orientalibus* plagis in nostro *Phytobiblio* conservatur; Idem fortè cum *Clinopodium alpino* rosco *Satureiæ* folio, *Bocc. Mus. Plantar. rarior. pag. 135. Tab. 95.*

Ibid. post. lin. 16.

GOCCULUS *Officinarum.* *Cautacudde Malabarorum.* à *Natsjatam.* *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 1.* plurimum diversa, quanquam hujus quoque Arbor est *Convolvulacea Smilacis Virginianæ Canellæ* foliis æmula. Eademque forsan Arbori: *Aristolochiæ* foliis *Maderaspatanæ*, fructu (florè) parvo *Medicæ* adinstar involuto. *Phytograph.* Ex hujus baccis pulverisatis in aqua communi infusis, fit liquor albuminis Ovi adinstar viscosus, & spumescens; qui si ad cochlearia tria exhibetur, Gonorrhææ medetur.

Ibid. post. lin. 30.

COLUTEA *Rhodiensis* *Vesicaria*, *Scorpioidis* foliis parvis, floribus & *Vesicis*, vulgari paribus.

Fol. 112. ad lin. 6.

Deleatur Vox *Cretica.*

Ibid. ad lin. 11.

An frutex innominatus ultimus *Marcgrav. lib. 2. cap. 15. fol. 82.* Hanc autem eandem plantam esse cum nostro *Cynophallophoro* velit, *D. Sloan. Cat. Jam. 153.* At pleraque his similia falso exponit, quæ prorsus veritati refragantur; quibus conjecturâ colligi potest ea non oculatâ fide, sed narratione potiùs ab aliis accepisse, aut ex *Iconis* nostræ nudò inspectu, deceptione visûs errasse.

Ibid. ad lin. 15.

An *Colutea* affinis fruticosa argentea, floribus spicatis è viridi purpureis, siliquis falcatis, *Cat. Jam. 142.*

Ibid. ad lin. 22.

Hujus fortè affinis est *Tlalchichicpatli*, *Nov. Hispan. apud Recc. fol. 421.*

Ibid. ad lin. 29.

Nilachettu Gentilium Indorum, & *Auverrochedde Malabarorum* siliquis rectis.

Ibid. ad lin. 32.

Colutea affinis fruticosa, floribus spicatis purpureascentibus, siliquis incurvis, è cujus tincturâ *Indigo* conficitur, *Cat. Jam. 141.* Ad hoc genus *Plantar.* meritò recentiori potest *Yztacpatli nona. Hernandez apud Recc. 451. ab Ind. Or. Sub titulo Etemmurre* aliquando accepimus.

Colutea Indica *Galega* folio & siliquâ, floribus purpureis ex *Insulâ Johannâ*.

Fol.

Fol. 113. post lin. 4.

Colutea parva Malabarica foliis hirsutis, siliqua scorpioide brevi. *Man-Todda-Vaddi*, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 22.* *Mimosa Malabarica* foliis pilosis, non spinosa minor, flore papilionac. luteo, siliquis angustis articulatis, *Commelin.* *Not. in loc.*

Ibid. post lin. 9.

CONFERVA marina trichoides, f. *Muscus marinus* virens tenuifolius, *Phytograph. Tab. 182. fig. 6.* *Fucus* f. *Alga viridis capillaceo folio CBP.* Hæc, nescio quo casu, in *Almagest. nostr.* omissa est.

Ibid. ad lin. 20.

Varia etiam foliis tripartito divisis, unde *Convolvulus* folio hederaceo anguloso, flore dilute purpureo, *Cat. Jam. 56.*

Ibid. ad lin. 35.

An *Clematis* baccifera villosa, rotundo & umbilicato, *Plumier. Descript. des Plantes de L'Amerique fol. 78. Tab. 93.*

Ibid. ad lin. 37. add.

Phytograph. Tab. 324. fig. 1.

CONVOLVULUS *Africanus* albus, seminibus calyce longissimo immeris, folio subrotundo, ad unum plerumque latus crenâ singulari donato. In *Hort. Pharmaceut. Chelseian*, ex semine oriundam Observavimus. Forè *Xiuh-cocolin* seu *Planta contortiva*, *Hernandez apud Recc. fol. 123.*

Fol. 114. post lin. 7.

Convolvulus maritimus rotundifolius maximus, summo fastigio bisuleus, ex *Insula Johanna*. Hujus plantæ folia sunt forma & magnitudine foliorum secundæ speciei *Mandaru*, f. *Chovannæ Mandaru*, in *Horto Malabarico* depictæ.

Ibid. ad lin. 8. adde.

Phytograph. Tab. 324. fig. 3. magnam intercedit similitudinem, quoad folia saltem inter hunc nostrum *Convolvulum* & *Nasturtij Indici* folio anguloso picturam, in *J.B. Tom. 2. fol. 176. ex Dodonæa* exhibitam.

Ibid. ad lin. 11.

Cacamonic Tlanoquiloni f. *Barata purgativa*, *Hernandez apud Recc. fol. 299.*

Ibid. ad lin. 14. post fol. 16. add.

Item *Pararo ejusd. fol. 52.*

Ibid. ad lin. 15.

Spinachiz foliis; *Convolvulus* radice tuberosâ esculentâ, *Spinachiz* folio, flore albo, fundo purpur. semine post singulos flores singulo, *Cat. Jam. 53.*

Ibid. ad lin. 19.

Turpetum verum f. album ex *Batavia Jacatrensi* missum *Cleyeri*. *Turpetum Indicum* liscifolii, caule volubili, *Hernandez apud Recc. 180.* Ignotum planè fuit *Græcis*; Hi non tantum virtutes ejus, verum etiam totam plantam ignorasse videntur. Indè est quod Illi, qui *Dioscoridem* in *Plantarum* notitiâ nihil latuisse existimant, & varias & totâ specie diversas plantas idem referant; cum enim radicem alicujus plantæ esse omnes ferè arbitrati sint, ad quamnam tamen referri deberet, convenire aut certo docere non potuerunt; Sed in diversas acti partes,

alii

alij Alypi, alij Pichynsa, Thapsia alij: Alij Tripolij radicem esse, sunt arbitrati: Debemus ejus inventionem & in humanos usus deductionem Arabibus, qui ut non de paucis aliis è purgantium numero, ita quoque de hoc ipso, ejusque viribus, primi omnium aliquid memorie prodidere.

Fol. 114. ad lin. 21.

An fortè hæc sit Tepehoila-Capitzxochitl, s. Hoila-Capitzxochitl, Saxivolvula Hernandez apud Recc. 211. Cui & Hochotzontecomatl, seu Caput Senis, ejusd. Hernandez fol. 287. quodammodo convenire nobis videtur.

Ibid. post lin. 21.

Convolvulus Indicus amplissimo subrotundo folio caule alato, Turbith s. Tiguar Garciae quibusdani putatis. Hujus enim radix, usu etiam, & figurâ Turpeto convenit. Shevada Malabarorum. An fortè Kartu-Kelengu, Hort. Mal. Part. 11. Tab. 51. Huic fortè rectius Tepehoila-Capitzxochitl s. Saxivolvula Hernandez pertinet ut supra. Turpeti altera species, Utriusque Indiae alumna.

Ibid. ad lin. 24.

Vid. Phytograph. Tab. 325. fig. 1.

Ibid. ad lin. 37. add.

Vid. Phytograph. Tab. 167. fig. 1. Convolvulus polyanthos, folio subrotundo, flore luteo, Cat. Jam. 55. Ubi pro hujus Synonymo hunc nostrum Convolvulum, indubitanter subjungit Autor, & dubium movet; An sit Antholisthos convolvulaceus Americanus Plukenet, & ad suum refert Convolvulum luteum polyanthum Plumier fig. 102. ac si has tres & plurimum diversas plantas, in unam eandemque coalesceret: Excusandus autem erat hujus Catalogi Autor, ut qui non exacte noverit, ac ideo plurimis in locis miscuerit quid pro quo.

Ibid. ad lin. 44.

An Clematis baccifera glabra, rotundo & umbilicato folio, Plumier Tab. 93.

Fol. 115. ad lin. 16.

An Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obsito, flore albo, folio hederaceo anguloso.

Ibid. post lin. 16.

Convolvulus, s. Scammonia Indica latifolia, Cullecaucana Malabarorum. Fortè Tiru-tali, Hort. Malab. Parr. 11. Tab. 53. Convolv. Malabaric. floribus ex albo purpurascens, Commelin. Not. in loc.

Convolvulus Scammonia majoris folio subrotundo, flore albo minore, ex Virginia. Fortè Scammonia rotundifolia Virginiana Park. Theatr. Pl. 164.

Convolvulus Scammonia subrotundis foliis villosis, flore amplo purpureo, ex Insula Johanna.

Convolvulus purpureus minor, Scammonia subrotundis foliis glabris, ex Insula Johanne.

Ibid. ad lin. 18.

Moolepuncodee Malabarorum.

Ibid. ad lin. 25. post Park. Theatr. add.

In Appendice fol. 1677.

Ibid. post lin. 32.

Convoyulus Virginianus leviter hirsutis & oblongis foliis flore maximo albicante.

Fol.

Fol. 115. ad lin. 35.

Convolv. folio lanato in tres lacinias diviso, flore oblongo purpureo, Cat. Jam. 55.
 Convolvulus minor *Virginianus*, Passifloræ folio trilobato glabro, flore candido.
 Idem foliis hirsutis, floribus amaranthæ purpureis.

Ibid. post lin. 37.

Convolvulus *Indicus* capreolis donatus, foliis Bryoniæ albæ divisis, *Sandaracæ* colorem referentibus, floribus striatis, per limbum flavis, & in collo ex viridi albicantibus, Kindici-valli, Hort. Malab. Part. 8. Tab. 27. Todwallewel Ceylanensibus dictus.

Ibid. ad lin. 42.

Hujus semen aviculæ capitulum, cum suo rostellis, & oculis prominentibus, ap-
 primè refert, ut satis artificiosè depictum invenies, in Hort. Malab. ubi supra.

Ibid. ad lin. 44. post fig. 6.

Turbith nigrum *Cleyera Breyne* Prodr. 2. 102. Convolvulus *Indicus* hirsutus ni-
 ger heptaphyllus, flore luteo, ejusd. ibid.

Fol. 116. ad lin. 11.

An Convolvulus major heptaphyllos, flore sulphureo odorato, Cat. Jam. 55.

Ibid. ad lin. 14.

An fortè Convolvulus pentaphyllos minor, flore purpureo, Cat. Jam. 55. Con-
 volvulus enim pentaphyllos, flore pallidè flavescente, caule hirsuto pungente,
 ejusd. ad quem pro Synonymo refertur; huic nostro non convenit. Huc quo-
 que spectat Convolvulus *Aegyptiacus* quinquefolius *Casparis Bauhini*, JB. Tom. 2.
 fol. 169. Convolvulus foliis lacinatis vel quinquefolius, CB. prodr. 134.

Ibid. ad lin. 20.

Huic accedit Convolvulus longifolius azureus, niveo umbilico erectus, *Afri-*
canus, Beccon. Mus. Pl. rar. pag. 76. Tab. 63. & Tab. 105.

Ibid. ad lin. 43.

Visnecrantæ Malabarorum.

Ibid. ad lin. ult.

Convolvulus *Curassavicus* *Elatinæ* majoris folio, flore cæruleo parvo, PBP. app?

Fol. 117. ad lin. 6. post fig. 5. add.

Coolaguttee Malabarorum.

Ibid. post lin. 8.

Convolvulus minimus *Ind. Orientalis*, *Euphrasie* foliis, capsulis bullatis.

Ibid. ad lin. 13.

Vashacoodde Malabarorum, Hujus succus amatorius ab *Indigenis* habetur.

Ibid. post lin. 24.

CONYZA minor *Ind. Orientalis* *Nelapú* Malabarorum.

Ibid. ad lin. 25.

An *Chrysocome* flore aureo amplo, *Conyzae* medice foliis, Capit. Bon. Spei. Breyne.
 Prodr. 2. 32.

Ibid. ad lin. 28.

An *Conyza Pannonica*, lanuginosa ejusd. Casp. Bauh. Pin. 265. (i. e.) *Conyza*
tercia Austriaca, legitima fortè, *Discoloris*, Claf. Hist. 2. fol. 20.

Fol.

Fol. 117. post lin. 39.

Conyza minor Hispanica ex Oris *Gaditanis*. An *Conyza minor exotica*, CBP. 265.

Conyza minor Batrica Clus. Cur. posterior. fol. 32.

Conyza aromatica frutescens Mauritanica Camphorata foliis ad margines pilosis, flore magno flavo, ex flosculis fistulatis composito. An *Chamaecyparissus canascentis foliis*, *Stachadis citrinae Italicae*, Breyn. Prodr. 2. An potius *Chrysanthemum frutescens Aethiopicum* odoratum, foliis *Thymelaeae ferratis*, & incanis, ejusd. Breyn. Prodr. 2. 32.

Conyza Aethiopica flore bullato aurea, Pinnastri brevioribus foliis late viridibus. An forte *Elichrysium minus Africanum*, flore aureo, Breyn. Fascic. 22. *Elichrysium Africanum*, foliis & flore *Abrotani* viridis D. Bobart de hac. vid. *Almagest*. app. fol. 400. pl. 2.

Ibid. ad lin. ult. post 204. add.

Senecio Canadensis acris alba, Hort. Regij Bles. 190. Item *Conyza acris annua alba*, ejusd. pag. 256.

Fol. 118. post lin. 4.

Conyza alba major glabra, *Luteolae* foliis *Mariana*.

Ibid. ad lin. 5. post Doodi add.

Apud Nostrates primò observata.

Ibid. post lin. 6.

Conyza Indica *Teucrifolia* flore flavo odorato, *Commelin.* Not. in Hort. Malab. Manja-adea-manjeu, Hort. Malabar. Part. 10. Tab. 17. Hujus flos plurimis flosculis est conflatus.

Conyza arbor Helenoides f. *Insulae St. Helene* *Teucrij* crassius & hirsutis foliis, *Balsamum Tolutani* æmulum, fundens.

Conyza arbor Helenoides, sive *Insulae St. Helene* *Salviae* crenatis foliis, pronè parte albà lanugine incanis, *Balsamifera*. Hæc enim Arbor est quoque *Balsamifera* resinam *Benzoin* haud malè referentem, copiosè fundens. An *Conyza* *Salviae* odorem spirans, CBP. 265. *Planta Bantania* Clus. exot. lib. 4. cap. 23. fol. 22.

Ibid. ad lin. 34.

An *Corallina Opuntioides*, ramulis densioribus, & foliis magis sinuatis atque corrugatis, Cat. Fam. 4.

Ibid. ad lin. 39.

Corallina nervo tenuiori, fragiliorique internodia longiora necente, Cat. Fam. 4.

Ibid. ad lin. 41.

An *Corallina* major, nervo crassiori fuciformi, internodia breviora necente, Cat. Fam. 4.

CORALLINA geniculata, mollis, internodiis rotundis brevioribus, nostras. In Oris *Angliae* nostræ partibus *Orientalibus* invenitur.

Ibid. ad lin. ult.

Fucus (forte) cævus geniculatus *Brasiliæ* Breyn. Prodr. 2. 49. An *Fucus* marinus *Coralloides* minor fungosus, albidus, teres, segmentis in summitate planis, Cat. Fam. 5.

Fol. 119. ad lin. 2.

Hæc autem ad Potamogeira marina potius accenseri meretur, fol. 304. exhibita.

Fol. 120. ad lin. 7.

Deleantur hæc verba scilicet. Coral de Bois Rochfort.

Ibid. ad lin. 8.

Araboutan s. Pseudo-santalum rubrum Brasiliense Jonston. Dendrograph. 456.

Ibid. ad lin. 11.

amilo pattee, nostratibus vulgò.

Ibid. ad lin. 12.

Muracoontan Malabarorum.

Ibid. ad lin. 22.

Pisum cordatum non vesicarium, Cat. Jam. 111. ubi nimis audacter dubium movetur, an sit Arbuscula nostra Barbadosis amplexicaulis triphylla, Mail-elou Malabarica foliis tenerioribus, & petiolis alatis, Phytogr. Tab. 145. cum inter has plantas, nulla vel remota intercedat similitudo.

Ibid. ad lin. antepenult. post fig. 6.

Hujus arboris bacca in Phytogr. depicta sunt calycibus Orbata.

Fol. 121. post lin. 4.

CORNUS Malabarica foliis Nymphææ, Raij Hist. Pl. 1537. Tsjerou-punna, Hort. Malab. Part. 4. Tab. 39.

Ibid. post lin. 16.

CORU arbor pumila Malo aureæ similis, floribus luteis Acoftæ. Aromat. cap. 13.

Coru Canarica Arbuti vel Malo aureæ similis, JB. Tom. 1. fol. 89. Lusitanus Indiarum Incolis Herba Malavarica nuncupatur, quoniam (fortasse) Malabarenses ejus usum ad cujusvis generis dysenterias curandas primò docuerunt: Coru arbor. The Costive-Tree of Parkinson, 1663. Corutæ Malabarorum.

Coru Indorum Mali aureæ foliis, floribus albis; Parencoruttee Malabarorum. An Mal-Naregam, Hort. Malab. Part. 4. Tab. 12. s. Malus limonia pumila sylvestris Zeylanica, D. Herman. Commelin. Not. in loc. Hæc autem est de Pruniferarum censu. An fortè Coru s. Herba Malavarica Garcie ab Orto Hist. Pl. lib. 2. cap. 7.

Coru Indorum Limoniæ folio grandioribus aculeis horrida. Perencalla Malabareis.

Benkara (fortè) Hort. Malab. Part. 5. Tab. 35.

Ibid. post lin. 20.

CORYLUS Indica nuce majore, calyce magno calloso, in plures lacinias diviso, subtus asperâ hirsutic hispido. Avellana pumila, Byzantina Clus. Hist. 1. fol. 11. Avellana peregrina humilis, fructu majore, CBP. 418. in Museo Cortesiano mihi primò conspectus, ab Ind. Or. allatus.

Corylus Virginiana nuce parvo, rugosâ amplissimâ sede, cætero putamine, nigro, levi.

Ibid. ad lin. 27.

Hanc verò Conyzam facit, Cat. Jam. 124. ubi sub hoc titulo exhibetur, scilicet Conyza fruticosa flore pallide purpureo, capitulis è lateribus ramulorum spicatim exeuntibus. Est mihi Arbuscula baccifera.

Fol. 121. ad lin. 41. post 1379. add.

Hoc autem cum Crithmo suo maximo flore Asteria Asteri max. confundit. Casp. Bauhin. in Pinac. 288. Cum inter Crithmum Chrysanthemum, & hoc nostrum, plurimum est discrimini; nostrum quoque multo est ignotius, & inventu rarius, Planta paucis obvia locis, & plurimis rei Herbarie studiosis hodie dum incognita.

Ibid. post lin. ult.

CROCUS *Æthiopicus* angustioribus Sisyriachij foliis, flore ex albo & purpureo striis aurcis variegato, ex Prom. Bon. Spei.

Fol. 122. ad lin. 3. post 50. add.

An *Cyanus* arborescens *Syracis* folio *Africanus* ejusd. Br. Cent. 180.

Ibid. ad lin. 10.

Carpakelugelepe *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 15.

Janapachidde *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 15.

CROTALARIA *Gentifz* folio, & filiqua ferruginea lanugine densius villosa. *Janachidde* *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 19.

A *Malabazis* *Varakelugelepe*, à *Gentilibus Indis* *Galakachitru* nuncupatur.

Ibid. ad lin. 22.

Pseudo-Lathyrus luteus hirsutus, filiquis tumentibus, continentibus duplicem seriem seminum, *Banisteri*. Cat. Vieg.

Ibid. ad lin. 24.

Pseudo-Lathyrus luteus glaber, filiquis tumentibus duplicem seriem seminum continentibus. ejusd. ibid.

Ibid. post lin. 30.

Crotalaria triphylla minor. *Æthiopica* flore obsolete purpureo.

Ibid. ad lin. 34.

Crotalaria trifolia fruticosa, foliis rotundis lacinis, floribus spicatis e viridi luteis, fructu pubescente, Cat. Jam. 141.

Ibid. ad lin. 36.

Gentifz Malabarica pentaphylloides, flore amplo aureo flavescente, filiquis bullatis. *Commel.* Not. in loc.

Ibid. ad lin. 39.

Huc forte spectat *Crotalaria trifolia* fruticosa, foliis glabris, flore e viridi luteo minore, Cat. Jam. ibidem.

Ibid. ad lin. 41.

Huc valde similis ex *Insula Palma* nuper est allata plantula, cui nomen dedit *Polygonum Serpylli* foliis, ex adverso binis, sericea coma candicante.

Fol. 123. ad lin. 4. add.

Vid. *Fagaras*.

Ibid. post lin. 6.

CUCUMIS *Egyptius* Chate JB. Tém. 2. 248. ex *Prosp. Alpino* de Pl. *Ægypt.*

Fol. 123. ad lin. 15.

Post folio, addatur molli.

Ibid. ad lin. 18.

Cucumis Anguriz folio latiore (aspero) fructu minore candido, spinulis obtusis muricato, Cat. Jam. 103. Aspero autem malè additur pro Epitheto, est enim folio molli.

Ibid. ad lin. 22.

A Præcedenti plurimum diversa. Cucumis minima fructu ovali nigro lævi, Cat. Jam. 103.

Ibid. post lin. 22.

Cucumis parvus Marianus. Bryoniz albe foliis minoribus polycarpis.

Ibid. post lin. 23.

Cucumis Canadensis monospermus fructu parvo etinaceo, plurimis sibi invicem stelliformiter conglomeratis. Sicyoides Canadense fructu echinato, Turnesort. Elem. de Botan. 86. planch. 28. Cucumis Africanus echinatus minor, Hystrix Vegetabilis vulgo, Paradis. Batav. 133. ubi Leon satis accuratè depicta est sed descriptio minus convenit, à proximè præcedenti (fortè) non diversa.

Ibid. ad lin. 29.

Peapepiangkai Malabarorum.

Ibid. ad lin. 41.

Momordica f. Charantia Ind. Or. fructu aurantio majore, oblongo, seminibus albis, Breyn. Prodr. 2. 73.

Cucumis puniceus Indicus, subrotundis foliis, fructu pyramidali lævi, seminibus ad oras angulatis. Balsamina Cucumerina folio amplo, flore candido, fructu glabro, ex flavo rubescente, Commelin. Not. in loc. Padavalam, Hort. Malab. Part. 8. Tab. 15.

Cucumis puniceus Africanus, Bryoniz albe foliis, ex Promont. Bon. Spei.

Cucumis Indianus minor, foliis Epimedij, floribus filamentosis, semine albo undulato. Tori-pira, Hort. Malab. Part. 8. Tab. 17. Balsamina Cucumerina fructu viridi, stiliis albis, Commelin. Not. in loc.

Fol. 124. ad lin. 8.

Janipaba Brasiliensium Pisonis lib. 4. cap. 16. Ab hac diversa est, & fortè idem cum Panitsjika-maram, Hort. Malab. Part. 2. Tab. 41. Quæ potius de Anonarum f. Mespilorum Sappadilliz distorum genere est, ut mecum existimo.

Ibid. post lin. 21.

CUCURBITIFERA arbor spinosa foliis ferè Ficis, fructu Pomi magnitudinè, & formâ; seminibus albis serie eleganti massula nigra, immerfis. Hujus fructum ex Prom. Bon. Spei. Secum adferebat perhumanus Vir Dominus Jacobus Cuningham. Scotiâ oriundus, & Chirurgus peritissimus.

Ibid. ad lin. 30.

Ettee Malabarorum, Muttee-Chettu Gentilibus Indis.

Ibid. ad lin. 38.

Sed has duas licet in diversis & distantibus, Hort. Malabarici locis, & pro diversis illic exhibitas invenimus, si non prior, utpotè Arbor procera crassa, & erecta, hæc vero inter Frutices scansiles & Convolvulaceos, vicinas Arbores amplexantes

amplexantes poneretur, utramque pro una eademque plantâ nos acciperemus. An hujus fructus grana sint, idem cum nucula Taphet, Herculis Saxoniæ JB. Tom. 1. lib. 3. 341.

Fol. 124. post lin. 38.

Cucurbitifera Malabathri foliis scandens Catolongay & Contarâ Philippinis Orientalibus dicta, cujus Nuclei Pepitas de Bysayas aut Catbalogan & Fabæ Sancti Ignatii ab Hispanis; Igasur & Mananaog (i.e.) Victoriosi, Insularis nuncupati. Sive Noces Vomicae genuinæ Serapionis P. Camelli. Nucis Igasur ope Insularum Indigenæ ab omni contagio se immunes reddi existimant, Ita ut nunc demum mirari desinam quâ gratiâ Electuarium de Ovo, quo olim Maximilianus, optimus & prudentissimus Imperator usus est, & quod tantopere deprædicant adversus pestem, Nucem Vomicam recepisse quanquam propter hanc Nucem Casparo Hofmanno de Medicam. Offic. lib. 2. cap. 74. Totum fuit suspectum; præcipuus enim hujus usus est in peste, quâ vulgo Incolæ etiam utuntur cum adversus omnis generis venena, tum ad morsus Serpentium maximè noxiorum, aliorumque Virulentorum Animalium cum intrò sumpta, tum foris applicata. Vulgus etiam Igasur pro cælesti auxilio habet, ad cuncta absolute corporis humani mala amovenda, nullâ habitâ temporis, morbi, ætatis, aut dosis ratione indifferenter exhibet, & adhibet, miraculosque inde subsequentes effectus narrat. Immo Ch. Miralles in suis Collectaneis, hanc Nucem affirmat non tantum virtutem habere depellendi corporis morbos, sed Incantationibus Magicis & malignis Spiritibus speciali quadam oppositione resistendi; Quæ apud Plinium, lib. 13. cap. 4. Videntur inter Palmæ fructus reponi. Cum inquit, Quibusdam offem continetur lunatumque, dente contra Fascinantes religione positum. Nucis Igasur denique vires & virtutes tam Experientia sua, quam relatione acquisitas, nec non de variis Indorum aliorumve Curiosorum & observationibus & Adnotationibus excerptas ac collectas ab eodem P. Camelli videtis in Transact. Philosoph. Lond. edit. No. 250. Quæ, si res verè & sine furo narretur, ritè concludamus, Præstantissima Naturæ dona quoad nos saltè, sæpè latent in obscuro.

Cucurbitifera Ind. Or. Canella foliis lætè virentibus fructu minore. Nellawattachedde Malabarorum. Solanum arborescens Indicum foliis. Napecæ minoribus, fructu rotundo duro, & semine orbiculari compresso minoribus, Breyn. Prodr. 2. 93. Scheru-catu-valli-Caniram, Hort. Malab. Part. 7. fol. 5.

Fol. 125. ad lin. 2.

Deleantur hæc verba scilicet. An Vengu Sinensium Mart. Atl. Sinens. Lusitanis: Jamboa, vid. Jonst. Dendr. fol. 27.

Ibid. ad lin. 9. post JB.

Arbor ferens Sirifoles Nierembergij 3150.

Ibid. ad lin. 12.

Valanya Malabarorum & interdum Moellecruetto Eorundem.

Ibid. post lin. 12.

Cucurbitifera trifoliata baccata similis Arbor Ind. Orient. Villevittree Malabarorum.

Ibid. ad lin. 13.

Tota linea expungatur.

Fol. 125. ad lin. 15.

Vitex Indica foliis solitariis amplissimis, flore maximo, *Breyn. Prodr. 2. 42.*

Ibid. ad lin. 24.

In Palma quoque Insula una ex Fortunatis oritur hæc arbor.

CUPRESSUS nana Mariana fructu cæruleo parvos

Cupressus femina *Goenfs.*, rarioribus foliis viridibus, galbulo minore.

Cupressus *Goenfs.* mas, foliis crebrioribus coælis.

Cupressus *Goenfs.* confertissimis crispatis foliis, circa virgulas triplici serie dispositis.

Nos enim commonefecit ex propria sua Observatione Reverendiss. in Deo Pater

Henricus Compton. Episc. Lond. Has elegantes arbores non ad Cedros, nec Sabinas,

sed potiori jure ad Cupressorum genera referendas esse, vid. *Sabin. Almag.*

An harum sit *Habbel* fructus *Clus. Hist. fol. 37.* Nisi quis malit illum ad *Ahoc-*

hoetl., s. *Abietem Mexicanam* minorem *Hernandez* referre.

Ibid. ad lin. 35.

Ambaigtinga arbor de *Laet. Ind. Occident. lib. 15. cap. 8.* Et fortè *Tzina Can-*

cuitla Quauhiti, s. Arbor ferens Gummi simile Stercori *Vespertilionum Laccifera*,

Hernandez apud Recc. 58. Quæ folia fert exilia pennas avium imitantia.

Cupressus nana compressis *Taxi* longioribus, & tenuioribus foliis, *Africana. Hort.*

Uvedalensis, sub *Chamæcyparissi Africane* titulo missa fuit.

Ibid. ad lin. 39.

De hæc plura *fol. 397. Hujus Almag. plant. 7.*

Fol. 126. ad lin. 4.

Post capsulis, add. velut in vesicam.

Ibid. ad lin. 10.

Viscum *Garyophylloides* tenuissimum, è ramulis Arborum Musci in modum de-

pendens, foliis pruinæ instar candicantibus, flore tripetalo semine filamentoso,

Cat. Jam. 77. Ubi magno sanè versatur in errore hujus compilator, propterea

quòd varia hoc in loco sunt promiscuè posita.

Ibid. ad lin. 12.

An *Cuscuta* inter majorem & minorem media, filamentis longis & fortibus, la-

tissimè super arbores vel campos se extendens, *Cat. Jam. 85.*

Ibid. ad lin. 14.

Cootan Malabarorum.

Ibid. post lin. 18.

CYANUS *Æthiopicus* rigidis capillaceis tenuissimis foliis trifidis ex *Promont.*

Bon. Spei.

Cyanus spinosus *Cæticus* *Ponæ* vid. *Stoebe.*

Ibid. ad lin. 36.

Cynoglossum max. *Virginianum* folio aspero viridi, flore parvo albicante.

Ibid. ad lin. 39.

Omphaloides *Turnesortij* *Elem. Bot. 117.*

Ibid. ad lin. 42. & ult.

Acaciis affinis arbor siliquosa, folio subrotundo singulari, flore stamineo albido,

filiqua tereti, ventriosa, cujus interior tunica est mucosa, & eleganter miniata,

Cat. Jam. 153.

Fol.

Fol. 127. ad lin. 2.

An Ceratonix affinis arbor siliquosa, Oleæ folio, flore tetrapetalo, albido, siliqua tereti, ventriosa, cujus interior tunica est mucosa, & elegantèr miniata, Cat. Jam. 153. Ubi perpetuum refertur ad nostram Salicem folliculiferam, obtusis foliis candicantibus, Americanam: Eo quod istis notis in descriptione recensitis, hujus folliculi neutiquàm respondent.

Ibid. post lin. 2.

CYNORYNCHIUM Nov. anglicanum Digitali accedens, Herba quadricapularis, floribus albis, nictum canium referentibus. Dogs-bout & Dogs-spout, vulgè vocatum. Kuropiffon. An Digitalis folio oblongo serrato, ad foliorum alas florida, Cat. Jam. 60. Huic forsàn Odel-Odagam, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 43. accenseri meretur.

Ibid. ad lin. 6.

An potiùs Karij-Kandel & Kanil-Kandel ejusd. Hort. Malab. Part. 6. Tab. 33. fol. 59. An Mangle Laurocerasi foliis, flore albo tetrapetalo, Cat. Jam. 156.

Ibid. post lin. 8.

CYPERUS Milianus ex Provincia Mariana paniculà villosà aureà.

Ibid. ad lin. 14.

An Gramen Cyperoides minus spicis compactis subrotundis flavicantibus, Cat. Jam. 36.

Ibid. ad lin. 23.

An Cyperus maximus, paniculà sparsà foliacea, Cat. Jam. 35.

Cyperus Indicus paniculà sparsà, & speciosà. Milecorea Malabarorum.

Cyperus major Virginianus, summo caule elegantissimè particularus, foliolis sursum maximè elongatis.

Cyperus minor Virginianus panicularum spiculis lineis atropurpureis amcenè striatis.

Ibid. ad lin. 26.

An Cyperus max. paniculà minimè sparsà ferruginea, capitulis compactis, crassioribus, Cat. Jam. 35.

Ibid. ad lin. 30.

An Cyperus rotundus gramineus ferè inodorus, paniculà sparsà compressa viridi, Cat. Jam. 35.

Cyperus Americanus paniculà polydactyloide, strigosis spiculis, ex Terra Mariana.

Ibid. ad lin. 44.

Margaritæ Egyptiæ Autore libri Aristotelis de Plantis ejusd. Dalechampii in Plin.

Margaritæ Gingemice Ebu Jeale, quas Interpretis non satis Romanus perlas Gingem appellat, & tubercula sunt Cyperi Asphodeloidis Marantæ lib. 2. de cognoscend. Simpl. cap. 2. Asserente Hieronymo Kelschio Epist. Joan. Maithæo Fabro ad calcem Strychnoman. edit.

Fol. 128. ad lin. 32.

Axixzoca Huilizpatlj Yanguitlanensis, Hernandez apud Recc. 183. Adèò huic nostræ consimilis est, ut aliis floribus ab ea distinct, in illius species, nobis videretur referenda.

Fol. 128. post lin. 32.

CYTISUS *Africans angustifolius, sericea lanugine asperatus, spica Lagopoides,*
ex *Prom. Bon. Spec.*

Ibid. ad lin. ult.

An **Cytisus** *Hispanicus* filiquis *Onithopodij*, *CB. Prodr. 147.*

Fol. 229. post lin. 6.

Cytisus *Lagopoides*, hirsutis subrotundis foliis scabris, & punctatis, *Prom. Bon. Spec.*

Cytisus *spicatus* foliis subrotundis, densis, & pilosis, floribus purpureis parvis,
Prom. Bon. Spec.

Ibid. ad lin. 11.

An **Cytisus** *arboreus* foliis obtusis glabris, foliorum pediculis alatis, *Chen. Jam.*
141. Mirè enim ludis *Natura* pro diversâ ætate, in hujus foliorum varietate;
Folia namque nana minora, sunt multo majora, & pediculis plurimum alatis
ornata.

Cytisus *trifolius*, *Juniperinis* foliis, floribus luteis, in spicam densiorem adactis,
Prom. Bon. Spec.

Cytiso *affinis*, singularibus *Juniperinis* foliis, floribus luteis spicata, ex *Prom. Bon. Spec.*

Cytiso *affinis* *Arbuseula Monemotapensis*, villosis & sericeis foliis, solitariis, grandioribus *Myrti*.

D.

Fol. 129. ad lin. 27.

Exhibetur quoque ipsissima planta, ad fol. 74. *Hujus Almagesti*. Sub titulo
Cachryos Siculae, semine fungoso, striato, lanuginoso, &c.

Fol. 130. ad lin. 12.

Therionarcha Cappadocica *Plinij* putata, lib. 24. cap. 17.

Ibid. post lin. penult.

DENS LEONIS *Virginianus Hyoseridis minoris* folio, radice bulbosa.

DENTARIA *triphyllus*, *Clus. Hist. CBP. 322. Moris. Hist. 2. 254. Coralloides*
enneaphyllos, *Clusij JB. Tom. 2. fol. 902.*

Dentaria *pentaphyllos* *CBP. ibid. Coralloides prima quinquifolia, JB. Tom. 2. 900.*

Dentaria *heptaphyllos* *CBP. ibid. Coralloides altera sive Septifolia, JB. Tom. 2. 901.*

Aconiti *Lycostoni* genus aliud *Dalechampij Hist. Lugd. 1744.*

Ibid. ad lin. ult. add.

Siliquosa. Huic fortè congener est planta, *Aconitum Lycostenum Dodonæi ex*

Codice Cesareo Hist. Lugd. 1741. Et dici possit.

Dentaria peregrina, *Urticæ* facie siliquosa, monophyllos.

Fol.

Fol. 131. post lin. 4.

Dentaria Virginiana Nasturtij sapore pentaphyllæ. De quo plura sis vide apud Append. hujus Almag. fol. 400.

Ibid. post lin. 9.

DICTAMNUS *Æthiopicus* foliis Majoranæ, spissâ lanugine tomentosis, odore suavi & aromatico, à Reverend. D. Stonefræet habuimus. Neophytus quidam è nostratibus, sub titulo Amaranthoides, Polygoni folio hirsuto, Lupuloides, ex *Insula Sanctæ Helenæ* exhibet; Quod sanè in memoriam revocat querimoniam illam justam *Simonis Pauli Quadrip. Class. 3. pag. 25.* Ubi dicit, quæ *Parrhesia* nomina scilicet imponendi herbis, plerique Nautarum *Maris Balthici Hesperiam* petentes quoque abutuntur, dùm *Origanum Heracleoticum* dictum appellant *Spanighen Hopfen*, idè quod Verticillos aut conos instar Lupuli salictarij squamatis compactos habeat; cæteroquin Lupulo hæud conveniens; inde concludamus: Nihil sanè insulsius videtur, quam omnem occasionem in publicum prodeundi arripere, & vel nugis Venditandis famam aucupari; à quo quantum absit Neophytus noster, Centuriæ suæ testantur. Mihi nefas semper fuit conspurcare chartas crudis quibusdam & incertis Observationibus Plantarum, quarumque notitia vix unâ constet experientiâ: Mos iste eorum est, qui ut alios præveniant, & famam Inventorum sibi vendicent, temerario ausu diluta, atque ridicula proponunt, in quos convenit Poeta illud,

Parturiunt Montes, nascetur ridiculus mus.

Fol. 131. post lin. 11.

DIGITALIS *Mariana* ferratis densioribus rigidis & angustis foliis, semine Feoppyri triquetro.

Digitalis Verbesinæ foliis, è regione binis, *Americana*, capsularum apicibus longissimis filamentis donata; ex *Terrâ Marianâ*. Huic, sunt capsulæ pyramidales longissimis filamentis in vertice instructæ, cum spicâ florum *Adhatodæ* instar compactiore.

Digitalis Virginiana, *Panacis Coloni* foliis, flore amplo pallescente. *Digitalis* flore pallidè transparenti, foliis & caule, molli hirsutie imbutis. *Banister. Cat. Virginian.*

Digitalis Virginiana, *Lysimachia* siliquosæ foliis glabris, floribus amplis pallidis, propè fummitatem caulis; *Digitalis* flore pallido transparenti, foliis glabris, *Banister. Cat. Virg.* Idem Neophytus nimis audacter has elegantes & verè capsulares plantas, *Dracocephala* improperat. Huic Classi & fortè spectat *Bahel-tjulli*, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 87.* *Digitalis* affinis *Indica* *Blattariæ* folio, flore rubicundo, *Commelin. Not. in loc.*

Digitalis minor, luteo parvo flore, *CBP. 244. in Prodr. descripta.*

Digitalis major, luteo, vel pallido parvo flore, *CBP. ibid.* *Digitalis* flore minore, albidior, *Gesner. Col.* à priore plurimum diversa.

Ibid. post lin. 13.

Digitalis lutea elatior, Jaceæ nigræ foliis, *Banister. Cat. Stirp. Virgin.*

Digitalis Virginiana, foliis Rutæ caninæ divisis, floribus amplis, ex luteo pallescentibus.

lescentibus. Fortè Digitalis lutea altera, foliis tenuius dissectis, thecis florum foliaceis, *Banist. Cat. Virgin.*

Fol. 131. post lin. 15.

Digitalis *Virginiana* rubra, folio & facie Antirrhini vulgaris, fortè Digitalis rubra minor, labiis florum patulis, foliis parvis angustis, *Banist. Cat. Virginian.* Huic etiam extrà dubium accenseri meretur, Quauh-chilpan, *New. Hispan. Terrentij apud Recc. fol. 400.*

Ibid. ad lin. 20.

An Doronicum integro & crasso Hieracij folio, *Bot. Monsp. app. pag. 294.*

DORONICUM *Virginianum* majoribus nervosis foliis, subtus incanis, ad marginem levitè denticulatis.

Ibid. post lin. 27.

Doronicis affinis Planta *Mariana* Solidaginis *Saracenica* foliis, & regione binis, amplissimo melino flore, octopetalo.

Ibid. ad lin. 33.

Ab hac nostraequidem diversa, quapropter & nobis collocetur de novo, Verumtamen non est nova planta, si me, mea non fallit Autopsia.

Ibid. post lin. 33.

Doronicum *Pyrenaicum* Persicae foliis glabrum, *Sch. Bot.* Quod tamen inter nondum descriptas adnumerare non licet, cum jam exactissime cognovi, hanc plantam, eandem esse Consolidæ aureæ Nemorum, *Pona Hist. Lugd. lib. 11. 1271.* (i. e.) Virgæ aureæ magno flore, *CBP. 268.* Consolidæ aureæ Nemorum, Limonij folio, *Adversar. Lob. & Icon.*

Doronicum *Aethiopicum*, Jacae nigrae foliis, subtus tomentosis, *Promont. Bon. Spei.*

Doronicum *Virginianum*, Valerianæ sativæ foliis amplioribus.

Doronicis affinis petraea, Asplenij foliis *Aethiopica*. Aster vel fortè Doronicum saxatile folio Ceterach, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.* An Polypodium *African.* minimum, facie Ceterach, *PBP. Append. de hac vid. Almag. Bot. fol. 336.*

Doronicum pumilum, subrotundo folio, bulbosum, *Prom. Bon. Spei.*

Doronici (fortè) species pumila, Auriculæ Ursi folio glabro, flore saturatè croceo, ex *Prom. Bon. Spei.* Rectius forsàn de Hieraciorum censu reputanda.

Little Oxen the Collier.

Fol. 132. ad lin. 3.

Lepidium humile incanum arvense, *Turnesfortij Elem. Bot. 184.*

Ibid. ad lin. 16.

Hæc planta quamvis annua dicatur *Lobelio*, & albis, radix tamen hyemem perfert, & in plures annos durat, etiam postquam semen dederit, ut rectè notat, *Celeberr. Rajus Hist. Pl. 828.* Qui tamen hoc in loco, & alibi, viz. *fol. 840.* sub eodem titulo, aliam plantam capsulis monospermis, Myagri (fortè) alicujus speciem, huic maximè diversam, describit, ut optimè ante nos animadvertit, *Clariss. Breyn. Prodr. 2. 63.*

Ibid. ad lin. 18. post Chalepense add.

Primis foliis minoribus, & serratis, secundis majoribus, & profunde sinuatis, spissis, incanis.

E

Fol. 132. post lin. 19.

EBENUS arbor Ind. Orientalis, Fagi amplioribus foliis, Anonæ dulcis fructu magno, coronato eduli. Tumbamaram & Carpamaram Malabarorum.

Ibid. ad lin. 27.

Aspalathus arboreus, s. Pseudo-Ebenus Buxifolio, flore luteo parulo, siliqua lata brevi chartacea, semen exiguum reniforme complectente, Cat. Jam. 130. Verum maximo in errore versari hujus Autorem, vel rerum similitudine deceptum, hoc loco scire oportet, ut ex stirpium ipsarum descriptionibus, differentiisque cognoscere licet. Sed admodum quidem miratus sum quod hæc non noverit Sloanus, cum tamen is plus Botanices (ut audio) quam cujusvis alterius Medicinæ partis professorem se dicat; qui de hac Plantâ, intrepidâ & constanti sua asseveratione, nobis etiam errandi adsam præbuit, ex cujus confidentiâ liquet, quàm misere non raro decipiamur, dum nudis Autorum verbis, fidem habemus, nec res expendimus ipsas. Quod & hoc in loco usu venit, cum uni plantæ tribuitur, quæ alteri debentur. Lycio similis frutex Indicus spinosus, Buxifolio, Breyne Prodr. 2. 65. Hort. Medic. Amstelod. cum Icone. Black-Thorn. (i.e.) Spina nigra Nostratibus vulgò.

Ibid. ad lin. 32.

Caunampoondoo Malabarorum.

Fol. 133. post lin. 3.

ECHINOPHORÆ affinis Mariana, Scabiosæ pratensis foliis integro, capitulo splendente, lævi, summo caule coronata. Idem fortè cum præcedenti.

Ibid. post lin. 9.

ECHIUM Virginianum foliis subrotundis asperis, Malagathi in modum, tribus nervis insignitis.

Ibid. ad lin. 10.

Anchusa maxima, Buglossæ minoris facie, Capitulis Bon. Spec. Breyne Prodr. 2. 14.

Ibid. ad lin. 18.

Deleantur hæc verba, an Echium Alpinum luteum CBF.

Ibid. ad lin. 27.

Post flore, add. Siliqua Lentis.

Ibid. post lin. 28.

ELATINES femina affinis Virginiana, Moschatellinæ foliis, flore flavicante.

Ibid. ad lin. 31. post Avicen.

Avicenna suo Garab easdem pene vires tribuit, quas Salici; Corticem ejus quoque in usum venire scribit, & gummi quod incisione effluit.

Ibid. ad lin. 33.

Rapwolfius enim scribit, Aphronitrum (Salem petre vocant) optimum fieri ignis pulveri parando, quo in bellicis tormentis pilis excutiendis utuntur, surcu-

los.

los scilicet extremos cum foliis in cinerem comburi, affusaque aqua macerari, separari, & multa ebullitione coagulari; sed pulverem illum nostrari haud equi-
valere.

ELICHRYSUM *Africanum*, duriusculis Plantaginis foliis glabris, & nervosis.
Chrysocome *Aethiopica* Plantaginis folio, Breyn. Cent. 143.

Fol. 134. post lin. 5.

Elichrysum Aethiopicum, foliis latioribus denticulatis, subtus tantummodo lanugi-
nosis, floribus phæniceis. An Chrysocome *Africana* flore phæniceo, ferracifo-
lia, Breyn. Fasc. Rarior. 20.

Ibid. post lin. 10.

Elichrysum Gnaphaloides crispatis foliis *Monomotapense*. An *Stachas Curassavica*
latifolia incana, PBP. 379.

Elichrysum Aethiopicum, Stachadis citrinae sylvestrioris *Parkinsoni* foliis, capitulo-
rum squamis amplioribus, ex argenteo splendentibus, summo caule glomera-
tis, a Domino Stonestreet accepimus.

Ibid. ad lin. 12. add.

Phytograph. Tab. 325. fig. 3. An *Elichryson*, foliis Abrotani glabris, C. p. Bon.
Spei. Breyn. Prodr. 2. 43.

Ibid. ad lin. 17.

Vid. Phytograph. Tab. 328. fig. 1.

Elichrysum f. *Stachas citrina tenuifolia*, maxime tomentosa, ex *Oris Gaditanis*.

Ibid. ad lin. 20.

Fortè Chrysocome *Africana*, flore phæniceo, angustifolia, Breyn. Fascic. rar. 20.

Elichrysum Aethiopicum, tenuissimis Stachadis citrinae confertis foliis, ramosissi-
mum, comis argenteis; fortè Chrysocome *Africana* flore albo, angustissimis fo-
liis, Breyn. Fasc. rarior. 19. à Dom. Stonestreet habuimus.

Ibid. ad lin. 22.

Elichryson Creticum Matthioli Hist. Lugd. 777.

Elichryson minus Aethiopicum procumbens, Serpylli folio candidissimo, tomento
subtus lanuginosum, flosculis parvis, albis, in umbellam glomeratis.

Elichryson Aethiopicum umbellatum, Chrysanthemi *Cretici* foliis minus laciniatis;
ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. post lin. ult.

EPHEMERUM *Phalangoides*, Liliij convallij foliis scabris; ex *Terrà Marianà*.

Fol. 135. ad lin. 4.

An *Phalangium Africanum* perfoliatum, Breyn. Cent. 180. Planta innominata
prima, *Marcgr. fol. 8.*

Ibid. post lin. 6.

Ephemerum Phalangoides, *Perficariae minoris* folio, *Virginianum*.

Ephemerum Phalangoides, *Perficariae pusillae* folio *Gaditanum*.

Ibid. ad lin. 10. post videtur add.

An *Periclymenum rectum herbaceum*, *Gentianae* folio, folij pediculo caulem am-
biente, *Cat. Jam. 115.*

Fol. 135. ad lin. 23. add.
Phytograph. Tab. 174. fig. 2. Attamen Hermannus in Paradiso suo post obitum edito, ejus *Prodromi* compilatori increpat, quod Graminis alicujus speciem, sub hoc titulo ibi proposuit, proinde quod ipsemet ad Exemplur siccum à se D. *Shenardo* communicatum hoc loco pinxi, Graminis *Dactyli* speciem esse, & non *Ephemer*i palàm agnoscit, pag. 154.

Ibid. post lin. 28.

EPIDENDRON *Ind. Orient.* floribus ex alis in spicam, prodeuntibus. Ched-demeelchedde *Malabarorum*. An Cara-kandel, *Hort. Malab. Part. 6. Tab. 59.* Ab hac etiam Scheru-valli-Caniram, *ejusd. Hort. Malabar. Part. 7. Tab. 4.* hàud prorsus abhorret.

Ibid. ad lin. 30.

Non bene capio quid sibi velit *Cl. Hermannus*, vel ejus editor cum in *Paradiso* suo pag. 152. *Epidendro* nostro *Ephemer*i nomen me adscripsisse dicit. Hujus equidem Iconem ex *Codice Comptoniano* exaratum habui, ast nomen quod huic imponebam, fuit *Epidendron*, & non *Ephemerum*, nec *Ephemer*i nomine ullibi hanc plantam exhibuimus.

Ibid. post lin. 37.

EQUISETUM *Indicum*, mansu arenoso simile, florestens. *Vailumbash Malabarorum.*

Fol. 136. post lin. 4.

ERICÆFORMIS suffrutex *Virginianus*, floribus exiguis, vasculo feminali oblongo, trifariam diviso.

Erica Æthiopica Rosmarini Sylvestris folio, eleganter punctato; flore purpureo tetrapetalo. An *Erica Coris* folio, *Æthiopica*, flore purpureo tetrapetalo, *Breyn. Fust. rarior. 22.*

Erica Rosmarini foliis incanis, *Æthiopica*, floribus Arbutis, magno calyce inclusis.

Erica Coris folio hispido Cerinthoides, *Africana*, *Breyn. Cent. 5.*

Erica Africana, Coris longioribus foliis, Unedonis flore hirsuto, fusco.

Erica Africana, parvis tenuissimis foliis, flore Arbutis fusco.

Erica spicata, floribus oblongis, ex carneo purpureis. An ista *Breyn. Cent. 177.*

Ibid. ad lin. 22.

An *Ericæ formis* suffrutex, flore elegantissimè rubro, *Breyn. Cent. 178.*

Ibid. post lin. 24.

Erica Africana Coridis folio, pilosa, flosculis minutissimis, purpureis, inter ramulos dispersis.

Erica Africana tenuifolia, Unedonis flore, foliis longioribus, cauli appressis.

Erica Æthiopica, foliolis longioribus glabris, cauli appressis, flosculis acetosis, & squamatis calyceibus inclusis.

Erica Æthiopica incana, foliolis Laricis in modum confertis, plurimis staminulis purpureis, pro flosculo, ex squamoso calyce prorumpentibus.

Erica Africana erecta, tenuissimis foliolis, & caule elegantè pilosis, flosculis rarioribus parvis, amene purpureis, inter foliola sparsis.

Erica Africana, floribus perexiguis herbaceis, in spicam dispositis.

Fol. 136. post lin. 24.

Erica Africana hirsuta Thymi-foliolis ternis, circa caulem ambientibus, stoliculis ex carneo purpureis, staminulis refertis.

Erica Serpylli hirsuto folio, pungente, *Africana*, flore purpureo pulchro. An *Erica Serpylli* folio *Aethiopica*, flore purpureo pulchro, *Breyn. Fasc. rariorum*.

Erica aculeata foliorum lanugine cinerea, an? *D. ten Rhine Breyn. Cent. 179*. An hæc fortè sit *Tetralix Atheniensium Plinij Hist. Nat. lib. 11. cap. 16*. Aliorum iudiciis decernendum relinquo.

Erica capitata, f. nodiflora, Cupressiformis *Africana*. Cupressopinulus, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent. 22*. *Erica* florulentis capitulis albis, noduligera; *D. ten Rhine ejusd. Breyn. Cent. 179*. Scabiosa *Africana* arborescens, seu Cupressopinulus, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Scabiosæ affinis, Arbuscula Africana* ericoides, *Sphaerocephalos, Raj Hist. Pl. 1444*.

Erica capitata, seu nodiflora *Africana*, foliolis ad caulem arcuatis, stoliculis staminosis. An *Erica* noduligera, capitulis hirtis, ex purpureo fusci coloris, *D. ten Rhine Breyn. Cent. 179*.

Erica capitata, f. nodiflora *Africana* procerior, Corios grandioribus foliis, variè inflexis, propè summum surculi, in breviores ramulos divaricata.

Erica capitata, f. nodiflora, Corios foliolis rectis, *Aethiopica*.

Ibid. ad lin. 38.

An *Micatlach-Pahoatzli, Novæ Hispan. Terentij apud Rec. 386*.

ERIOCEPHALOS *Bruniades* *Ericæformis*, *Monomotapensis*, capitulis globulorum instar, interius cavis & densa lanugine tectis. An *Erica* arborescens, capitulis lanuginosis, flore flavo, *D. ten Rhine Breyn. Cent. 179*.

Eriocephalos Brunniades Aethiopica, Corios tenuissimis foliolis, & caule pilosissimis, Suffrutex peramænus.

Eriocephalos Brunniades Africana, Lariceis argenteis, & sericeis foliis, capitulis staminibus refertis, globulorum instar, interius cavis & densa lanugine tectis.

Ingeniosus & perhumanus Vir *D. Alexander Brown*, rarissimas has quæ novum Plantarum genus conficiunt, apud *Bonæ Spei* hujusmodi deliciarum feracissimum Promontorium, propriâ manu collegit, & nobis amicè communicavit; Ea propter in Sempiternam sui Nominis memoriam, *Brunniades*, pro harum Cognomine usurpari placuit.

Ibid. post lin. 40.

ERUCA latifolia lutea, f. *Barbarea minor angustifolia, Moris. Hist. 2. 230*. *Eruca* f. *Barbarea* perennis, semine crassiore, *ejusd. H. R. Bles. 71*. *Eruca Barbarea æmula major, ejusd. Prælod. Bot. 263*. An *Erysimo* similis, *Herba Sancti Alberti, J. B. Fem. 2. 862*. *Erysimo* similis, lavis, laciniata, floribus luteis, *CBP. 101*.

Eruca Salemitana faxatilis, laciniato lanceolato folio, *Cupan. Hort. Cathol. pag. 69*.

Eruca Salemitana Iberidis folio, Cupani. Hort. Cathol. 78.

Fol. 137. ad lin. 22.

An fortè *Eryngium minimum trifidum Hispanic. & Italicum, Bocc. Mus. Pl. pag. 81. Tab. 71*.

Fol. 137. ad lin. 28.

Eryngium foliis angustis serratis fatidum, *Cat. Jam.* 127. Qui eandem facit cum precedenti, sed perperam.

Ibid. post lin. 40.

ERYSIMUM latifolium hirsutum, f. *Irio Ethiopica*, ex *Promont. Bon. Spei.*

Fol. 138. ad lin. 13.

An *Herba Mora Italarum Hist. Lugd.* 1338.

Ibid. post lin. 15.

ERYTHROBULBUS *Hellebori albi plicatis foliis*; **Red-bulb** (i. e.) *Bulbus rubeatus nostratibus dictus, Hort. D. Uvedale.* An fortè *Ocoloxochitl Mexicanum, f. Flos Tigridis Hernandez apud Recc.* 276. Fortè etiam *Flos Spiritus Sancti, PBP.* 335.

Ibid. ad lin. penult. post 1804. add.

An *Pseudo-Santalum album, QBP.* 393. *Lignum Sambaranc, Santalo albo per simile, Garciae. Sambaranc Acofta.*

Fol. 139. ad lin. 5.

Euonymus Pannonicus prior, f. *latifolius, Clus. Hist.*

Ibid. ad lin. 12.

An *Frutex Ethiopicus, foliis Alaterni, Brey. Fasc.* 22.

Ibid. ad lin. 16.

Barbadenfibus nostratibus, Syagbarte nuncupatur, an Trachylepos altera Americana, foliis longis mucronatis, Phytogr. Tab. 230. fig. 7. Huic convenit i *Necne*, Inquirendum propono.

Ibid. ad lin. 21.

An *Euonymus Novæ Belgiae, Corni fæminæ foliis, Hort. Med. Amst. cap.* 86. cum *Icone.*

EUONYMUS *Virginiana Teucrij foliis.*

Euonymus Ethiopicus, Rorismarini foliis, seminibus atronitentibus.

Euonymo affinis Africana, Myrtylli foliis grandioribus, ad imum petiolum noduligera.

Ibid. post lin. 21.

Euonymus Marianus, Loti arboris folio, fructu parvo ticcoco. Spirææ Theophrasti similis Frutex Indicus, Phytogr. Tab. 63. fig. 2. Huic maximè convenit, Utræque tamen foliorum formâ à precedenti plurimum discrepant.

Ibid. ad lin. 36.

Paliurus Africana JB. Tom. 1. lib. 6. 37. Cordus etiam apud Dioscoridem scribit, Variam esse apud Autores Paliuri historiam, & in tantâ varietate quicquàm indicare, temerarium fore.

Fol. 140. ad lin. 3.

Delcantur hæc verba, viz. An *Ibiracé Brasiliensibus Marcgr.* 101.

Ibid. ad lin. 9.

Damór Sinenfium, f. Anisum Indicum stellatum, Park. Theatr. Zingi fructus stellatus, sive Anisum Indicum, JB. Tom. 1. lib. 4. 485. Badjany Siberiæ; Cardamomum Siberiense Patavinorum P. Amanni Hort. Bosan. pag. 6. Fœniculum Sinenfe, Francisc. Redi Experim. Nat. 172.

Fol.

Fol. 140. ad lin. 14.

Eupatorium (forte) *Americanum*, Enulte folio minus, Breyn. Prodr. 2. 44.

Ibid. post lin. 14.

EUPATORIUM *Salviæ folio triphyllon*, capitulis amcenè purpureis ex *Provincia Mariand.*

Ibid. ad lin. 18.

A *Nov' anglicanis* nostratibus *Chorom-leatè* nuncupatur.

Ibid. post lin. 19.

Eupatorium *Marianum*, longissimis acuminatis foliis, non perfoliatum, floribus albicantibus.

Ibid. post lin. 23.

Eupatorium *Marianum* *Scrophulariæ* foliis, capitulis globosis, colore caelestino.

Ibid. ad lin. 25.

Conyza Americana, *Urticæ* folio, flore albo, Turnefortij Elem. Bot. 361.

Eupatoria *Africana* graveolens, *Rapistræ* aquaticæ. *Tabernæmont.* foliis, floribus purpureis. In *Horto Med. Chelſeiano*, ex seminibus nutritam, observavimus.

Ibid. post lin. 29.

Eupatorium *Marianum*, *Virgæ aureæ* foliis, floribus aureis umbellatis.

Eupatorium *African.* *Agerato* affinis *Peruvianæ* foliis *Almag. Bot. Append.* 400. Nobis etiam adfertur, ex *Terrâ Mariand.* foliis alternatim positis.

Eupatorium *Marianum*, *Agerato* affinis *Peruvianæ* foliis, binis ex adverso sitis, floribus oblongis.

Ibid. ad lin. 31.

Expunge *Synonymium* sequens, viz. *Serratula Nov'eboracens.* folio levitè crenato, molli, subincano, *PBP.* 375. Quia huic nostræ, adscriptio non placet *Hermann*o vid. *Paradis. Batav.*

Ibid. ad lin. 34.

Fortè etiam *Yztac-cococ-tlacotli*, *Nov. Hispan. Terentij* apud eundem *Recc.* 450.

Ibid. post lin. 37.

Eupatorium *Conyzoides*, f. *Baccharis Africana*, *Raphani* aquaticæ. f. *Verbena* foliis lætè virentibus, capitulis bullatis albis, summo caule glomeratis, *Hort. D.*

Uvedal. Hujus est *Indolis Quaxoxouhqui*, *Novæ Hispaniæ Terentij* apud *Recc.* 406. f. Eupatorium *Mexicanum*, *Solani* vesicarij pallentibus foliis, capitulis summo caule glomeratis. Huc etiam spectat *Cihoapatli-Xantetelco*, *Nov. Hispan. ejusd. apud eund.* 370.

Ibid. ad lin. 39.

An *Conyza major odorata*, f. *Baccharis* floribus purpureis nudis, *Cat. Jam.* 124.

Eupatorium *Limonij* foliis humile, albicante pappo, *Monomotapense.*

Eupatorium *Circææ* foliis incanum, purpurascente pappo, ex *Insula Johanna.*

Eupatorium *Coremandelianum*, palleſcentibus foliis *Alaterni.*

Ibid. post lin. ult.

Eupatorium *Marianum*, *Jacæ vulgaris* folio integro, *Baccharidis* facie, amplioribus capitulis aureis.

Eupatorium *Marianum*, *Hieracij Sabaudum* *Lobelij* foliis dentatis, & asperis.

Fol. 141. ad lin. 9. post Fratrem.

Et rectius forsân inter Conyzas adnumeranda ; ut velit Hermannus in *Paradis. Batav.* Qui iterum negat eandem esse cum Virgâ aureâ, latissimo folio *Canadensi* glabrâ, *Sch. Bot.* 201. idque rectissime, ideoque repudiatur *Synonymium* hic & in *Phytogr. nostrâ Tab. 235. fig. 4.* sub proprio titulo, videsis *Iconem* : At prioris *Synonymij* loco inseratur, Conyza (fortè) praelata, odorata, alato caule, capitulis barbatis, *Baccharis Monspelienfis* æmulantibus, *Boccon. Mus. Plantar. rar. pag. 168. Tab. 121.*

Ibid. post lin. 10.

Eupatoria Jaceoides ex *Terrâ Marianâ*, quæ re verâ est, Jaceæ & *Serratulæ* affinis, capitulis *Baccharidis*, *Breyn. Prodr.*

Eupatorium *Aquilegiæ* foliis, *Malabaricum*, flore purpureo. *Puam-Curundala*, *Hort. Mal. Part. 10. Tab. 64.* Conyza affinis *Malabarica*, *Aquilegij* folio, flore purpureo, *Commel. Not. in loc.*

Ibid. post lin. 18.

Eupatorium *Rapistræ* arvensis folio, capitulis parvis, *Coromandelianum*, pappo candidissimo.

Eupatorium Americanum tomentosum, *Lychnidis coronariæ* folio, & facie, flore albo, *Breyn. Prodr. 2. 24.*

Ibid. post lin. 21.

Eupatorium Conyza minimæ foliis rigidioribus, capitulis parvis *Coromandelienfe*.

Ibid. ad lin. 28.

Hujus & altera datur species, aut sanè varietas, *Provinciae nostræ Marianæ* apud *Indos Americanos* alumna, foliis angustioribus, circa caulem ad intervalla confectis, caule magis ramosa, & flosculis minutioribus.

Ibid. post lin. 28.

Eupatorium *Ericoides*, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Cent. fol. 140.*

Ibid. ad lin. 31.

Est flore purpureo ; An *Civapatli-Yacapichtlensis*, Conyza *Mexicana*, *Hernandez apud Recc. 157.* Et si non situs foliorum obstaret, eandem esse putarem, cum *Tzazalicpatli*, *Nov. Hispan. Terentij apud eund. Recc. 434.* An fortè *Serratula Novæ Eboracensis* maxima, foliis longis, serratis, *Catal. Plantar. ad calcem Paradis. Batav. à Sherardo edit.*

Ibid. ad lin. 33. post dicta, add.

Et aliquando *Christmas-flower*, nostratibus, nuncupatur. *Axixpatli Hernandez fol. 233.* haud multum abluere videtur. An Conyza fruticosa, folio hastato, flore pallide purpureo, *Cat. Jamaic. 124.* Item Conyza *Urticæ* folio, ejusd. ibid.

Ibid. post lin. 36.

Eupatorium Indicum, folio *Lampsanæ* modo distincto, flore minori. *Eltanecoondo Malabarorum.*

Ibid. ad lin. penult.

Cui affinis est *Yxtomic-Xihuictl*, seu lanuginosa herba ejusd. *Hernandez ibid.*

Fol. 142. ad lin. 7.

An Scabiosæ affinis anomala sylvatica, Enulæ folio, singulis flosculis albis, in eodem capitulo perianthia habentibus, semine papposo, Cat. Jam. 127.

Ibid. post lin. 18.

EUPHRASIA magna, ferratis rigidis foliis, flore purpureo, Marilandica.

Euphrasia major Mariana floribus spicatis amplis, tubis longioribus, summis oris profundè incis. Sive Euphrasia rubra, Terræ Mariana, palustribus ga dens grandiflora.

Euphrasia Allines majori folio, flore galeato, purpurascens, Cimices sylvestres graviter olens, ex Ind. Orientali. Mucorundee Malabarorum. Huc fortè spectat Cara-Caniram, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 56.

Ibid. ad lin. 28.

Codasallee Malabarorum. Insigne Trumaticum habetur.

Ibid. post lin. 32.

Euphrasia Æthiopica Drabæ foliis, summis oris flosculorum, altius divis.

Ibid. ad lin. 38.

Huc fortè spectat Kalu-polapen, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 66. Quanquàm Com-

mel. supr. loc. Hanc plantulam ad Sedi genus, adhibendam statuit.

Euphrasiæ affinis Æthiopica, Aborani campestris folio, caliculis subrubentibus.

Euphrasiæ affinis aromatica, pusilla planta, flosculorum labiis latis, & promissis,

ex Insula Johanna. Marrepundee Malabarorum, cui, seminalis est Capsula mem-

branacea. An fortè Antirrhini affinis pusilla planta, foliis scabris Maderaspātana,

Almag. Bot. 34. An Kalu-polapen, Hort. Malab. ut antea. Huc fortè quoad flo-

res saltē, & vascula seminifera, nimirum Plantarum partes magis essentielles (ut

loqui amant nostri Methodistæ) pertinet Pee-Tsjanga-puspan, Hort. Malab.

Part. 9. Tab. 55. Et nuncupari possit Euphrasiæ affinis, Indica, Veronica foliis,

flosculorum labiis longè promissis.

Euphrasiæ affinis frutescens Chamædrifolia, profundius denticulata, ex Promont.

Bon. Spei.

Euphrasiæ affinis Africana, Pedicularis folio villoso, floribus praelongis tubulis, pro-

fundè labiatis, donata. Huic congener est Pul-colli, Hort. Malab. Part. 9. Tab.

69. Et nominari possit, Euphrasiæ affinis, foliis oblongis cuspidatis, subtus vil-

losis, promissis flosculorum labiis, tridentatis.

Euphrasiæ affinis Virginiana, Lysimachiæ spicatae purpureæ foliis lanuginosis, flo-

ribus in summitate caulis.

Euphrosynes facie, an Sideritidis æmula, Ind. Orient. Kainepu Malabarorum.

Ibid. ad lin. ult.

Nella-mulle Malabareis nuncupatur.

Fol. 143. ad lin. 2.

An fortè Embira Brasiliensium, & Pindaiba Pisonis, lib. 4. fol. 144. Zanthoxyli

aculeati Fraxinei nostri, fructus genuinus, (qui enim adpecti hujus ramulo, in

Phytogr. Tab. 239. fig. 4. extant, sunt fructus proximè subsequēntis, in Almagest.

fol. 396.) cum magnitudine, cum formā, tum corticalis ejus partis aromaticita-

te, & colore, adeo similis est ei, quem Fagaram minorem appellat, & depingit

J. Bauhinus, Tom. 1. 350. Ut nihil aliud esse pronunciare, jam ausus sim.

F.

Fol. 143. post lin. 7.

FAGUS Mariana Carpini rugosis foliis apud Collectaneas, D. Ayré. A Car-
pino Virginiana nostra florescente, Phytograph. Tab. 156. videtur differre.

Ibid. ad lin. 11.

Berch. ~~libent~~, nostratibus vulgo Berch. ~~libent~~, ~~et~~ Berch. ~~libent~~, Skinner. Ety-
mologic. Botan.

Ibid. ad lin. 14.

An Fegopyrum Scandens, f. Volubilis nigra major, flore & fructu membran-
etis, subrotund. compressis, Cat. Fam. 46.

Ibid. post lin. 14.

PAGOTRITICO similis angustiori folio, Convolvuli modo scandens, Planta
Mariana, caule spinulis deflexis densius obsito.

Ibid. ad lin. 25.

Lotus cuneaphyllos, Dalechampi Hist. Lugd. 510. Securidaca cuneaphyllos, si-
liquis in summitate, Morison. Hist. Oxon.

Ibid. ad lin. 35.

Libanotis Ferulæ folio, & semine Italica, Reccon. Mus. Plant. rarior. pag. 117.
Tab. 123.

Fol. 144. ad lin. 8. post 79. add.

Fortè Olus-atrum Africanum, ejusd. Breyn. Fasc. 24.

Ibid. ad lin. 11.

Ut & Cayolpatli Mexicanisbus ejusd. fol. 199. An Arbor Africana myrrham fun-
dens Juba regis Mauritanie, apud Plin. lib. 12. cap. 15. Cui, folia sunt Olusatris
aut Levistici similia.

Ibid. post lin. 16.

FICUS sylvestris, f. Caprificus Papiæ foliorum æmula, segmentis denticulatis,
ex Angola nupèr allata est.

Fol. 144. ad lin. 22.

Deleantur hæc verba, Ficus Indica Tilia foliis, &c. Et totus Paragraphus, cujus
loco substituantur quæ sequuntur Verba, scilicet. De hac Arbore me deceptum
fuisse libenter agnosco, & verbis ostendere vix queam, quàm mihi gratum est,
& quàm maxime gaudeo, quod opportunitas nunc datur ad hunc locum restitu-
endum: Errandi nobis dedit occasionem, mala & promiscua aliquot Exemplari-
um stirpium, ex Insula Barbudensi advektorum Collocatio; ubi Ficus exiguus,
qui proximè subsequens in Almagesto Plantæ fuit fructus legitimus, hujus ramu-
lo incuria Colligentis adungebatur; In vertice quoque fucalorum, Comus ob-
longus & argenteus, emergit, inter foliosa involucra, folia novella argentea recom-
dens, quod & omnibus hujus prolapæ f. Ficuum speciebus est commune. Ab
ilo

istis autem tempore quo *Almagestum* edidi; hujus semina cum ramulis optime asservatis, ex eadem *Insula*, nobis sunt allata, quibus certior factus sum, inter *Malvacearum* genera hanc Arborem reponendam fore; & nominari mereatur. *Malva arborea Indica* Abutili foliis argentea, sub externo cortice candidiophoros, & summis ramis radicata. Mahot arbor *Caribana D. Rothfort. Virginienfibus* nostratibus, *The Riband Tree*, & interdum *Lace Tree*, & *Balle Tree*, nuncupatur. Vid. *Almagest. Botan. fol. 41. & Barbadenfibus Angli Broad-leaf d. Mangrove*. Hæc forsitan & non *Ceratia agrestis*, (ut semel putavi) est illa *Camatotocopatli*, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc. fol. 360.* Tam facile decipimur in *Simplicium* cognitione; Sed labi humanum est, quod mihi si aliquoties, usu venerit hoc opere, ut culpam libens fatebor, ita non illibenter castigatorem recipiam, ut Posteris meo errore etiam melius sapere, & aliquid veritatis discere valeant; Homo enim sum ipse & errori obnoxius, utcumque ex naturali constitutione, Veritatis Indagator studiosus, utpote illius unice amans, semper mecum recolens Sapientissimum istud *Plutarchi* essatum *Opusc. de Iud. & Offrid.* ubi monet. Omnia bona à Deo petenda esse, sed præcipue Veritatem, quod nihil homo accipere grandius, vel largiri Deus ipsa possit augustius; Cætera enim (inquit) Deus hominibus quidem quorum sunt indigi donat, Hanc possidet ipse peculiarem, eaque utitur. Ideoque mallem justè redargui, quàm fallere, vel erroris causa esse, cum etiam errando Veritatem quaesierim, Nostra tam perversè non amamus, ut errorem aliis imputare malimus, quam innotescere, quod erramus.

Fol. 144. ad lin. antepenult.

Ficus arborese Bengalenfis, folio subrotundo, fructu orbiculato, *Ripal Bengalenfibus*, *Hort. Beaumont. Hort. Med. Amstelod. cum Icone artificiosissime sculpta, cap. 62.*

Ficus Ind. Orient. Obe vulgo Junioris folio, flore albo tubuloso, sericea lanugine obrito, fructu orbiculati. *Panneermaram Malabarorum.*

Fol. 145. post lin. 2.

Ficus Indica Mali Limonia folio, subtus canescente, fructu exiguo, cortici adnato; *Sunutperai Malabarorum.* *Tsjela* (fortè) *Hort. Malabar. Part. 3. Fol. 85. Tab. 63.*

Ficus Indica, subrotundis Coccigriæ densioribus foliis, fructu parvo, è regione binato; *Callerelle Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 29.

Fructuum etiam curvitate, à præcedenti discrepat.

Ibid. ad lin. 34. post 474. add.

Pappaichedde Malabarorum.

Ibid. ad lin. penult. post Antilles. add.

An Hezmaytl, Nov. Hispan. Terentij apud Recc. 377. Hujus sit novella planta; inquirendum propono.

Fol. 146. ad lin. 3. lege.

Utræque fortiebantur in *Tabulis nostris Phytographicis.*

Ibid. ad lin. 9.

An Yaruma de Oviedo, Yaruma Martijr. Lopez de Gamara fol. 33. de Thevet. Cosmograph.

mograph. 985. Nieremb. 330. Jonst. Dendr. fol. 56. Ambayba Brasiliæ ejsd. Cat. Jam. 45. Ast Jacuma Nieremberg. lib. 14. cap. 104. & Ambayba Brasiliensium Laetij Ind. Occ. lib. 15. cap. 8. apud Johnstonum sunt Arbores diversæ, & in diversis locis proponuntur, ut quivis patet in Dendrolog. fol. 54. & fol. 58. Unam vero & eandem facit, Cat. Jam. ubi supra.

Fol. 146. ad lin. 37. post fig. 2. add: Nondum editi.

Ibid. ad lin. 41. add.

Alias Metaguesunaux, hujus Arbores Toona's, ab Hispanis nuncupantur, Dampier pag. 229.

Fol. 148. ad lin. 9.

An Pitahaya, quæ Saxorum scissuris nascitur, Nieremberg. Exor. 326. Jonst. Dendr. 32. de Laet. fol. 389. Carduus Pitahaya Americanorum, cujus fructus Iconem Parkinsonius noster ex Oviedo depingit, fol. 1628. Carduus Pitahaya fructum ferens. Hist. Lugd. 1442. JB. Tom. 3. lib. 25. fol. 94. Carduus spinosissimus brachiatus, ex Hispaniola. CBP. 384.

Ibid. ad lin. 12.

*Fortè Cahajaba quibusdam, Mippi vocatur, Jonst. Dendrolog. 58. Mippi nonnullis Indis Cahajaba, Clus. Exor. lib. 4. cap. 14. fol. 86. Mippi nonnullis Indis. Cahajaba, quæ Ossium fracturis alligata, ea ferruminare solet, Clusio CBP. 458. Cereus serpens *Ελιόφυγας*, s. Solfuga, eo quod non nisi à Solis occasu, usque ad ortum ejus, hæc floreat planta, interdum verò minimè: Hujus flos stupendæ pulchritudinis, noctu dum expansus est, flagrantia odoris quemque rapiat; Mispophæbus, & Noctiluca dici potest, quæ flore suo immaculati candoris, amplissimâ triplici radiorum serie, auro fulgenti, tanquàm gloriâ, circumcincto, magnâ in orbem expansione, alterius instar Solis, mediis in tenebris lucet, at diurno tempore, illucenteque Solis jubare, penitus oblitescit; Arboris instar tristis per diem, quæ occidente sole floret, Oriente deflorescit, ac si Soli itata & *ἡνία*. Sub exitum Mensis Julij in Hort. Reg. Hamptoniæ. Ejus flores vesperi dehiscunt, totâ nocte hiantes maneat, summo mane clauduntur, nec amplius aperiuntur, sed flaccescunt, statimque Solis præsentia evanescent; Influxum enim illucentis Solis adeò aspernari videtur, ut *Ελιόφυγας* nomenclari meretur. Hujus Flos in Phytobibliâ nostrâ servatur.*

Ostendunt terris hunc tantum Fata.

Nec ultra esse sinunt.

Vix enim florens defloruit, vix olens exolavit,

Apparuit simul & aruit.

Idèoque multo plus laboris ac temporis, ad productionem hujusmodi florum, quàm ad Ostentationem Natura impendisse videatur, ut nihil mirum sit, aliud quid inesse illis egregij, quod nos lateat.

Ibid. ad lin. 20.

Fortè Tepenexcomitl, Nov. Hispan. Terentij apud Retæ. fol. 110.

Fol. 148. ad lin. 35.

Mirafol dici possit, quia florem noctu comprimit, eumque aperit Solis exortu; Huic enim Plantarum generi florum petala, interdum latissime expansa, Solis excipiunt calorem aperto velut sinu, hujus vero Syderis absentia occcluduntur, cui nomen Mesembrianthemum f. Floris Meridiani propterea imposuit *Cl. Breynius* quoniam plerarumque hujus generis specierum flores, medio die Sole illustrato, sese aperire observantur, *Breyn. Prodr. 2. 71.* Secus autem facit illud *Tragopogonis* genus, à Nostratis *Sleep-at-Pawn*, & interdum *Go-to-Bed-at-Pawn* dictum, eò quod flores circa meridiem se claudunt, nec ante proximum Solis ortum aperiuntur.

Fol. 149. post lin. 18.

FICOIDES *Africanum* Mesembrianthemum, f. *Ficus aizoides minor*, folio tereti procumbens, flore coccineo, *Hort. Leyd. 252.* An Mesembrianthemum *Africanum* procumbens, tereti folio viridi, flore intus aureo, extus phæniceo, *Breyn. Prodr. 2. 69.* Hanc vero floribus venustissimis ornatam in *Hort. Med. Societ. Pharmaceut. Lond. apud Chelseiam*, laudati *D. Doodij* curâ enutritam, oculis nostris maximâ cum voluptate non raro lustravimus.

Ficoides Afric. Mesembrianthemum triquetro folio, flore albo, parvo, polyanthos.

Ibid. post lin. 27.

Ficoides Afric. Mesembrianthemum, f. *Ficus aizoides Afric.* flore amplo niveo, folio latiore plano.

Ibid. ad lin. 37.

Ad hoc genus fortè referatur *Nonochto, Novæ Hisp. Terentij apud Rect. 392.*

Ibid. post lin. 38.

Ficoides Afric. Mesembrianthemum, f. *Ficus aizoides major*, procumbens, Tripolij folio magis succulento, denticulis fimbriato, flore argenteo, ad umbilicem aureo, fructu magno pyramidalis, quinquefariam diviso; calloso calyce pentagonali incluso. In *Horto Med. Chelseiano*, auspitiis *D. Doody* istius *Hort. Praefect. digniss.* excultam observavimus.

Fol. 150. post lin. 14.

FILICULA f. *Adiantum nigrum*, rigentibus pinnulis auriculatis, *Insulae Johanne.*

Filix f. *Adiantum nigrum* floridum, *Monomotapense*, priori valdè simile, si non idem.

Filicula *Lonchitidis* folio auriculata, & dentata, *Insulae Johanne.*

Filix f. *Adiantum Trichomanoides*, *Lonchitidis æmulum*, *Monomotapense*, pinnulis non dentatis, ad oras pulverulentis, pediculo nigro.

Ibid. ad lin. 16.

An *Filix minor* ruffa lanugine, tota obducta, in pinnas tantum divisa, raras non crenatas subrotund. *Cat. Jam. 19.*

Filicula *Æthiopica* denticulatis pinnulis, averſa parte *Asplenij* ritu, villosa lanugine tectis, pediculo splendente nigro.

Ibid. post lin. 17.

Filicula *Geranij arvensis* folio, & facie, *Æthiopica*; ex *Promont. Bon. Spei.*

Fol.

Fol. 150. post lin. 33.

Filix arborea *Marilandica* Dryopteridi *Trogi* ut in *Hist. Lugd.* depicta est, magis conveniens.

Ibid. ad lin. 36.

Fortè etiam *Adiantum saxosum floridum*, *Plumier. fig. 43.* *Osmunda Americana*, *Filiculae folio*, *Turnesortij Elem. Bot. 437.* *Lunaria elatior*, *Adianti albi folio*, duplici spica, *Cat. Jam. 14.* Itèm fortè *Filix non ramosa minor*, pinnulis crebris obtusis, crenatis ejusd. pag. 21.

Ibid. ad lin. 40.

An *Adiantum nigr. max. non ramos.* pinnis crebris majoribus crassis, & *Trapezij* in modum figuratis, *Cat. Jam. 21.* Alioquin *Synonymiis* malè adhibitis confunditur.

Ibid. ad lin. 41.

Post *Filix*; deleantur *Americana*, & ad lin. 42. *Insula Jamaicensis*, & eorum loco; pone ex *Hibernia*. Et post *Tab. add. 282. fig. 3.* nondum edit.

Ibid. ad lin. 43.

Filix minor longifolia, caulis raris, pinnulis longis tenuissimis, & oblongis lacinia fimbriatis, *D. Sberard. Raij. Synops. Stirp. Britan. novissime edit. 51.*

Fol. 151. ad lin. 1.

Post *palustris add. repens.* ad lin. 3. add. *Filix minor non ramosa*, *JB. Tem. 3.*

Ibid. ad lin. 6.

Filix non ramosa major, furculis (alis) crebris, pinnulis longis angustis, *Cat. Jam. 19.*

Ibid. post lin. 9.

Filix non ramosa, ex *Insula Sanctæ Helenæ*, pinnulis amplioribus, nostrati *femine* haud absimilibus.

Filix mas Marilandica, foliis *femine* foliorum æmulis, à præcedente diversa.

Filix non ramosa latius dentata *Mariana*, florescens, thyrsis florum, ruffa lanugine recto.

Ibid. ad lin. 12. post 292. add. nondum edit.

Ibid. post lin. 39.

Filix non ramosa, pinnulis longioribus, angustis, profundè dentatis, supremâ pinnâ admodum elongatâ; ex *Ins. Johanna*. *Filix pyramidalis Madraspatana* elegans, pinnulis serratis. Item *Filix pyramidalis elegans*, *Insulæ Sancti Johannis*, pinnulis angustis serratis, *Mus. Pet.* Bis enim repetitur.

Filix non ramosa pinnulis angustis profundè dentatis, pediculis hirsutis ferrugineâ hispidis, ex *Insula Johanna*.

Ibid. ad lin. 36.

An *Filix minor non ramosa*, alis foliorum alternatim positis, bifidis & multifidis, *Raij Synops. 48.*

Filix mas non ramosa Marilandica, pinnulis angustis, rarioribus, profundè dentatis, supernâ parte auriculatis.

Filix petraea Marilandica, folio ad utrumque extremum pyramidali.

Fol. 152. ad lin. 7.

An Polypodium parvum foliis minutim serratis, *Banist.* Fortè Filix minor in pinnas tantum divisa, ex adverso sitas, oblongas laticque non crenatas, infimis ad basim auriculatis, *Cat. Jam. 19.* Pinnulæ autem nostræ, sunt minutissimis crenaturis circumcinctæ.

Ibid. ad lin. 11.

Lonchitis altissima, pinnulis utrinque, scilicet ex utroque latere auriculatis, *Cat. Jam. 16.*

Ibid. ad lin. 14.

Fortè etiam Lonchitis major, pinnis latioribus levitè denticulatis, superiori latere auriculatis, *Cat. Jam. 16.* Item Lonchitis major pinnis angustioribus, levitè denticulatis, superiori latere auriculatis, *ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 15.

An Lonchitis minor pinnis latioribus, levitè denticulatis, superiore latere auriculatis, *Cat. Jam. 16.*

Ibid. post lin. 19.

Filix s. Lonchitis major, Polypodij foliis *Virginiana*, *Banisteri Cat. Stirp. Virg.* Hæc atque etiam vulgaris Lonchitidis species, ut in Horto suo sicco scriptum reliquit, Autor, simili modo florida est.

Ibid. ad lin. 21.

Lonchitis minor, pinnulis angustis, crebris, tenuibus, atrovirentibus, *Cat. Jam. 16.*

Filix Lonchitidis facie minor, *Fusulæ Sanctæ Helenæ*, pinnulis brevioribus, dentatis, supernâ parte auriculatis.

Filix Lonchitidis facie, supernis pinnulis auriculatis, & exquisitè denticulatis; à priore diversa.

Filix s. Lonchitis *Æthiopica*, pinnulâ latâ, brevi, supernè modo articulata, nervo medio in aculeum parvum desinente.

Ibid. ad lin. 35.

An fortè Lonchitis Asplenij facie, pinnulis variis, viz. subrotundis, & ex utroque latere auriculatis, *Cat. Jam. 16.* Quam facit eandem cum Filice non ramosa Scelopendroide, *Plumier. fol. 7. fig. 11.* Sed minùs rectè, ut mecum existimo; hujus enim pinnulæ nullatenus sunt articulatæ. Fortè etiam Lonchitis altissima, pinnulis raris, non laciniatis, *ejusd. Cat. Jam. ibid.*

Ibid. ad lin. 39.

An Filix non ramosa minor, caule nigro, furculis raris, pinnulis latis, dentatis, subtus niveis, *Cat. Jam. 21.*

Ibid. ad lin. 44.

An Filix major scandens, in pinnas tantum divisa oblongas, latissimas, non crenatas, *Cat. Jam. 18.* Sed nostra non scandit. An potius Filix minor in pinnas tantum divisa, crebras non crenatas auriculatas, & lincis pulverulentis aversâ parte notatas, *ejusd. ibidem.* Nostra tamen folia sunt crenata, vel sinuata saltem.

Fol. 152. post lin. 44.

Filix non ramosa, Pastinacæ aquaticæ angustioribus foliis serratis, atque ad oras veluti perforatis, ex *Insula Johanna*.

Fol. 153. ad lin. 7.

An Filix ramosa minor, pinnulis crebris, brevibus, latis, obtusis, subrotundis, *Cat. Jam. 23*. Fortè etiam, Filix ramosa major, ramulis raris ex adverso sitis, pinnulis Asplenij scilicet crebris, latis, brevibus, subrotundis, non dentatis, *ejusd. 24*.

Filix non ramosa *Insul. Johannæ*, pinnulis Lonchitidis obtusis, non dentatis, ad ora pulverulentis. An Lonchitidis genus ramosum, *Ind. Orientalis*.

Ibid. ad lin. 12.

An Filix non ramosa major, surculis crebris, pinnulis brevioribus angustis, *Cat. Jam. 20*. Item Filix ramosa major, pinnulis longis, acutis, raris, falcatis, *ejusd. pag. 23*.

Filix non ramosa *Æthiopica*, longioribus alis, pinnis particularibus, Agerati foliorum æmulis, ex *Prom. Bon. Spei*.

Ibid. ad lin. 19.

Polypodium minus pinnulis raris subris cinereis, *Cat. Jam. 16*. Ubi Polypodium radice tenui, & repente, *Plumier*, ponitur pro Synonymo.

Filicula sive Polypodium parvum pilosum, Rosmarini foliis punctatis, pediculo nigro, ex *Ins. Johanna*.

Ibid. post lin. 27.

Filix Mariana Osmundæ facie racemifera; à Præcedenti neutiquam differt. Utriusque Indiæ alumna est; in Provincia nostra Mariana apud Americanos, collegit D. David Krieg Germanus, Medicus Ornatissimus, & redeunte in Angliam, secum attulit, & nobis amicè communicavit. Hujus racemum elegantè depictum exhibetur à Clariss. Breyn. in *Cent*.

Filix Osmundæ facie Mariana, segmentis minutim denticulatis, pediculo atronitente. Huic perindè ac in Lonchitidum censu, duo sunt foliorum genera, ab eodè laudato Kriegia accepimus.

Eadem segmentis sinuatis, crispis, & argutè denticulatis.

Ibid. ad lin. 30.

An Polypodium *Monomotapense*; Lonchitidis foliis, *Hort. Beaumont. 35*. Polypodium Scolopendriæ, vel Phyllitidis facie maximum, *Surinamense*, *Breyn. Prodr. 2. 85*. Fortè etiam Polypodium exoticum, foliis Quercûs, *CBP, Hort. Fagelian. ejusd. Breyn. ibid.* Hanc nostram Filicem Polypodio majori aureo, *Plumier. fig. 35*. eandem facit *Sloanus, Cat. Jam. 15*.

Ibid. post lin. 34.

Filix Angelicæ foliis quodammodò accedens, ex *Insula Johanna*.

Ibid. post lin. 39.

Filix mas vulgari similis, pinnulis crenatis, ex *Insula Sanctæ Helene*.

Ibid. ad lin. 43.

Filix major scandens, in pinna tantum divisa, oblongas laticque non crenatas, *Cat. Jam. 17*? Cui pro Synonymo adponitur Filix scandens latifolia, serrata, *Plumier*. Sed quàm rectè aliorum judicijs relinquo. An Panna-valli, *Hort. Malab. Part. 12. Tab. 35*.

Fol.

Fol. 154. post lin. 3.

Filicula saxatilis Osmundæ facie foliis variis; margine non ferratis; sive Adianthum Marianum, pediculis atris, à superiùs nec tamen pro meritis satis laudato D. Kriego accepimus.

Ibid. ad lin. 4.

Post foliis add. prælongis. Et ad lin. 7. ante Breyn. add. & Brasiliæ.

Ibid. ad lin. 12.

An Filix maj. in pinnas tantùm divisa, oblongas, angustasque non crenatas, Cat. Jam. 18. Sed malè additur non crenatas, si sit nostra; rectius fortè, Filix maj. in pinnas tantùm divisa oblongas, angustasque non crenatas, ejusd. ibid.

Ibid. ad lin. 18. post fig. 1. add. nondum edit.

An Lonchitis major pinnis longis angustissimisque, Cat. Jam. 16. Item Filix non ramosa major, furculis raris, pinnulis longis, angustis, rarissimis, ejusd. pag. 19.

Filix non ramosa Monomotapensis, prælongis pinnis integris, margine plerumque planis, ad pediculum tamèn, rarioribus denticulis amplis, & magis extantibus ornata.

Ibid. ad lin. 24.

Lonchitis palustris maxima, Cat. Jam. 15? Item Filix maxima in pinnas tantùm divisa, oblongas, laticasque non crenatas, ejusd. pag. 17?

Ibid. ad lin. 28.

Lonchitidi affinis arbor anomala, folio alato è pinnarum crenis fructifero, Cat. Jam. 16. Hæc autem & quæ proxime sequitur in *Almagesto* nostro, sunt de bacciferarum censu, & novum plantarum genus constituunt, Lauroraxis nostris monopyrenis ad folia bacciferis, annumerandæ.

Ibid. post lin. 34.

Filix f. Phyllitis major grandioribus foliis, ex *Insula Johanna*.

Filix Phyllitis dicta, tenerifolia, longius mucronata, *Insulæ Johannæ*.

Ibid. ad lin. 36.

Filix minor plerumque trifida, pinnis oblongis latisque non crenatis, Cat. Jam. 18. Minus autem propriè, minor dicitur, cum folio sit amplissimo.

Ibid. ad lin. 40.

Phyllitis ramosa trifida, Cat. Jam. 19. Phyllitis f. Lingua cervina, multifido folio ramosa, Breyn. Prodr. 2. 82. Lingua cervina polyphylla, polyschides, Bocc. Mus. Pl. pag. 144. Tab. 102.

Filix f. Phyllitis caulifera, *Insulæ Sanctæ Helenæ*, pinnulis variè dentatis, averſa parte liris obliquè tendentibus, ferratisque eleganter striatis. Habuimus etiam ex *Insulâ Johanna*.

Filicifolia Phyllitis cauliferæ similis, trifoliata, ex *Insula Johanna*.

Ibid. ad lin. ult.

Phyllitis non sinuata minor, apice folij radices agente, Cat. Jam. 14.

Fol. 155. ad lin. 9.

Hemionitidi affinis, Filix major trifida, auriculata, pinnis latissimis, sinuatis. An *Caticaa* sive *Polypodium*, *Pijonis* Cat. Jam. 18.

Fol. 155. ad lin. 9.

Filix Hemionitis trifida & quinquifida, bullatis foliis, ex *Insula Johanna*. An forte sit de genere Polypodiorum.

Filix sive Hemionitis multifida platyceros, f. segmentis coriaceis, comm. cervinum referentibus, averſa parte canescentibus, ex *Insula Johanna*.

Ibid. ad lin. 11.

Hemionitis folio hirsuto, & magis dissecto, f. Ranunculi folio, Cat. Jam. 15.

Ibid. ad lin. 19.

Hemionitis foliis atrovirentibus maxime dissectis, f. Filix Geranij Robertiani folio, Cat. Jam. pag. 15.

Ibid. post lin. 19.

Filix Hemionitis *Americana* major, Ricini laciniatis foliis, ex *Insula Trinidad*. A fratre suo ad D. Stonestreet allata est.

Ibid. ad lin. 24.

Hemionitis peregrina *Clusij* Cat. Jam. 15. Item Hemionitis peregrina foliorum segmentis sinuatis, longioribus, & magis acuminatis, f. Hederae folio anguloso, ejusd. ibid.

Ibid. ad lin. 27. add.

Vid. Phytograph. Tab. 287. fig. 5.

Ibid. ad lin. 30.

Phyllitis scandens minima, Musci facie, foliis membranaceis subrotundis, Cat. Jam. 15.

Filix mari-ramosae pinnulis dentatis *Gerardi* similis, sed diversa, ex *Insula Sancta Helena*.

Filix ramosa latius dentata, plana, pinnulis ad oras averſa parte pulverulentis, ex *Terra Mariana*. An Filix femina, foliis ad margines pulverulentis, seminibus fimbriatis, *Banister*. Cat. Stirp. Virginian.

Filix *Osmundae* facie, summo pediculi fastigio, ramulis in orbem radiatis, ex *Insula Madagascar*.

Filix elegans tanacetii vulgaris folio, *Insulae Johanna*.

Filix ramosa *Cicutariae* maximae folio, media costa candore nitente, ex *Insula Sancta Helena*.

Ibid. ad lin. 37. post 294. add. Nondum edit.

Ibid. ad lin. 40. add.

Filix saxatilis crispa *Parkinsoni* D. Merret in Pinac.

Ibid. ad lin. ult.

Hoc etiam attributum magis proprie Filici mari-ramosae pinnulis dentatis *Gerardi* appropriari meretur, ut cuilibet pateat ex *Icone in Phytogr. nostra Tab. 181*. exhibita.

Fol. 156. ad lin. 1.

An *Adiantum nigrum* ramosum maximum, foliis f. pinnulis obrysis, tenuibus, regulariter minutissime & pulcherrime sectis, Cat. Jam. 22. ad lin. 3. post 293. add. Nondum edit.

Ibid. ad lin. 4.

An Filices hasta crassiores *Petr. Martyr. Decad.* An Filix arborea ramosa, spino-

sa, caudice non diviso, pinnulis latis, densis, brevibus, tenuibus, minutim dentatis, *Cat. Jam. 22.*

Pol. 156. ad lin. 9.

Lege nondum edit. & ad lin. 11. add. nondum edit.

Ibid. ad lin. 15.

Filix ramosa major, caule spinoso, foliis sive pinnulis rotundis, profundè lacinatis, sive Cerefolij foliis, *Cat. Jam. 23.*

Ibid. ad lin. 18.

Filix furcata, pinnulis longiusculis, non dentatis, *Plumier. fig. 20.* Filix fœm. f. ramosa major dichotoma, pinnulis Lonchitidis, scilicet longis angustis, non dentatis, *Cat. Jam. 24.*

Filix furcata Polypodij angustioribus pinnis, supremâ admodum prolixa, ex *Insula Johanna.* An Filix ramosa, pinnulis rostratis *Plumier.*

Ibid. ad lin. 19.

Filix fœmina f. ramosa, major, pinnulis angustis, obtusis, non dentatis, impari surculum terminante longissima, *Cat. Jam. 24.* An Filix ramosa pinnis longiusculis partim auriculatis, *Plumier. fig. 22.*

Ibid. ad lin. 20.

Filix fœmina, f. ramosa major, pinnulis angustissimis, rarissimisque, *Cat. Jam. 24.*

Ibid. ad lin. 22. post fig. 3. add.

An Filix arborea ramosa, caudice non diviso, pinnulis angustis, raris, obtusis, integris, *Cat. Jam. 22.*

Ibid. ad lin. 31.

Fortè *Adiantum nigrum* ramosum, maximum, foliis f. pinnulis tenuibus, longis, acutis, spinosis, *Cat. Jam. 22.*

Filix ex *Insula Johanna* pinnulis obtusioribus, planis, alis infimis utrinque bisectis.

Eadem pinnis brevioribus, ramulis infimis bifurcatis, ex *Insula Johanna.*

Filicula corniculata *Insulae Sanctae Helene*, f. *Adiantum alexandrinum* *Indicum*, longis, rigentibus pinnulis tenuissimis, bifurcatum.

Ibid. ad lin. 35.

Filicis an species (fortè) *Marcgravij, sol. 2.* Phyllitidi multifidæ affinis, Filix scandens, in pinna tantum divisa, oblongas, angustas, laciniatas, *Cat. Jam. 19.*

Fortunatum esse oporteat, qui divinare voluerit, quid sibi velit autor, hujusmodi epithetis. An Valli-panna, *Hort. Malab. Part. 12. Tab. 32.* An Isjeru-Valli-panna vel Warapoli, *ejusd. Hort. Malabar. Part. 12. Tab. 34.* An Isjeru-Valli-panna altera, *ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 37.

Filix non ramosa maxima, surculis raris, pinnis variis, inferioribus scilicet oblongis, acutis, superioribus vero Asplenij subrotundis, *Cat. Jam. 19.*

Quid sibi vult Autor per hanc notam, viz. *surculis raris*, in denominatione hujus Filicis, cum non ramosa sit, me planè ignorare fateor; surculum enim esse Stipitis partem, aut rami, ex *Festo* didicimus, & ratio vocis indicat, & declarat usus; nam Vox diminutionem norat, ex Suro, Surum, palum dixere prisca, unde Sura in hominibus. Surculus (inquit *Rajus noster*, in *Terminorum quorundam* &

Vocum generalium explicationibus) est, quod in ramis simplex assurgit tenerum & exile, ergo nullus datur surculus, ubi non est ramus, ideoque in Filice non ramosa (surculis raris) minùs propriè adjiciuntur, alis raris ex nostrà sententià meliùs diceretur.

Ibid. ad lin. 41.

An Phyllitidi multifidæ affinis, Filix scandens in pinnas tantùm divisa oblongas, angustas, non crenatas, an Filicis alia species, in *Insula Tamaraca, Marc-gravij fol. 2. Cat. Jam. 19.*

Ibid. ad lin. 43.

Post vocem *Jamaicensis* deleantur verba inter Filicem & Lycopodium media, & eorum loco lege: Filicis & Lycopodij compos.

Ibid. ad lin. ult.

Phyllitis minor scandens, foliis angustis, *Cat. Jam. 15.*

Fol. 157. ad lin. 29.

Phaseolus sylvaticus, flore parulo, dilutè purpureo, siliquâ tenui, nigra, semine minore maculato, *Cat. Jam. 71.* Ubi Autor pro more consuetudo, confundit diversarum plantarum nomina.

Fol. 158. ad lin. 32.

Tlaolli Maiziumvè *N. eremberg. fol. 322.* Triticum *Basirianum Cordi H. Plantar. fol. 112.* Turcicum frumentum, typhâ magnâ, Triticum magnum, s. *Afaticum, Tragi. fol. 651.* Frumentum *Turcicum*, rectiùs Panicum peregrinum, *Gesneri Hort. German. fol. 259.*

Ibid. ad lin. 40.

Post alterum add. minus, post 455. ejusd. lineæ add. Fortè & Triticum Indicum ejusd. *JB. Tom. 2. fol. 453.*

Ibid. ad lin. ult.

An Granati folio *Gurassavica* arbor lucida *PBP. 338.*

Fol. 159. post lin. 1.

FRUTEX sive Arbuscula baccifera, subrotundis foliis, Chrysanthemi floribus *Africana.*

Frutex Indicus Prunifolius, fructu hexagono, cum ossiculo singulari, multinucleo, ex *Insula Jobanna.*

Ibid. post lin. 8.

Frutex Ethiopius baccifer, Teuerij acutioribus foliis scabris, ad caulem imbricatis.

Ibid. post lin. 10.

Frutex anonymos, foliis Lauri-tini minoris, *Breyn. Fasc. Rarior. 23.*

Ibid. ad lin. 20.

Hæc etiam pertinet Katou-Nirouri, *Hort. Mal. Part. 10. Tab. 44. ex Insula Barbados*, sub Indigo sylvestris nomine, hanc plantam aliquando recepi. Flosculum fert luteum ut audio. An Cocusquahuitl *Vaxacensis* s. Arbor cardiaca, *Hernandez apud Recc. fol. 96.* Keelanelle Malabareis nuncupatur. Adversus Icteron, & Febres intermittentes, insigne specificum.

Ibid. ad lin. 22.

Vitis Idææ affinis, flore hexapetalo exalbicante, *Commelin. Not. in Hort. Malab.*

Fol. 159. post lin. 24.

Frutex *Virginianus* pentapetaloides, Circææ foliis rigidis, fructu calyce immerso, bæccam mentiente, foliorum petiolis eleganter fimbriatis.

Ibid. ad lin. 28.

Post mustosus add. Herbx Impiæ capitulis in spicam sessilibus.

Ibid. post lin. 29.

Frutex *Æthiopicus*, Cineraceo muscoso similis, capitulis sparsis. Foliola sua minutissima in gyrum stellulæ depictæ instar, stipitibus arctè adnascencia, musci in modum emittit. At hujus Plantarum generis sunt plurimæ diversæ species, quas omnes ad Myricæ genus relegandas existimo, & sub Temarisci titulo invenies.

Ibid. post lin. 31.

Frutex *Africanus*, Terribilis *Narbonensium* folio, capitulis oblongis, squamosis, Breyn. Fascic.

Ibid. post lin. 33.

Frutex *Africanus*, lanceatis foliolis duris, mucrone pungentibus, ad D. Stonestreet allata est; fortè sit de Ericarum genere.

Ibid. ad lin. 35.

Genistella Rusci folio major, Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 50.

Ibid. ad lin. ult.

Jujubes (fortè) *Indiana*, sive Ber *Indicæ* affinis Laccifera.

Fol. 160. ad lin. 6. post cap. 10. add.

Kaate, ex hujus arboris ligno, pastillos concinnatos cum Betello comedunt, CBP. 410. ex *Linschoten. Part. 4. Ind. Or. cap. 16.*

Fol. 160. post lin. 12.

Frutex scandens *Petroselinii* foliis *Virginianus*, claviculis donatus, in *Horto Plantar. exoticar. ditissimo*, D. Samuelis Reynardsoni, percelebris Mercatoris *Londinens.* apud Villam suam ad *Hillingdonam* ex seminibus sibi natum, hunc perelegantem Fruticem primò lustravimus, deindè in *Hort. celeberrimo Comptoniano* apud *Fulhamiam*. An hæc planta sit, Frutex *Petroselinii* foliis, *Banist. Cat. Virg.* Fortè *Clematidis* species, an *Aquitzli Mexicensibus*, *Hernandez apud Rec. fol. 354.* *Talictri* (fortè) foliis *Portaricensis*, Planta scandens capreolis, *Horr. Beaum. 38.* *The Pepper-Tree*, nostratibus dicta.

Ibid. ad lin. 14.

Atexcalquahoitl, Nov. *Hispan. Terentij* apud *Rec. 354.*

Ibid. ad lin. 34. post 360. add.

Tokaun folia oblonga, & acuta, ex quibus fila detrahunt, & reticulâ piscatoria indè contextunt, ejusd. CBP. 320. ex *Stadio in Brasl. lib. 2. cap. 8.*

Ibid. ad lin. 35.

In istâ opinione nuperrimè confirmavit nos, Insignis Botanicus Germanus D. *Andreas Gundelsheimer MD.* Qui huic nostro, idem esse nobis affirmavit.

Fol. 161. ad lin. 26.

Fucus hæmorrhoidalis maximus, s. nodis prægrandibus nostras. *Quercus marina* tertia *Gerard. emac. 1568.*

Fol. 162. post lin. 1.

FUCUS membranaceus Ceranoides, pennatus rubens, elegantissimus, ex Groenlandia.

Ibid. ad lin. 13.

Fumaria exilis Romana, folio Sophia tenuissimo, Bocon. Mus. Plant. pag. 107. quoad figuram ad Tab. 81.

Ibid. ad lin. 21.

An *Fumaria minor*, Foeniculi tortuosi foliis, flore albo, macula rubente, Bocon. Mus. Pl. 144. Tab. 102.

Ibid. post lin. 23.

FUMARIA Virginiana Sempervirentis Cornuti æmula, siliquis Ornithopodij.

Ibid. post lin. 33.

Fumaria amplexicaulis Vesicaria, Cap. Bon. Spei. Act. Hafniens. Ann. 1637. Obs. 24. *Fumaria alba Vesicaria*, capreolis donata, sub exitum Autumni florens Æthiopica, Almag. Bot. app. fol. 400.

Fol. 163. post lin. 29.

FUNGUS parvus pullus, stipitibus cariosis adnascens, supernè lamellatus, D. Vernon.

Ibid. ad lin. 31.

An *Scyphulus* tantum alicujus Musci terrestris, vel Lichenis; non aliud est quam *Scyphulus albus*, Musci leprosi audacter asserit, D. Doody, Raij. Synops. Stirp. Brit. novissime edit. 331.

Fol. 164. ad lin. 21.

Laurifolia arbor Venenata, folio acuminato, copiosum lac præbens, ex quo in-spissato Viscus aucupum paratur, Cat. Jam. 136. Huc fortè spectat Arti, f. Ada arbor in *Insula Solor*, Zanoni fol. 29. Quam eandem esse suspicamur cum Tezeaparli, *Novæ Hispan. Terentij apud Rec.* fol. 413. Fortè etiam *Curupicaiba*, *Lactij Ind. Cœ. lib. 15. cap. 8. fol. 132.* Fortè etiam, Visci instar succus concretus, JB. Tom. 1. Part. 2. fol. 347. Cujus fragmentum ad *Carolus Clusium* trans-mittebat *Londino Jacobus Gareus*. An fortè *Kerzeherch arbor Venenata Persa-rum*; sive Arbor cujus una radix venenum est, altera Veneni antidotum, *The-venot. Itinrar. Pars. 2. fol. 117.* Arbor contrariis prorsus facultatibus donata, CBP. 457. Nam quæ Solem Orientem, spectat, adversus omnia venena va-let, quæ vero Occidentem, Venenum præsentaneum sunt, ex *Ignatio Francisca-no in Itinere Novi Orbis*, ex quo etiam *Clusius Nazis in Christoph. Acost. cap. 41.* An fortè Arbor venenata, *Laurifolia*, omnibus animantibus noxia, *Strabon. lib. 13.* Vidiſſe enim ſe plantam Lauræ perſimilem ſcribit, quam guſtantes belluæ abalienata, quaſi *Herculeo morbo* concidunt, ore ſpumantes.

G.

Fol. 164. ad lin. 23.

SCORPIOIDES Galegæ foliis singularibus, Boccon. Mus. Plantar. pag. 150.
Tab. 110.

Ibid. post lin. 23.

GALEGÆ affinis *Malabarica* arborefc. filiquis majoribus articulatis, D. Scyn.
Not. in Hort. Malab. Agaty Malabarorum, Hort. Malab. Part. 1. fig. 51.

Fol. 165. ad lin. 2.

Genistæ affinis *Africana*, flore cæruleo, alato, & punctato, foliis asperiusculis,
Breyn. Fasc. Rar. 24.

Ibid. post lin. 3.

GENISTA *Æthiopica* incana, foliis angustissimis, prælongis, densius stipatis,
floribus parvis luteis.

Genista *Æthiopica* flore flavo, foliolis inflexis, & araneosa lanugine simbriatis,
summo ramulo, circa flores glomeratis. An *Chamælarix*, s. *Chenopoda Mono-*
motapensis, Breyn. Cent.

Ibid. post lin. 4.

Genista non-spinosa, *Rorismarini* foliis, *Æthiopica*.

Ibid. ad lin. 14. post vulgò add.

Cytisus humilis argenteus, longis & angustis foliis, ex *Insulis Stœchadibus Tur-*
nesfort. PBP. append.

Ibid. ad lin. 18.

Cytisus argenteus *Linifolius*, *Insularum Stœchadum*, *Turnesfortij Elem. Bot.* 308.

Cytisus *Insular. Stœchadum*, foliis oblongis angustis, subtribus argenteis, an *Cyti-*
sus foliis acuminatis, *Italicus* CBP. *Schol. Bot.* 272. An forte *Caxumba Indi-*
Floers ad *Tincturam*, JB. Tom. 1. Part. 2. fol. 398. ex *Linschotano*.

Ibid. ad lin. 24.

Hujus profapiæ nobis videtur, *Tocapotle Novæ Hispan. Terentij apud Recc.* 431.

Ibid. post lin. 24.

Genistæ tinctoriæ similis, *Planta Æthiopica*, *Linariæ* folio, flore luteo.

Genista tinctoria arborefc. *Lusitanica*, flore parvo luteo, folio singulari virente, in
Hort. DD. Uvedale Enfeldia enutritam, conspeximus. An fortè *Genista Arabi-*
ca quæ à nostrâ diversa, planities ad montem *Sinai* obsiti sunt, quæ etiam in
Arabia solitudinibus nascitur, *Bellon. Obs. sed quid ? CBP.* 395. Hujus enim
sunt *Virgulæ* nostratis vulgaris instar, angulosæ, virentes, lentæ, tenuissimæ,
quarum aliquæ pedem superant, aliæ minores sunt, ex quibus scopas etiam pa-
rari posse mihi facile persuadeo. Et si foliorum situs non obstarent, hanc ean-
dem esse cum *Tocapotle Nov. Hispaniæ* putarem.

Fol.

Fol. 165. post lin. 29.

Genista parva, Gallij albi facie, ex Oris Coromandel.

Genista Ericoides Africana, f. Genista-spartium cæruleum, Capitis Bon. Spei. Breyn.

Fasc. 24.

Genista *Æthiopica* non spinosa, foliis Ericæ villosis, ex uno puncto confertis, floribus parvis spicatis, luteis, calycibus longioribus immerſis.Genista non spinosa, Laricis foliis *Æthiopica*.Genista *Æthiopica* glabra, longioribus foliis, ex uno puncto plurimis, flore majore luteo.Genista minima *Æthiopica*, foliolis Thymiconfertis, splendentibus glabris.

Ibid. ad lin. 31.

Deleantur quæ sequuntur verba. Huc fortè spectat Katupolapen, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 66.

Ibid. ad lin. 38.

An Trifolium frutex Genistæ folio, JB. Tom. 1. Part. 2. fol. 375.

Fol. 165. post lin. 43.

Genista arbor *Æthiopica*, Salicis odoratæ folio, flore flavo. An Myrtogenista, Breyn. Cent. 68.Genista *Æthiopica* frutescens, Rusci longioribus foliis, maxima.Genista *Africana* cinerea, Ericæ supinæ nostratis maritimæ facie, apicibus foliorum spinosis, floribus rubescens, summo caule glomeratis.Genista Astroites, Juniperinis pungentibus foliis, *Æthiopica*, floribus saturatè luteis. Hæc planta folia sua apicibus aculeata, stellæ in modum stipitibus arcuè adnascentia, profert, unde patet Astroites epitheto, non immeritò auctum hujus titulum.

Fol. 166. post lin. 5.

Genistella spinosa *Africana*, Laricis folio, Breyn. Cent. 68.

Ibid. post lin. 13.

Genista Aspalathoides polyanthos major, Capit. Bon. Spei. Breyn. Fasc. rarior. 24.

Quam nunc existimo diversam esse, ab ultima hujus Classis in *Almagestro* nostro recensita, licet aliquando aliter senserim.

Ibid. post lin. 15.

Genista-Spartium aculeatum minus, f. Aspalathoides *Africanum* aphyllon, ex *Prom. Bon. Spei.* ad D. Stonestreet, à fratre suo allata est. An Scorpius spinosus Veteribus, JB. Tom. 1. lib. 11. 399. Fortè Hippophæstum *Cæsalpini*, f. Glastivida sicunda *Cretica*, *Ponæ. Bocc. Mus. Pl. pag. 111. Tab. 89.*

Ibid. ad lin. 23.

Post fig. 6. Huic fortè spectat Spartium spinosum, *Pr. Alpin. de Plant. 1. x. 26.*

Ibid. ad lin. 25.

Deleantur hæc verba. An Erica Serpyllifolio *Æthiopica* flore purpureo pulchro, Breyn. Fasc.

Ibid. post lin. 27.

Genista-spartium spinosum monospermon, Polemonis folio singulari, hiulcolis conspicuo, flore parvo candicante, *Pram. Bon. Spei.* An fortè idem cum proxime præcedenti.

Fol. 166. ad lin. 29.

Deleantur quæ sequuntur. An Genista Aspalathoides polyanthos major, *Cap. Bon. Spei. Breyn.*

Ibid. ad lin. 30.

Aspalathus (fortè) albicans, torulo citreo, *CBP. 392. Lignum rosei odoris in Brasil. Lerijs Descript. Brasil. vel Part. 3. Ind. Occ. cap. 12.* Fortè etiam Aspalathus humilior spinosus in *Nisyro & Rhodiornum Insulis*, quem alij *Erysisceptrum* vocant, *Plin. lib. 24. cap. 13.* Hujus etenim flores sunt rosacei coloris.

Ibid. post lin. 35.

GENTIANA major *Mariana*, angustiori folio, Gentianellæ Vernæ floribus cæruleis, plurimis in summitate coaggestis. An Gentiana cruciata, floribus cæruleis, *Baniferi. Cat. Stirp. Virginian.*

Ibid. post lin. 38.

Gentiana angusti folia *Americana*, flore ex ochro & cyaneo mixto, in fastigio caulis unico. Hæc fortè rectius deprehendatur *Basium* esse monile, *Hernandez apud Recc. ex Terrâ Marianâ* allata est.

Fol. 167. post lin. 8.

Gentianella minor aurea flore singulari amplo, deflexo, pallide flavescente. Ut & tota planta flavescit, à *D. Krieg* habuimus, quam in *Provincia Marianâ* invenit.

Ibid. post lin. 11.

Gentiana *Æthiopica*, geniculato caule, perfoliata, foliis acuminatis, crassis, Paralijs ritu veluti squamis densissimè recto, summa parte floribus puniceis. Ad *D. Stonefreet*, fratre suo à *Promont. Bon. Spei.* allata est.

Ibid. post lin. 24.

Gentiana *Virginiana* foliis inferioribus parvis, mucronatis, summo caule amplioribus subrotundis, venosis, ad flores suos convolutis. Hujus *Icon* sub *Orobanchæ* titulo per errorem exhibetur, in *Phytograph. Tab. 209. fig. 6.*

Gentianella *Æthiopica*, floribus veluti in umbellam sparsis, colore cæruleo.

Gentiana Centauroides, *Ind. Orientalis*, Hyssopi folio, floribus purpureis, in verticillas densius stipatis. *Vulehir Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 32.

Gentianella flore cæruleo integro, vasculo seminâli, ex humidi contactu impatiente, *Cat. Jam. 52.* Ubi per nimiam inadvertentiam quæritur, an sit Gentianellæ species, *Bontij fol. 154.* Multa enim hoc opere, non sine supinâ Oscitantia traduntur, alterum pro altero, sub eodem nomine, licet inter se nihil planè commune habeant.

Fol. 168. ad lin. 2.

Geranium (fortè) montanum; rotundifolium, perenne, flore purpureo, majore, *Boccon. Mus. Plantar. pag. 81. Tab. 72.*

Ibid. post lin. 4.

GERANII *Robertiani* quodammodo similis, folio magis anguloso, Planta *Æthiopica.*

Ibid. post lin. 8.

Geranium saxatile procumbens, foliis subtus canescentibus, flore majore candicante, ex *Insula Pico.* Curâ industrij Hortulani *Johannis Adams in Hort. Comp-*

toniano, ex seminibus nutritam conspeximus. An Tlatlauh-capatli f. Oxygeranium Mexicanum primum, *Hernand. apud Recc. 293.*

Fol. 168. ad lin. 15.

Geranium Pyrenaicum, foliis cineraceis, radice crassa, magno flore variegato, *Turfesortij* monente *Doctore Preston.*

Ibid. post lin. 18.

Geranium parvum Aethiopicum, flore magno candicante, Lupini foliis, argenteo sericeis.

Fol. 169. ad lin. 7.

Geranium supinum, rotundo Batrachioides crasso, tomentoso folio, radice rufescente, longius radicata, *Bocc. Mus. Pl. pag. 160. Tab. 128.* Huic nostro in plurimis convenire videtur.

Ibid. post lin. 12.

Geranium fruticosum, Betulae foliis, *Africanum.*

Ibid. ad lin. 15.

An *Geranium Aethiopicum* procumbens, flore galeato parvo *Betonicae* folio, vel proprius *Malvae Betonicae* folio foliis, *Breyn. Prodr. 2. 51.* *Geranium supinum* *Bottys* folio, acu sursum spectante, *Bocc. Mus. Pl. pag. 145. Tab. 109.* Huic accedere videtur; rectius forsitan *Geranium aëstivum* minim. *supinum alpinum*, *Chamaedryoides*, flore albo variegato, *Bocc. Mus. Pl. pag. 160. Tab. 128.*

Ibid. ad lin. 19.

Geranium Aethiopicum, flore galeato albo, *Alchimilla* folio, rostris longissimis nutantibus, *Breyn. Prodr. 2. 52.*

Ibid. ad lin. 25.

Geranium (forte) *Anemones* folio, flore suaverubente, *Breyn. Prodr. 2. 51.* Huic quoque spectat *Geranium Anemones* folio, & flore amplissimo, albo, striis violaceis variegato, *Horti Fageliani. Breyn. ibid.*

Ibid. ad lin. 27.

Ad hoc quoque genus (forsan) accenseri meretur *Tlatecomaxochitl* f. *Tealtecomaxochitl*, *Novae Hispan. Hernand. apud Recc. 407.*

Fol. 170. ad lin. 3.

Geranium Chrysanthemi Cretici folio, *Neapolitanum*, *Bocc. Mus. Plantar. pag. 93. Tab. 83.*

Ibid. ad lin. 5.

Cui accedit *Geranium Africanum* tuberosum, *Anemones* folio, incarnato flore, *Parad. Batav. 178.* Idem *Geranium Cicutae* folio erectum *Romanum*, *Bocc. Mus. Plantar. 93.*

Ibid. ad lin. 6.

Post *Africanum* add. Icon habetur in *Phytogr. Tab. 328. fig. 3.*

Ibid. ad lin. 9.

An *Geranium Aethiopicum*, flore galeato, foliorum segmentis latioribus, f. *Coriandri. Breyn. Prodr. 2. 51.*

Geranium Africanum, foliis *Adianti nigri Officinarum.* An *Geranium Africanum* foliis *Adiantum*, *PBP. 336.* Hujus autem folia, in tenuia segmenta *Adianti* acrostici instar, insecta sunt, ut in *Paradiso Batavo*, describitur, nostra non item.

Fol.

Fol. 170. ad lin. 14.

Gladiolus (fortè) major latifolius, flore rubro maximo; àn *Gladiolus maximus*, *Prom. Bon. Spei*, flore rubro incarnato, *Swertij*, *Breyn. Fasc.* 24.

GLADIOLUS maximus ramosus, floribus argenteis, *Prom. Bon. Spei*.

Gladiolus Africanus, flore incarnato, nervis foliorum albescentibus, *PBP.* 336.

Gladiolus parvus Ethiopicus, flore purpureo pendulo. An *Gladiolus Africanus*, flore pendulo, *Breynij Fasc.* 24.

Gladiolo affinis *Caryophylloides*, *Ethiopica*, foliis cavis, flore cæruleo, cauliculis secundum longitudinem alatis. An *Gladiolus minor gramineus*, flore parvo cæruleo, *Breyn. Fasc.* 24. *Caryophylleus Monomotopensis*, nervosis *Bupleuri* foliis, intrus cavis, flore cæruleo, cauliculis secundum longitudinem alatis, *Almag. Bot.* fol. 87.

Ibid. post lin. 32.

Gladiolus luteus tripetalos, ex *Terrâ Marianâ*, capitulo clavato gracili.

Gladiolus lacustris Marianus, capitulo squammoso, orbiculari parvo.

Ibid. ad lin. 39.

An *Glaux* major palustris, flore herbaceo, *HRB.* 82. & 268.

Ibid. ad lin. ult.

Eadem (fortè) cum *Can. Cado*, *Sinenfium Cleyeri Medicam. Simplic. Chinesibus* usitat pag. 25.

Fol. 171. ad lin. 2.

Gnaphaloides maritimum nostras, seminibus arcuatis solidis.

Ibid. ad lin. 8.

Deleantur Fortè & quæ sequuntur verba, viz. *Tzonporonic* s. *Heliochrysum Mexicanum*, *Hernandez apud Recc.* 233.

Ibid. post lin. 20.

Gnaphalium Virginianum, subrotundis foliis, capitulo oblongo.

Ibid. ad lin. 24.

An *Chrysocome* flore albo minore, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. pag. 33.

Fol. 171. post lin. 33.

Gnaphalium Aegyptiacum, latiore folio ramosius, flore ex albicante purpureo. *Gnaphalio montano* affinis *Aegyptiaca*, *CBP.* 264. *Baccharis Dioscoridis*, *Rauwolfso. Hist. Lugd. app.* 33. *Clus. Hist.* . . . ex *Aleppo* nobis allata est. *Chrysocome Syriaca*, flore attrorubente, *Breyn. Cent.* 146.

Ibid. post lin. 33.

Gnaphalium montanum elatius, floribus oblongis, amænè purpureis, *Marianum*.

Ibid. ad lin. 38.

An fortè *Chrysocome* flore aureo amplo, *Conyzæ* mediæ foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. pag. 32.

Ibid. ad lin. 40. add.

Vid. *Phytograph. Tab.* 323. fig. 1. An *Chrysocome* flore albo majore, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 33.

Ibid. ad lin. 42.

Gnaphaloides Lusitanicum Turnesortij Elem. Bot.

N. 2

Fol.

Fol. 172. ad lin. 4.

An Chrysocome Impia, f. Filago dicta prima vel altera, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Fasc. 21.**Ibid. ad lin. 5. post JB. add.*Tom. 3. 159. Item Gnaphalio vulgari similis, *ejusd. ibid.**Ibid. ad lin. 9.*Filago vulgaris tenuissimis foliis erecta, *Turnesfortij, Elem. Bot. 360.**Ibid. post lin. 9.*

Gnaphalium minimum tenuifolium, è Monte Tabulari D. Stonestreet.

*Ibid. post lin. 13.*Gnaphalium minus *Aethiopicum*, valde tomentosum, capitulis nigris strigosis. Huic referendum existimo Gnaphalium supinum, Lavendulae folio; *Bocc. pag. 107. Tab. 85.**Ibid. post lin. 18.*Gnaphalium minus erectum, oblongis & angustis foliis, floribus argenteis. Vela-
caumboo *Malabarorum*, à præcedenti vel in paucis discrepare videtur.Gnaphalium minus erectum, flosculis pallefcentibus, summo caule glomeratis, ex
*Insula Sancta Helena.*Gnaphalium *Aethiopicum* minus, subrotundis foliis, maximè tomentosis, summo
caule ramosius, floribus argenteis, à D. Stonestreet accepimus.*Ibid. post lin. 20.*Gnaphalium *Aethiopicum* ramosum, flosculis aurantiacis, f. Gnaphalium Elichry-
soides, comis aureis, ex *Promont. Bon. Spei.* atque etiam ex *Oris Coromandel* ha-
buimus.Gnaphaloides *Aethiopicum*, frutescens, stachadis citrinae foliis spinosis, summo
ramulo floribus albis, duriusculis, arctè conglomeratis.Gnaphaloides *Americanum* lignosum, Salicis brevioribus, & viridibus foliis, per
longitudinem caulium, tomento seu cotone ad foliorum exortus, densius glo-
merato. An Herba lanuginosa *Brasiliana. Pison. 230. Zazanaca* (fortè) *Mexicen-*
sibus. Hernand. apud Recc. fol. 184.

Q. U. A. N herba cujus radix lavando corpori inservit, ex *Carolina.* Quæ etiam ab
Ind. Orient. (ut audio) aliquando adfertur. Fortè Costi quoddam genus, Zin-
giberis radicibus similes, suaviter olens. An fortè Kuikiu sive Xinkieu radix
Sinica D. Wilhelm. ten Rhine Dissertat. de Anthritid. pag. 108. ubi Icon exhibe-
ter. Quæ Piscinæ injecta, odore suo pisces gregatim allicit, ex *ejusd. Mantiss.*
Schematic. pag. 156. Adeo odorata existit hæc radix, ut sola manuum attrita
tione sine ullo subjecto igne suavissimum spirat odorem Citrii & Jasmini Cata-
lonici æmulum, si non ferè inerrabilem, non necesse est ad suffitus adoleri flam-
mis; sola presentia cubilo, aut cœnaculum, quantum quantum sit, odore com-
plet; ob cujus fragrantiam à pluribus multum æstimatur. An Tagari radix in
Naupon pro lavando corpore, *CBP. 91. Part. 4. Ind. Orient. cap. 8.* Fortè etiam
Tauzarghent radix odorata, *Scaligefi Exercit. 142. JB. Tom. I. 481.* Occidenta-
lis enim *Mauritania*, quoque alumna est. An Radix *Americana Iridis Florentinae*
fragrantia.

fragrantia æmulans, cujus succo *Apalachites*, ut a pediculis sint immunes, & bene oleant, sua corpora frequenter lavant, *D. Rochefort Histoire des Antilles*, pag. 358. *Costus* *Irident* redolens, *Casp. Bauh. Theatr. Botan. fol. 673?*

Fol. 172. ad lin. 25.

Yehcaxihuitl sive *Gossipium*, *Hernandez apud Rec. 308.*

Ibid. ad lin. 34.

Gossipium arboreum, flore atro purpureo, *PBP. 337.*

Ibid. ad lin. ult.

Huc fortè spectat *Cacanguahuitl*, sive Signi arbor, ab aliis *Pochotl* vocata, *Nierembergij 326.* *Gossipium arboreum* maximum spinosum, folio digirato, lanâ sericeâ grisea, *Cat. Jam. 159.* Ubi res omnino diversas pro iisdem malè accipit Autor; nunc *Rubus exoticus*, *CBP.* Nunc *Ceyba de Oviedo*, nunc *Saamouna* velit, quæ dicta tam varia, non parvam fidem faciunt, se ignorasse quidnam esset *Saamouna*, quidnam *Rubus exoticus*, &c. Hic sanè ubique toto suo Catalogo, plurima extripit frustra, malè annexo ad unamquamque ferè Herbam, & Arborem, nominum acervo.

Fol. 173. post lin. 7.

GRAMEN sparteum, spicis Cupressi formibus numerosis, ad caulium nodos extrutriculis irrupentibus, *Colletteepillee Malabarorum.*

Gramen sparteum avenaceum pumilum, *Indiæ Orientalis, Ravanamese Malabarorum.*

Ibid. post lin. 9.

Gramen sparteum *Virginianum*, spicâ secalinâ.

Ibid. ad lin. 16. add.

Ponnepillee Malabarorum ad lin. 23. pro *Amethystinis pone Cyaneis*.

Ibid. ad lin. 26.

An *Gramen* *dactylon bicornè*, spicis purpurascensibus minus, *Cat. Jam. 34.*

Ibid. ad lin. 29.

An *Gramen* *dactylon bicornè*, spicis purpurascensibus majus, *Cat. Jam. ibid. ad calcem.* *Ischæmonum*, seu *Digitatorum*, hoc & proximè præcedens *Gramen*, reponi debent.

Fol. 174. post lin. 3.

Gramen bromoides, sive *Avena sterilis*, *Indiæ Orient. Torapo Malabarorum.*

Gramen festucarium, s. *Festuca avenacea sterilis*, spicâ prælongâ, spadiceâ, ex *Insulâ Johanna.*

Ibid. post lin. 7.

Gramen avenaceum, *Marianum* purpureum, sparsâ paniculâ, pulchrâ.

Ibid. ad lin. 16.

An *Gramen* avenaceum, paniculâ minus sparsâ, cujus singula grana tres aristas longissimas habent, *Cat. Jam. 35.*

Ibid. post lin. 23.

Gramen frumentaceum parvum, articulatâ spicâ simplici, plurimis granis uno versu ad internodia sessilibus, ex *Insulâ Johanna.*

Ibid. post lin. 25.

Gramen paniceum *Virginianum*, majoribus granis, spicâ simplici molli.

Gramen paniceum parvum, spicatum, *Boeticum.*

Fol. 174. post lin. 28.

Gramen paniceum, spicatum, asperum, latiori folio, *Indiæ Orientalis*. Peapillee *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 37.

Gramen paniceum distachyophoron, f. spica gemella, binis granorum ordinibus, uno versu constante *Ind. Orient.* Ponnevaragupille *Malabarorum*.

Gramen paniceum, spica simplici, ad caulem intervallatâ, binis granorum ordinibus, uno versu constante, *Americanum*.

Ibid. ad lin. 38.

An Gramen Cyperoides polystachion, spicis ad nodos ex utriculis, f. foliorum alis echinatis prodeuntibus, *Cat. Jam.* 36.

Fol. 175. ad lin. 2.

Fortè Catechu *Officinarum*.

Ibid. ad lin. 12.

Gramen dactylon procumbens, crassum, & viridius, culmo reclinato, *Cat. Jam.* Ubi ineptè quæritur, an sit Gramen Ischæmon, *Bermudense* speciosius, foliis brevibus, obtusis, *Phytogr. Tab.* 245. fig. 1.

Ibid. ad lin. 16.

An Gramen dactylon, spicis gracilioribus, plerumque quatuor, cruciformiter dispositis, *Cat. Jam.* Hoc etiam ex *India Orientali* aliquando habuimus, sub titulo Codemutaugepillee *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 18.

An Gramen dactylon, spicis brevibus crassis, plerumque quatuor, cruciformiter dispositis, *Cat. Jam.* Cavareecodder *Malabarorum*, & interdum Wootarepillep, eorundem.

Gramen Ischæmon *Ind. Orientalis*, panicula longâ, spicis gracilioribus, pallidis. Cumboopillee *Malabarorum* & interdum, sub nomine Caverrepille ab iisdem locis accepimus.

Ibid. ad lin. 25.

Comacheepillee *Malabarorum*. Hoc quoque est Gramen aromaticum, & Schoenanthos altera species.

Ibid. ad lin. 27.

An Gramen polydistachyophoron, lanuginosum, *Hort. Catholic. Fr. Cupani* 90. & pag. 92.

Ibid. ad lin. 29.

An Gramen dactylon bicorni, tomentosum, maximum spicis numerosissimis, *Cat. Jam.* 33. Capupuba *Brazilianis*, Gramen plumeum, *Maregr. fol.* 2. Item Gramen dactylon panicula longâ, spicis plurimis, gracilioribus, & longis, *Cat. Jam.* 34. Item Gramen dactylon panicula longâ, & spicis plurimis gracilioribus, purpureis, vel viridibus mollibus, constante; ejusdem. An Gramen Serpentarium *Zeylanicum*, *Horto Pagellano* *Breyn. Prod.* 1. 54. Hujus enim nostri folium Xerampelinum, maculis majoribus, atris, variegatum, haud semel obfervayimus, aspectu jucundissimum.

Fol. 175. post lin. 29.

Gramen Ischæmon minus, prælongis spicis tenuissimis, *Americanum*, ex Terra Mariana.

Ibid. post lin. 35.

Gramen dactylon supinum, folio arundinaceo minimum, ex India Orientali. Cole-narrunillu Malabarorum.

Ibid. ad lin. antepenult.

An Gramen dactylon elatius, spicis plurimis tomentosis, Cat. Jam. 33. Item Gramen dactylon, Alopecuroidis facie, panicula longissima, è spicis plurimis tomentosis constante, *ejusd.* Ubi nimis ineptè quærendum proponitur; an sic Gramen alopecuroides *Curassavicum*, spica longissima, sericea, candida, PBP. 338. Hoc idem Gramen Ischæmon, villosis paniculis; ex India Orientali, accepimus, arque Poopillee à Malabareis nuncupatur.

Fol. 176. post lin. 5.

Gramen filiceum, India Orientalis, paniculis integris, f. non ramosis, in prælongam spicam, uno versu prorumpentibus. Narracuchapillee Malabarorum.

Ibid. post lin. 7.

Gramen paniculis elegantissimis, fortè Eragrostis major, CBP. ex Ind. Or. Tuli-pillee Malabarorum.

Gramen amoris Marilandicum paniculis azureis.

Ibid. ad lin. 10.

An Gramini tremulo affine paniculatum, elegans, minimum, Cat. Jam. 34.

Ibid. ad lin. 12.

An Gramini tremulo affine, paniculatum elegans majus, spicis minoribus, & longioribus, Cat. Jam.

Gramen filiceum, f. *Amourets* spica longa, variis minoribus, spiculis composita, ad unum latus spectante. Cauderepilepu. Malabarorum.

Gramen amoris Indianum panicula ramosa, è spicis vix perceptibilibus concinnata. Pangepillee Malabarorum.

Ibid. ad lin. 22.

An Gramen Miliaceum sylvaticum maximum, semine albo, Cat. Jam. 34.

Ibid. ad lin. 24.

An Gramen Miliaceum majus, panicula minus sparsa, locustis minimis, Cat. Jam. Fortè etiam Gramen Miliaceum, panicula viridi, vel purpurea, *ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 25.

Milium *Curassavicum* minimum, PBP. 353.

Ibid. ad lin. 27.

Gramen Miliaceum viride, foliis latis, brevibus, panicula capillacea, semine albo, Cat. Jam. 35.

Ibid. post lin. 27.

Gramen Milaceum minus, *Virginianum*, granis grandioribus.

Gramen Miliaceum, Coodepileepoo, Malabarorum.

Gramen Milaceum, panicula minus sparsa, Challendenai, Malabarorum. Ex hujus foliis, in Oryza infuso coctis, Oris collutio fit, in Angina summè utilis.

Gramen

Fol. 176. post lin. 27.

Gramen Miliaceum, latiori folio *Virginianum*, jubâ diffusâ, s. paniculâ arundinaceâ, tenui.

Gramen Miliaceum angustioribus foliis *Marianum*, paniculâ capillaceâ, sparsâ.

Ibid. post lin. 29.

Gramen Arundinaceum minus elegans, Cûchemilepillu, *Malabarorum*.

Gramen Arundinaceum, paniculâ argenteis plumis tomentosa, Naunelpu, *Malabarorum*.

Gramen agrorum, Venti Spica, *Marilandica*.

Ibid. post lin. 31.

Gramen pratense majus, *Ind. Or. nostrati simile*, paniculâ elegantiori; Nellematchepille, *Malabarorum*.

Gramen spicatum elegans, spicâ plurimis minoribus spicis cauli adnatis, compositâ Narrecuchpille *Malabarorum*.

Gramen pratense minus, *Ind. Or. nostrati simile*; Caudneupillee *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 44.

Gramen minus Alopecuroides, *Gaditanum*, aliquantulum à nostrate diversum.

Fol. 177. ad lin. penult.

Gramen echinatum maximum, spicâ rubrâ vel albâ, *Sloane, Cat. Jam. ubi pro more suo, quæritur*, àn Gramen geniculatum, foliis brevibus aculeos mentietibus, *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 189. fig. 3.* Cum nulla inter hæc Gramina, intercedat similitudo.

Ibid. ad lin. ult.

Culmo reclinato, procumbit hoc genus. An Gramen maritimum echinatum procumbens, culmo longiori, & spicis strigosioribus, *Cat. Jam. 30.*

Fol. 178. ad lin. 9. add.

Tuncaddepillee *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 12.

Gramen Cyperoides *Marianum*, Junci paniculâ sparsâ.

Graminis Cyperoidis species minor *Indiana*, paniculâ Junci compactâ minore, *Shagapucorea Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 15.

Tagatacoræ *Malabarorum*.

Ibid. post lin. 15.

Gramen Cyperoides hirsutum, spicis plurimis, summo caule glomeratis, glumarum apiculis recurvis, *ex Virginia*.

Gramen Cyperoides *Virginianum*, spicis integris non squammatis, apicibus in furcam desinentibus, fastigio caulis, glomeratis.

Gramen Cyperoides *Marianum*, Tamarisci *Belgarium* pericarpus, ad intervallum calami conglomeratis.

Ibid. ad lin. 17.

An Gramen Cyperoides, paniculâ conglomeratâ, è plurimis spicis cinereis, constante, *Cat. Jam. 36.*

Fol. 178. ad lin. 19.

An Juncus Cyperoides, culmo compresso, striato, radice odorata, tuberosa, capitulo rotundo, compacto, Cat. Jam. *ibid.*

Ibid. post lin. 28.

Gramen Cyperoides *Marianum*, habitioribus, teretibus, & compactis Cupressiformibus spicis, ad summum caulem, pediculis innitentibus.

Gramen Cyperoides *Indiæ Orientalis*, spicâ Cupressiformi, cochlearâ, prolifera, feminis glumâ binis aculeis denticulatâ; f. Gr. Cyperoides cochlearatum, bidens.

Cooppucorâe *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. antepenult.

An Gramen Cyperoides minimum, spicâ simplici, compactâ, radice tuberosa, odorata, Cat. Jam. 36.

Fol. 179. post lin. 3.

Graminis Cyperoides species major, *Vaudemaulecode*, *Malabarorum*.

Gramen Cyperoides citratum, *Ind. Or.* foliis odore corticum Citri; *Vasnapillee Malabarorum*. *Narcaphthum* seu *Nascaphthum* (fortè *Dioscoridis*, quod jucundi odoris gratiâ suffitur, & *Thymiamatis* miscetur, lib. 1. cap. 22. Hoc autem corticosum esse dicitur, *Mori* libro simile. Et sanè *Narcaphthi* historiam adeò paucis perstrinxit Author, ut quid rei sit difficillimum est statuere, hujus neque *Galenus*, neque *Ælius*, neque *Plinius*, neque *Theophrastus* meminèrunt; Recenset quidem *Theophrastus* *Narram*, inter Aromata, quæ unguentis miscentur, lib. 9. de *Hist. Plant.* Esse autem *Narram*, eandem cum *Narcaphtho*, *Manardus* suspicatur potius, quam certum decernat lib. 9. *Epist.* 3. An igitur rectius *Carpesium* sit *Galenus*; qui in libro suo de *Theriac. ad Pisonem*. scribit, *Carpesium* esse festucas, quasdam tenues aromaticas, similes in gustu *Phu*, (i. e.) radici odoratae ejusdam herbæ, quam nonnulli illam esse Opinantur, quæ vulgò *Valeriana* dicitur; licet non omnia quæ de *Phu* scribit *Dioscorides*, *Valeriana* conveniant. Sed re verâ brevior est hujus quoque descriptio, quam ut aliquid certi inde haberi possit.

Ibid. ad lin. 4.

An Gramen Cyperoides minimum, spicis pluribus compactis, ex oblongo, rotundis, Cat. Jam. 36.

Gramen Cyperoides, spicâ longiore compressâ, glumarum marginibus argenteis, *Mashecorâe Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 7.

An Gramen Cyperoides majus, spicis ex oblongo rotundis, compactis, ferrugineis, Cat. Jam. 36.

Gramen Cyperoides, paniculâ dactyloide, ex *Insulâ Johanna*.

Gramen Cyperoides *Oriente*, paniculâ elegantissimâ, spiculis Graminis amoris, in glomerulos conflata. *Neercorea Malabarorum*.

Gramen Cyperoides, an potius *Cyperus Indica*, Graminis Amoris spicis plurimis, in summitate caulis.

Ibid. ad lin. 9.

An *Cyperus* paniculâ maxime sparsâ, ferrugineâ, compressâ, elegantissimâ, Cat. Jam. 35. Fortè Gramen Cyperoides minus, paniculâ sparsâ spadiceâ, ex

Insulâ Coracao Breyn. Prodr. 2. 53.

O

Gramen

Fol. 179. ad lin. 9.

Gramen Cyperoides *Virginianum*; elatius, panicula spadicea, minus sparsa, radice tuberosa. An Cyperi genus *Virginianum*.

Gramen Cyperoides minus, Junci compacto capitulo albo, globoso, ex *Oris Coromandel*.

Gramen Cyperoides *Lithospermi* semine, *Virginianum*.

Ibid. post lin. 11.

Gramen Cyperoides, panicula *Juncea*, *Aethiopicum*.

Gramen Cyperoid. *Ind. Or.* foliis hirsutis pubescentibus, intervallata panicula pulchra, *Poonarrepille Malabarorum*.

Gramen Cyperoides *Oriente* perpusillum, capitulis subrotundis, hispidis, plerumque gemellis. *Vanamalleccoddee Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 18.

Gramen eriophoron. *Africanum*, flore lanato, Gladiolo vel *Sisyrinchio* forte affinis, flore flocculosa lanugine fimbriato. Hæc revera est, Perfoliato angustifolio montano *Columnæ* similis, Planta umbellifera nova, fructu triplici membraceo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Fasc. 25.*

Ibid. ad lin. 22.

An Gramen Cyperoides majus aquaticum, paniculis plurimis junceis, sparsis, ex oblongo rotundis, spadiceis, *Cat. Jam.*

Ibid. post lin. 29.

Gramen junceum *Oriente*, f. *Juncus* foliaceus elatior, panicula magis sparsa, *Arnacorea Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 31.

An Gramen Cyperoides sylvaticum, maximum, geniculatum, asperius, semine *Milij* solis, *Cat. Jam. 36.*

Ibid. post lin. 41.

Gramen junceum *Ind. Orient.* majus, capite rotundo, ex spiculis paleaceis, summo caule glomerato. *Shanecoree, Malabarorum*.

Ibid. post lin. ult.

Gramen junceum *Ind. Orient.* minus, capitulo rotundo, ex paleaceis spiculis, in cacumine caulis glomerato; Graminis *busonij* æmulo. *Callapillee Malabarorum*, cum proxime precedenti plurimum convenit.

Fol. 180. post lin. 8.

Gramen spicatum floridum, Orchidis facie, *Prom. Bon. Spei.* An Gramen triglobum bulbosum, *Manomotapens. Breyn. Fasc. 24.*

Ibid. ad lin. 11.

Hæc forte accenseri meretur, Gramen omnium minimum, loculis *Lunariæ Græcæ, Bocon. Mus. Plantar. Tab. 59.* Gramen capsulis *Lunariæ Græcæ* donatum, articulat. minimum, à tenuissimo pediculo pendentibus, uno versu dispositis, *Bonomiensis, ejusd. pag. 69.*

Ibid. ad lin. 18.

Ad hunc Plantarum Classem consociari velim *Atehuapatli*, f. *Herba* nascens juxta rivus, *Hernandez apud Rect. 264.* Sub nomine *Gratiolæ Scordioides Mexicana* radice reticulata. Ut & *Chichica-Quilitl, Novæ Hispan. Terentij apud eundem*

eundem Recc. 364. Sub hoc titulo, viz. Gratiola Scordioïdes Americana, latiori folio, caule geniculato. Videtur etiam Chiantzulli alia, Hernandez apud Recc. 234. Inter Gratiolarum Cohortes militari.

Ibid. ad lin. 28. add.

Yellechellendenai Malabarorum. Huic etiam Nir-Schulli, Hort. Malabaric. accedens è Coromandel, hujus Almagest. fol. 264. proximè accedit.

Ibid. post lin. 28.

GRATIOLÆ affinis Coromandeliana, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capsulis bivalvibus, in laxiorem spicam congestis. Huc fortè spectat Valli-upudali, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 45. Hujus autem folia sunt majora, & pilosa, proinde nuncupatur à Commelin. Not. in loc. Digitalis affinis Malabarica, folio piloso.

Ibid. ad lin. 33.

Deleantur quæ sequuntur verba, viz. India Occidua Palmæ sanctæ similis arbor, Adv. Lob. & Icon.

Ibid. ad lin. 34.

Inquirendum propono, an Panitsjika-maram, Hort. Malab. Part. 3. Tab. 41. (i. e.) Janipaba, Personis lib. 4. cap. 16. Ut censet Commelinus in Not. & Junipapeywa Brasiliensis, Clus. exot. lib. 1. cap. 10. Si de hujus genere Plantarum vel non; Genipat Therueti (inquit Commelinus) si non Panitsjika-maram, saltè species hujus est. Insuper J. Bauh. Hist. Pl. Tom. 1. lib. 3. cap. 4. & 5. Plura hujus Arboris genera, è variis Autoribus collecta, recenset.

Fol. 181. ad lin. 7.

Huc fortè pertinent Ighucami Brasiliæ, de Laet. Ind. Occid. lib. 16. cap. 11. Caoup Maragnanæ Insulæ, ejusd. ibid. Item Agouti-treva ejusd. Insulæ, Laetij ibid.

H.

Fol. 181. ad lin. 13.

HUC fortè spectat Cenanam de Quahuna-hoac, Nov. Hispan. Terentij apud Recc. 361. Ut & Quauthlayexochitl apud eundem fol. 404.

Ibid. post lin. 20.

HEDERA monophyllos Virginiana, umbilicatis foliis baccata, ossiculo compresso, lunato, singulari. Baccifera ossiculo compresso lunato, Planta Virginiana caudice lento, scandente, foliis hederaceis, Nasturtij Indici more umbilicatis, Banist. Car. Mss.

Ibid. ad lin. 23.

Toxicodendron triphyllum glabrum, Elem. Bot. 483.

Ibid. ad lin. 30.

Toxicodendron triphyllum, folio sinuato, pubescente, Turnesortij Elem. Bot. 483.

Fol. 181. post lin. 30.
Hedera surrecta triphylla, medio folio Querciformi, Virginiana, ex feminibus or-
ram conspeximus, in Hort. Med. Chelſeiano.

Ibid. ad lin. 36.

Post vocem Orientalis adde Coryli foliis.

Ibid. ad lin. ult. add.

Coodewengce Malabarorum.

Fol. 182. ad lin. 2.

Abutilo affinis arbor, Althææ folio, cujus fructus est styli apex auctus, qua-
tuor vel quinque siliquis hirsutis, funis adinstar in spiram convolutis, constans,
Cat. Jam. 97. Hæc pro Helicteride nostrâ Occidentali, ponitur; Atqui vero ab
Autore sagaci, quoad morem usitatum ibi quærendum proponitur, an sit Iloca-
murri, Hort. Malab. (i. e.) Helicteres nostrâ Orientalis, proximè præcedens in
Almagesto. Ubi hoc artificio, & callidâ insinuatione, has duas inter se specie
plurimum distinctas, & nobiles Plantas, malè confundere moliretur.

Ibid. ad lin. 5.

An Heliotropij flore, Frutex baccifer racemosus, folio rugoso, fætido, maximo,
subrotundo, hirsuto, fructu albo, Cat. Jam. 173. Heliotropium frutescens Ca-
raſſavicum, odore Salviæ, PBP. 340. Aguaraquinha fortè Braſilienſium; Pi-
ſonis 229.

Ibid. ad lin. 8.

Variat aliquando foliis angustioribus. Hæc autem est Planta capsularis, monen-
te insigni Botanico, D. Stoneſweet, capsulam triquetram, multa semina parva in
& continentem, ferens.

Ibid. post lin. 8.

HELIOTROPIUM majus cæruleum, Cannæ Indicæ angustifoliæ facie, ex
Terrâ Mariand.

Heliotropij genus Marianum, Mercurialis folio angustiori.

Ibid. ad lin. 10.

Heliotropium arboreum maritimum tomentosum, Gnaphalij Americani foliis,
Cat. Jam. 93.

Ibid. ad lin. 16.

Heliotropium maritimum minus, folio glauco, flore albo, Cat. Jam. 94. Ubi
Autor de hujus plantæ Synonymiis, ex Phytographiâ nostrâ, enumerationem
pangit, qui tamen eam non citat, sed pro suis venditat, gaudens magis alienis
ornari plumis, quam Creditori suo honorem ferre debiti.

Ibid. post lin. 29.

Heliotropij affinis, Balsaminæ fam. folio, Planta capsularis, ex Terrâ Marianâ.

Ibid. post lin. 35.

HELLEBORINE Mariana, Bupleuri angustissimo folio, purpurascente flore,
caule aphylo; ab hac parùm distat, Helleborine angustifolia, flore rubente, Vir-
giniana, Banisteri.

Ibid. post lin. 39.

Helleborine Mariana, flore pallide purpureo, trianthophoros.

Helleborine Mariana Monanthos, flore longo purpurascente liliaceo.

Fol. 182. post lin. 39.

Helleborines affinis, *Planta Mariana*, *Herbæ Paridii* facie, quinquefoliata.

Ibid. post lin. ult.

Helleborine Virginiana, flore rotundo magno, ex purpureo-albicante, *Banist. Cat. Mss.*

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, foliis binis è radice, ex adverso prodeuntibus, flore purpureo.

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, flore gemello candido, venis purpureis striato. *Binis quoque foliis hæc prædita est, alterum ad radicem, alterum ad caulem alterno situ promens, cujus florum petala sunt multò latiora, & breviora, cæteris hujus sortis. Æstivo tempore floret.*

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, Liliij convallium folio unico, caule tomentoso, floris Utriculo maxime elongato.

Fol. 183. post lin. 2.

Helleborine Virginiana, flore rotundo luteo, purpureis lines striato, *Banisteri.*

The Polkassin - lower.

Helleborine Calceolus dicta, *Mariana*, caule folioso, flore luteo minore. *Mense Julij floret.*

Helleborines affinis Æthiopica, flore albo, tetrapetalo.

Helleborines affinis Æthiopica, parva planta, tripetalos.

Helleborines facie, *Planta hexapetala*, *Graminis Parnassi* floribus, *Orientalis*. *Madellvelladee Malabarorum.*

Ibid. post lin. 4.

Helleborus albus minor botrytis, *Ephemeris phalangoides Virginiani* foliis, magnâ sui parte caulem vaginantibus, floribus amplioribus atro purpureis, ex *Angola*.

Ibid. post lin. 12.

HERNIARIA Alsinites annua major, *Griseij Virid. Lustr.* Ab *Alfine* marinâ Centum granâ crassiore folio perenni, *Almag. nostri* fol. 20. plurimum diversa. Hujus exemplar in *Horto spectatiff. viri D. Uvedal, Enseldiæ*, collegimus.

Fol. 183. ad lin. 19.

Draba maritima repens carulo-purpurea, quibusdam *Leucoium marinum* alterum, latifolium, purpureo-violaceum, *Lob. Obs. & Icon.* *Leucoium marinum* alterum latifolium, *Lobelij, Hist. Lugd. fol. 1360.* An *Leucoium marinum* minus, *Hesperis* quorundam, ejusdem *Hist. Lugd.* quæritur à *Casp. Baub. in Pinace. 202.*

HESPERIS Virginiana Cochleariæ folio, flore albo ampliore; an *Cochlearia* flore majore, *Banister Cat. Virg.*

Hesperis Virginiana, *Nasturtij Babylonici* foliis, lætè virentibus. Plurimis convenit proximè præcedenti; folia habet longiora magis dentata, vel sinuata potius, & flores paulò minores. Ad *Nasturtia* fortè utraqûe rectius relegandæ.

Hesperis Hispanica, *Leucoij* foliis, summâ siliquâ corniculata, sive lunata; in *Hort. Med. Cheliseæ*, ex feminibus à laudato *D. D. Preston* communicatis, observavimus; à subsequenti autumno, haud multum dispar.

Hesperis parva, prælongo & rariùs dentato folio, floribus magnis, peramœnè caruleis. Sub *Keiri* nomine, ex *Aleppo*, *Herbarij Vrvi* ad eundem locum collecti.

Huic

Huic quodammodo convenit, & fortè idem est, Eruca purpurea, aliis cærulea, s. Viola petraea, *J.B. Tom. 2. 865.* Qui inter Plantas siccas *D. Agerij*, comperit eam dici Violam petraeam à *D. Hardero*. Fortè etiam Hesperis Pyrenaica longifolia, hirsuta, odorata, *Schol. Bot. 93.* An Leucoium *Lusitanicum* purpureum, foliis elegantè dentatis, *PBP. 346.*

Ibid. ad lin. 23.

Leucoium luteum aizoides montanum, *Fab. Column. Ecphraf. Part. 2.* Bursa pastoris alpina, rosea, lutea, folio crassiusculo, Sedi vermiculati more, sed hirsuto, loculo oblongo, itidè hirsuto, *Hist. Oxon. 306. (i.e.) Paronychia Myosotis lutea, &c. Almagest, Bot. fol. 281.*

Fol. 183. post lin. 26.

HEXAPETALA spicata, Sifynrichij foliis, floribus in longiorè spicam dispositis; Ullarehan Malabarorum. Hyacinthi fortè species Indiana.

Ibid. ad lin. 27.

An Hieracium fruticosum, angustissimis graminèis foliis, capitulis parvis, *Cat. Jam. 123.*

HIERACIUM *Africanum*, latiori Bupleuri folio, flore Pilosellæ, ad caulium nodos lanuginosum.

Ibid. post lin. 41.

Hieracium quintum villosum *Clus. Hist. 2. fol. 141.* Hieracium (fortè) montanum tomentosum, *HRB. pag. 95.*

Hieracium *Africanum* bulbosum, Pilosellæ flore singulari, foliis rarius dentatis, caule ad radicem valdè tomentoso. Chontrilla bulbosa *Africana.*

Ibid. post lin. ult.

Hieracium *Marianum*, Pulmonariæ Gallicæ subrotundis foliis, Lactucæ floribus parvis.

Fol. 184. post lin. 2.

Hieracium umbellatum *Africanum*, pilosissimum, Doronici rotundioribus foliis, amplexicaule, floribus saturatè croceis; Huic autem ad radicem folia, sunt longiora, pediculis donata.

Ibid. ad lin. 13.

Sonchus Tingitanus, Papaveris folio, Turnesfortij *Elem. Bot. 377.*

Ibid. post lin. 13.

Hieracium *Marianum* perelegans, Lapathi venis sanguineis inscripti foliis, flore parvo flavescente.

Hieracium Indicum Sonchifolium, caule nudo, flore albicante. An Yztac-Cihuatl, sive Femina candida, *Hernandez apud Rec. 208. in Horto rarioribus Plantis orato. Dottiſſ. viri D. Uvedale Enfeldii cultum Observavimus.* An fortè Lactuca sylvestris pumila, *Parkins. 1622.* A Monarde ad dolorem dentium sedandum celebrata.

Hieracio similis, *Ind. Or.* umbellatis floribus, radice crassa, & carnosa. Paringehokka Malabarorum. A Medico ejus usu, & similitudine externa, China radix à Nostratis illic commorantibus, nuncupatur.

Hieracium asperum *Hispan.* foliis ad radicem Raphani fativi, flore luteo singulari.

Fol.

Fol. 184. post lin. 17.

**Hieracium Chondrilla dictum, Canariense; Crupinae Belgarum foliis tenuissimè lacinia-
tatis.**

Ibid. post lin. 24.

Hieracium Intybaceum, foliis ad oras hirsutis hispidis, latiore basi in alas elonga-
tis, absque petiolo caulem amplexantibus. **Senecio hirsutus, CBP. 131.** **Eri-
geron tertium Dodon. edit. Lar. 641.** **Erygeron tomentosum, Lob. Icon. 226.**
Erygeron tomentosum alterum, Ger. emac. 279. **Cichorium fatidum a nonnullis
vocatam.** Hoc verò maximè diversum censeo, à Cichorio pratensi luteo laevio-
ri, **CBP. 126. (1. e.)** **Dentis Leonis tertia Species, Dodon. 636. Tabernæm.
Icon. 175.** **Hieracium luteum glabrum, seu minùs hirsutum, JB. Tom. 2. Part. 2.
1024.** Quæ itidè differt ab Hieracio foliis & facie Chondrillæ, **Lob. Icon. 239.**
Quæ nec debet confundi cum Hieracio Chondrillæ folio glabro, **CBP. 127.** Sive
Hieracio Aphacoides, **Tabern. Icon. 182.** Uteunque à Joanne Bauhino omnes con-
funduntur.

Hieracium asperum, ex Sicilia Horti Uvedalensis.

Ibid. post lin. 37.

**Hieracij peculiare genus Coridis folio, Æthiopicum, seminum pappis densius radi-
atis.** An Eupatorio affinis, suffrutex Ericoides capitatus, Coris s. Juniperi fo-
lio, **Capit. Bon. Spet. Breyn. Fasc. rar.**

Fol. 185. ad lin. 11.

Post vocem *Gomerà* add. quæ una est ex *Fortunatis. ad lin. 12. add.* An *Sclarea
Eusitanica glutinosa, amplissimo folio, Turnesfort. Elem. Bot. 148.*

Ibid. ad lin. 24.

Post **CBP. add. Park. Theatr. Plantar. 57. ad lin. 31. post inventum est, add.**
Hörminum sylv. vulgare, s. Oculus Christi, Park. Theatr. 55. & in append. 1680.
Ubi hujus *Icon* exhibetur, sed minùs accuratè excusculpta.

Ibid. ad lin. 33.

Hörminum sylvestre incanum, flore albo, Park. Theatr. Plant. 55.

HORMINUM Virginianum, latioribus foliis dissectis; floribus purpureis.

Ibid. post lin. 36.

Hörminum parvum Marianum, Rapistri foliis hirsutioribus.

**Hörminum Virginianum minus glabrum, folio Rapistri lineis purpureis virgato,
floribus parvis longo rubulo donatis.** An rectius de Sidericidum censu existi-
mandæ sunt.

Ibid. ad lin. 38.

Si folia alterno situ posita non repugnarent, eandem hanc esse plantam suspica-
rer, cum *Maro Egyptiorum, Prosp. Alpini. de Pl. exot. pag. 253.*

Ibid. post lin. 40.

Hörminum Melissophyllon, ex Terrâ Marianâ, spicâ longâ gracili.

Fol. 186. ad lin. 1.

Post vocem, *Dalechamp. leg. Hist. Lugd. 1121. ad lin. 23. leg.* An *Hormiao* affi-
nis, foliis angustis glabris, *Cat. Jam. 65.*

Fol.

Fol. 186. ad lin. 4.

Ab hac quoque non prorsus abhorreere videtur, *Horminum nigrum rugoso*, hirsuto *Mentastri*, aut *Scorodoniz folio*, *Boccon. Mus. Pl. pag. 163. Tab. 130.*

Fol. 187. post lin. 18.

HYACINTHO affinis *Africana*, caulescens, Polygonati plicatis foliis, ex medio caule pediculum didorum, floribus cœruleis, peramplis odoratis, prælongo collo gracili, singulis inter bina foliola exeuntibus, spicatum, lateraliter emittens. Hanc pervenustam raram & prorsus novam plantam, in fictili vase cum floribus superbientem, primò ostendit nobis humanissimus Vir, & rerum Naturalium Æstimator eximius, D. *Jacobus Ayre*, qui hujus bulbum habuit inter alia curiosa, à *Promont. Bon. Spei.* sibi allatum.

Fol. 189. post lin. 5.

HYPERICUM pumilum sempervivens, caule compresso ligneo, ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo; *Crux Sancti Andree* D. *Banister. Cat. Stirp. Virginienf. St. Andrews & Wozt.*

Ibid. post lin. 10.

Hypericum minus Arabicum, ramosissimum, angustis longioribus foliis, floribus parvis, ex *Aleppo*. An *Hypericum Syriacum* Ger. *emac. 539.*

Ibid. post lin. 12.

Hypericum Virginianum ramosius, parvis foliis, floribus exiguis.

Ibid. ad lin. 17.

An fortè *Tamoxo* suffrutex, *Clusio, JB. Tom. 1. lib. 10. fol. 359.* Frutex exiguis foliolis confertus, *CBP. 479.* Fortè etiam *Hypericum humile procumbens*, multicaule, densè fruticans, Cupressiforme, vulgo *Pirico* à *Macchia Hort. Catholic. Fr. Cupani, pag. 100.* An *Coris lutea Ericoides* fruticans, *Hispanica, Boccon. Mus. Plantar. pag. 83. Tab. 74.*

Ibid. ad lin. 28.

An forsàn *Androsæmon*, amplo perfoliato folio, *Boccon. Mus. Pl. pag. 164.* An *Androsæmum Sambac* perfoliato folio, *ejusd. Tab. 127.*

Hypericum latiori folio, f. *Androsæmum perforatum* elegans, flore carne *Mariandicum.*

Hypericum ramosum, amplioribus subrotundis, crenatis foliis, *Americanum*, floribus luteis. An fortè *Hypericum frutescens luteum*, *Phillyrea foliis Virginianum*, *Banister. in Horto Comptoniano Fulhamiæ.* curâ industrij. Hortulani *Johannis Adams*, ex seminibus nutritam observavimus.

Fol. 190. post lin. 7.

Hypericum parvum Virginianum caule quadrato, sive *Ascyrum minimum*, D. *Banister. Cat. Stirp. Virg.*

Ibid. post lin. 10.

Hypericoides ex *Terrâ Marianâ*, floribus exiguis luteis.

Ibid. post lin. 13.

HYSSOPIFOLIA, flore albo, ex *Provincia Marianâ.*

I.

HUIC nostræ haud admodum dissimilem plantam, excepto floris colore, D. Bocconus pinxit in Mus. Pl. Tab. 76. Sub nomine Jaceæ majoris, Pinceis foliis, luteo flore, capite spinoso.

Ibid. ad lin. 34.

Jaceæ altera non ramosa, tuberosa radice, foliis latioribus, flores ferens pauciores, majores, squamis hiantibus armatos, & pediculis curtis insidentes, Banister. Cat. Virg.

Ibid. ad lin. 36.

Jaceæ Virginiana, Leucoij petræi folio rigido, floribus pulchrè purpureis, ad nodos caulium in laxiorem spicam dispositis. Jaceæ ramosa, tuberosa radice, foliis plurimis rigidis, perangustis, flores ferens multos, parvos, rubentes, acaulos, in spicâ ad caulem sessiles, Banist. Cat. Virg.

JACEA angustiori folio Virginiana, hirsuto caule, capite oblongo, spinoso, squamis hiantibus rigidis, ornato. An Cyanus Centauroides fruticescens, Lavandulæ folio, Cap. Bon. Spei. Breyn. Fasc. 21.

Fol. 191. post lin. 27.

Jaceæ Sicula, glaucophylla, capitulo oblongo, ad squamarum apices, spinulis deflexis semi-stelliformiter ornata. An Jaceæ folio Cerinthes purpurascens flore, è Rupe Victoræ. Schol. Bot. 208.

Jaceæ Hispanica foliis ad radicem Cichoraceis; supernis verò integris, mollibus, minutim denticulatis. Colitur in Hort. D. Uvedale.

Fol. 192. post lin. 17.

Jaceæ marina, purpurea, Erucae folio, alato caule, capitulorum squamis summo apice, plurimis spinulis coronata, ex Sicilia.

Ibid. ad lin. 35.

An Cyanus arborescens longifolia, Prosp. Alpini, de exot. pag. 31.

Ibid. ad lin. 41.

Vice minores, lege pauciores.

Fol. 193. post lin. 2.

Jaceæ lutea, capite longis aculeis spinoso, C.B.P. quæ tertia in Prodrum. ubi dicitur, Hæc à Jaceæ montana, echinato capite, Clusij diversa est, cujus etiam flos aliquando luteus evadit. An hæc sit Carduus Solstitialis major, seminibus Crupinæ Belgarum, Domino Robart, quam habuit à Doctore Richardsono. Attamen à Carduo Lusitano, capite arancosa lanugine obsito, in præcedentibus exhibitio, plurimum diversa est.

Fol. 193. ad lin. 5.

An Carduus Lusitanicus, Erucae folio, Turnesortij; qui habetur in *Almagesto* nostro fol. 86.

Ibid. ad lin. 12.

An fortè Jacea Stæchadis folio, flore luteo, Boccon. Mus. Plant. pag. 77. Tab. 65.

Ibid. ad lin. 22.

Heliochryso sylvestri angustifolio similis, tota viridis, Boccon. Mus. Plantar. 145. Tab. 109.

Ibid. ad lin. 23.

Heliochrysum saxatile, singulari capitulo, acuto & angusto Stæchadis folio, Boccon. Mus. Plant. 142. Tab. 104.

Ibid. post lin. 28.

Jacea Elichrysoidea Asiatica, Hieracij Sabaudi angustis, virentibus foliis, caule nivo tomentoso.

Ibid. ad lin. 32.

Xeranthemum spinosum Æthiopicum, capitulis compactis purpurascens, Breyn. Prodr. 2. 105.

Jacea Olea foliis, capite spinoso, flore albo. Xeranthemum flore albo coronato, folio Cynoglossi Cretici, Breyn. Prodr. 2. pag. 105.

Fol. 193. ad lin. 39.

Parmica Xeranthemos, Hyacinth. Ambrosin. Phytolog. 571.

Ibid. ad lin. penult.

Senecio incanus, pinguis, CBF. 130.

JACOBÆA Africana Senecionis folio, pingui, flore purpureo majori. Hæc nobis à Cap. Bon. Spei. allata est, quam etiam, floribus suis superbientem, in *Horto Suburbano*, ampliss. Viri D. Caroli du Bois observavimus.

Jacobæa Senecionis folio incano, flore luteo minore, Prom. Bon. Spei.

Jacobæa radiato Senecionis flore, Chondrilla foliis Æthiopica.

Jacobæa minor Æthiopica, foliis laciniatis, Ruta Caninae divisuris.

Jacobæa Coronopi rigentibus foliis, Æthiopica.

Jacobæa Virginiana, foliis ad radicem integris, Eryngij campestris æmulis, cæteris autem elegantissime laciniatis.

Ibid. post lin. penult.

Jacobæa Æthiopica procerior, Lampanæ foliis, floribus luteis.

Fol. 194. post lin. 8.

Jacobæa Absinthites frutescens, tomentosis Cinerariæ foliis, Æthiopica, calyce integro, summis otis dentato. Tagetes fortè minimus, tenuiter diviso folio, Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 99.

Ibid. ad lin. 14.

An Jacobæa maritima, foliis subrotundis, araneosa lanugine pubescentibus, HBP. Turnesort. pag. 4. Epist. ad Sberardum.

Ibid. post lin. 19.

Jacobæa parvancana, Stœches Salamanticæ foliis, ex *Insula Johanna*.

Fol. 194. ad lin. 24.

Jacobaea pumila alpina, Boccon. Mus. di Piant. rare, Tab. 8. ubi optimum *Itanem* sis vide.

Ibid. ad lin. 29. post vocem floribus add. nudis.

Jacobaea Æthiopica spicata lutea, foliis parvis, crassis, & incanis, rigidiusculis, ex nodis caulium confertim erumpentibus. An fortè *Jacobaea* spicata *Monomota-pensis*, altera species, Breyn. Cent. 1. 138.

Ibid. post lin. 31.

Jacobaea Æthiopica, Chrysanthemi Cretici foliis, flore purpureo.

Jacobaea Charyophylli foliis, Mariana, floribus luteis, ferè umbellatis.

Jacobaea Africana, Hieracii fruticosi angustioribus dentatis foliis glabris, flore flavo octopetalo pulchro. An *Jacobaea Æthiopica* Lavandulae folio, Breyn. Cent. 1. 136.

Elichrysi species ex Africa D. Bobart. in Hort. Medic. Cheltenham florentem nuper conspeximus, & à *Conyza Melitensi* retusis foliis *Bacconi*, haud prorsus abluere videtur, licet folia per extremum sint minus retusa.

Jacobaea spicata Linariae foliis, floribus amene purpureis, Provincia Mariana. D. Ayre.

Jacobaea fruticosa, Camphoratae foliis, *Æthiopica*. An Chrysanthemum frutescens *Æthiopicum*, Rosmarini folio, flore aureo-amplo, Breyn. Prodr. 2.

Jacobaea Æthiopica, angustissimis & praelongis foliis, rarius crepatis, ab imo caule ad summum usque confertis.

Jacobaea Æthiopica, Laricis folio, Breyn. Cent. 136.

Jacobaea Æthiopica, Stachadis citrinae foliis, flore luteo. Fortè *Conyza Africana*, foliis Stachadis citrinae Gallicae, Breyn. Fasc. rariorum. An fortè *Elichrysum* foliis Absinthij Pontici majus, Cap. Ben. Spei. Breyn. Prodr. 2. 43.

Ibid. ad lin. 33. post edit. add.

Vid. Phytograph. Tab. 323. fig. 2.

Ibid. ad lin. 40.

An Hieracium fruticosum foliis tenuissimè Coronopi modo divisis, Cat. Jan. 123. Nostra tamen inter flores, & summa folia, gummi candidum copiosè fundit.

An melius sit Chrysanthemum l. Coma aurea *Æthiopica*, Abrotani trifido viridique folio, ex Cap. Ben. Spei. Et tunc ad fol. 133. *Almagesti*, inter lineas 28. & 29. Apud Corymbiferas inferenda.

Fol. 195. ad lin. 7.

Hanc autem sub alieno titulo, sibi etiam ignoto, *Neophytus* nostras confuse satis, ac perplexè, pro nondum descripto, Carduum facit, dum Carlinam, Cap. Ben. Spei Coronopi foliis, subris incanis, appellat: ubi Synonymiis non citatis incertiam suam satis prodit, & summam sapere videtur Tyronis Oscitantiam: Ita nobis ipsis interdum somnia fingimus, ut aliquid novi & inauditi dicentes, & nobis placeamus, & aliis; Atque utinam Materia Medica, vel potius Plantarum exoticarum immentia varietas, non magnam incrementi sui partem, non in vanis ejusmodi Imaginationibus, nullà interdum ratione, nullo sensu fundatis crepissent; Adeo sanè inter se in quibusdam Plantarum nominibus discrepant homines, non mali, sed in re Herbaria malè versati, ut persèpe eorum mentes maxime perturbent, qui Rerum Veritatem indagare student; & interdum lu-

dunt nostram diligentiam. An sit Anemospermus Africana, foliis & floribus Tamarisci incanis, Cat. Plantar. ad calcem Paradisi Batavi editi. 1698.

Fol. 195. post lin. 7.

Jacobaea parva *Aethiopica*, tuberosa radice, imis Cymbalariae foliis, ad caulem longioribus angustis, luteo flore summo fastigio, singulari.

Jacobaea affinis, Planta tuberosa, Capit. Bot. Spei. Breyn. Cent. 138. Cui sunt ad radicem folia plurima, Cyclaminis more adumbrata.

Ibid. ad lin. 37.

An Jasminum Azoricum trifoliatum, flore albo odoratissimo, Hort. Med. Amst. cap. 82, cum Icone.

Fol. 196. ad lin. 5.

An Ceraso affinis, arbor baecifera, racemosa, fructu cartuleo monopyreno, reticulato, Cat. Jam. 169.

Ibid. ad lin. 16.

Cheggapumellela Malabarorum; An Jasminum arboreum, foliis laurinis ex adverso nascentibus, oblongis, acuminatis, flore albo, Cat. Jam. ibid.

Ibid. post lin. 25.

JASMINUM arboreum foliis amplis, oblongis, superne viridibus, subtus leni canitie pubescentibus, flores albos in quatuor lacinias longas, angustas, ad umbilicum usque partitos, racematim ferens. Banist. Cat. Stirp. Virg.

Ibid. ad lin. 42.

Acuifol. sive Planta volubilis propè aquas proveniens, Nieremberg. 357. Acuifol. f. Volubilis aquatica; Hernandez apud Recc. 107. Nostra enim est Planta sarmentosa, quæ sarmentis serpendo altius se extollit.

Ibid. ad lin. 44.

An Jasminum Indicum, Mali Aurantiae foliis, flore albo pleno, amplissimo. Cat. Stirp. Indorum, Breyn. Prodr. 2.

Fol. 198. ad lin. 4.

An Agrifolium folio tenuiore, magis acuminato, & minus corrugato, spinulis gracilioribus, & longioribus, armato, Cat. Jam. 173.

Ibid. post lin. 6.

ILEX Americana, Phillyrea angustifoliae facie, ex Terrâ Martanâ, medio folij nervo in pinnulam abeunte, Cat. Virg.

Ilicis lucentibus parvis foliis, Arbuscula perelegans, ex Ind. Orientali.

Ibid. post lin. 22.

IMPERATORIA Ranunculoides, Sphondylii hirsuto folio minor, ex Prom. Bot. Spei. An Ranunculus Aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo-virescentibus, Hort. Med. Amst. cap. 1. Ubi in Descriptione hujus plantæ dicitur, Floribus succedunt semina nuda, at postea inter Observationes, Flores quidem Ranunculi, florum sunt amuli, verum à fine ultimo magis Christophorianis accensenda: Baecifera enim est planta, baecis monospermis prædita. At sane non capio quid sibi velint Observatores in locum, cum huic plantæ baecis monospermas adscripisse videantur; baecis enim semina nuda nequaquam dici possunt, semen nudum est, quod nullo involuero sensibili obducitur, quod involuero tegitur, est semen operum, aut fructus, qui proprie loquendo, à semine distingui debet; Ille enim

enim

enim non tantum ex grano coalescit, five parte illa in qua germina est situm, sed & ejus involucri, seu sicco, seu molli vel carnosio, ut in omnibus bacis; Inde equidem patet quod *Autoris* verba in Descriptione, & *Observatorum* Notationculæ circa hanc rem, inter se non bene conveniunt.

Ibid. post lin. 26.

IRIS *Africana* versicolor, pumila, plicatis & hirsutis foliis, radice bulbosa. *Synrichij* fortè genus.

Fol. 199. ad lin. 4.

An *Prunus Egyptia*, circa *Mempnim* *Plinij*, *lic.* 13. cap. 10.

Ibid. post lin. 6.

FUJUBE species *Indiana*, *Surocchedde Malabarorum*. Eadem fortè cum præcedenti.

Ibid. ad lin. 23.

Konar fortè *Persarum*. *Thevenoti* in *Itinerar.* Part. 2. fol. 117. *Yellendamaram Malabarorum* & interdum, *Masanas*.

Ibid. post lin. 23.

Jujuba Indica *Coryli* folio spinosa, fructu minore, rubro. *Cauryellandai Malabarorum*. Idem est cum *Frutice Bisnagarico*, spinoso, *Coryli* foliis densis, spinis brevioribus, crassis, *Phyogr. Plukenetian. Tab.* 29. fig. 7.

Ibid. ad lin. 27.

Jujube Americana spinosa, *Loti arboris* foliis, & facie, fructu rotundo, parvo, dulci, *ejusd. Hort. Beaumont. Hort. Med. Amst.* 141. ubi *Icon* exhibetur.

JUNCARIA affinis *Æthiopica*. *Pinastris* foliis triphylla, *Prom. Bon. Spei.* *Genistæ Æthiopicae* *Pinastris* foliis triphyllæ, quoad folia saltem, hæc planta consimilis est.

Ibid. post lin. 40.

FUNCUS *Africanus* lignoso calamo, ad nodos involucri nigris circumvoluto, panicula arundinacea, ex *Prom. Bon. Spei.*

Fol. 200. ad lin. 19.

Cyperus maritimus, capitulis glomeratis, *Turnesfortij Elem. Bot.* 419.

Ibid. ad lin. 25.

Neerchoutceorea Malabarorum, ad lin. 36. *Coddanecoode Malabarorum*.

Fol. 201. ad lin. 14.

Hujus baceæ sunt trinucleæ (i. e.) tres nucleos continentes, & aliquando quatuor.

Ibid. ad lin. 18.

Hujus bacca per maturitatem adaucta, est atrocyrulea, unico tantum nucleo, coniformi, striato, prædita, & verè dici possit, fructu monopyreno.

Ibid. ad lin. 23.

Pro angustiore lege longiore, & post 489. adde *Juniperus alpina*, *Chiffi Hist.*

Ibid. ad lin. ult.

Juniperus Barbadenfis, *Cupressi* folio Arbor præcella, retragonophyllis, five foliaturâ quadrangulari, an *Juniperus arbor Sacrorum Bibliorum*, *Reg.* 1. cap. 19. vers. 4. memorata, cujus sub tegmine decubuit, & longo itinere fatigatus, ad somnum

somnum se composuit *Eliu* Propheta in Deserto. Hinc *Virgil.* *Juniperi* gravis
Umbra. Fortè etiam *Juniperus* apud *Plin.* lib. 16. cap. 40. ex cujus ligno in *Hi-*
spania, Dianæ Saguntinae perantiqui Templi trabes sunt factæ, per multos ævos
duraturæ. An fortè *Gopher* *in Genes. cap. 6. vers. 14.* quod nomen alibi in *Sa-*
cris literis non invenitur; Arbor erat ex cujus materie, Arca quæ veri totius
Mundi reparanda germina capax fuit, secundum mandatum Dei, à Patriarcha
Noë constructa est: Sic enim *Septuaginta* vertunt Interpretes, *quintum quatuor*
αὐτῶν δὲ ξύλων τετραγώνου. Fac tibi arcam ex arboribus quarum foliatura sunt
quadrangulares, *Hebræi* enim Arborem & Lignum uno eodemque nomine ap-
pellant; & *Tetragonodendron*, hujus arboris species nuncupari dignetur. *Te-*
tragonia (fortè) *Theophrast. Hist. Plant. lib. 3. cap. 6.* Sicut etiam *Kessus* su-
spicatur, de *Septuag. Interpr. eorumque Tralatione, cap. 12. pag. 33.* Quæ à
quibusdam *Euonymus Latinorum* perperam censetur: Nam si vulgaris hæc
nostra *Euonymus*, esset *Tetragonia Theophrasti* ut illi volunt, & *Euony-*
mus etiam *Ejusd.* sit eadem, ut ex diversorum *Botanicorum* sententiâ colligi
potest, inconsideratè sanè *Theophrastus* eandem plantam sub diversis nominibus
tradidisset, quod de tanto viro, ægè supponendum puto potiori igitur jure
concludamus, non aliundè quàm ex solâ hæc notâ, *viz. ramulorum foliaturæ qua-*
draturâ, quod huic arbori peculiare est, *Gopher* apud *Hebræos* nomen optime
meruerit; & apud *Græcos Tetragonia*, cujus solum nomen apud *Theophrastum* in-
ter serò germinantes reperitur, (*Gæza, Quadratoria* interpretatur.) Quæ Vox
indè, satis propriè attributa sit, ut nos facillè agnoscamus. *Hieronymus* autem
non satis exploratum habeo, quod ligni genus intellexerit, in *vulgari Tralatione*,
ubi *Gopher* redditur de lignis lævigatis: Cum omnia ligna lævigari possint: Sed
adverte (inquit *Eugeninus*) Idem in *Questionibus Hebræicis* dicit, in *Hebræo* ha-
beri de lignis bituminatis; patet autem quàm differant nomen bituminis, & hu-
jus ligni, cum bitumen vocetur *גפר* *Copher*, at ligni hujus nomen est *גופר* *Gopher*;
Existimamus ergo eum ibi esse lapsum, non quod hæc varietatem ignoraret,
sed ex eo quod frequenter solet fieri, ut aliquid facientes, non omnia adverta-
mus, indicioque est quia hic non eodem modo scripserit. Hactenus ille, *Augu-*
stin. Steachus Eugubius, Episcopus Nisemi in Genes. cap. 6. Ex hoc quoque *P. Simo-*
nus Ordinis Congregationis Orator, in libro secundo *Criticæ in Vetus Testament.*
disceptationes continens, pag. 79. Observationem suam subiecit: in *Genes. cap. 6.*
v. 14. Ubi (inquit in *vulgar. Tralatione* legitur, de lignis lævigatis, Sanctus *Hie-*
ronymus dicit, Juxta *Hebræicam Verbolem* oportere legi, de lignis bituminatis, in
quo videtur errasse, cò quod legerit *Copher* pro *Gopher*, forsàn ipse mutavit li-
teram *Gimel*, in *Caph*, ut melior sensus redderetur, quanquàm legerit *Gopher* in
Hebræico Typo, quemadmodum hodiè nos, & hoc (inquit) apud *Rabbiecos Au-*
tores, frequenti usu venit. Scio equidem doctissimum *Bocharum Noem* *Gop-*
pher, de *Cupressis* accepisse, nec ego negaverim vocem *Cupressi*, à *Copher* com-
modè derivari, licet non immediate. Cum enim ab hac *Hebrææ* voce, Insu-
le quoque *Cypro* nomen obtigerit, propter copiam bituminatarum Arborum illic
crescentium, non incommode exundè petas originem Vocis *Cupressi.* Ali-
ter sanè *P. Simonius* hæc reddenda censet sic nempe ut *ἔργον ἀνενεργεῖν* accipi-
antur de *asserib. seu planis quadratis;* Attamen (inquit *Hessius*) quis *Naupe-*
gus

gus non rideat, si quis huic jubeat ex *asseribus*, aut *tabulis quadratis*, construere qualecunque navigium, *Isaac. Voss. ad Objectiones nupera Critic. Sacr. Responso*, pag. 25. An *Juniperus maxima Cupressi folio minimo*, cortice exteriori in tenues phyllas spirales, ductili. *Savin Trees, Cat. Jam. 128.* Sub eodem enim titulo aliquando accepimus. Fortè etiam *Cedrus Cumanica*, cujus *Tabulis*, si naves conficiantur, non sentiunt teredinem, *Cardan. de rerum Varietat. lib. 6. cap. 20. fol. 109.* Hujus autem bæcæ *Vulgaris* instar, sunt trinucleæ, & interdum tetraplyreæ.

Fol. 202. post lin. 2.

JUNIPERIFOLIA suffrutex *Africanus*, glomerato flore, cum peti-carpio rotundo.

Ibid. ad lin. 11.

Mellakurui Malabarorum.

K.

Fol. 202. ad lin. 26.

HUIC fortè accedit *Haliplus Nummulariæ* madido folio, *Siciliana; Bæcon.* *Mus. Pl. pag. 169. Tab. 100.*

KALI AIZOIDES *Ind. Or.* procumbens, sive *Mirasol* nodosa, *Mesembrianthemii* species, floribus ferè inconspicuis, foliis lanugine incanis.

Fol. 203. ad lin. 9.

Mogullamaram, Malabarorum, & aliquando Mogullanchedde eorundem.

Fol. 203. post lin. 9.

Lamij Tingitani facie glabra, quadrato caule, planta *Mariana.*

Ibid. ad lin. 14.

An *Herba Yü*, ex qua sub *Quangsi* in *Chinchen*, *Incolæ* pannos, sericum ipsum superantes, conficiunt. In *Provincia Quangsi* haud procul à *Chinchen Incolæ*, pannos, sericum ipsum superantes conficiunt, *Ogilv. Chin. Tom. 1. fol. 247.* An *Chen-su Sinensibus Andr. Cleyer.* quam non comperit in *Herbario parvo, de Med. dir. Simpl. Sinens. pag. 49. no. 245.* Poco-tempie *Doctore Merret* apud *Mus. Societ. Reg. fol. 386.* ubi dicitur esse *Insigne Cardiacum.* ad *Hæmorrhagiam* sistendam propinata est, felici semper eventu. *Musci* fortè genus sericeum, aut ei coloris, *Arboribus* innascens, apud *Indiam Orientalem.* Est re vera *Muscus* ramulis *Arborum*, & aliquando radicibus in *Sina* innascens; ubi *Agni Scythici* lana, s. *Vellus aureum* vulgo vocitatur: *Sanguinis* profluvium ut aiunt mirificè sistit. An *Til* planta in *Sylvis* nascens, sine fructu, comâ flavescente mollissimum *Sericum* referente; quo pro plumis utuntur ad lectisternia, *CBP. 320. ex Lin. folotano, Paris 3. Ind. Or. 6.*

L

Fol. 203. ad fin. ult.

L Amium fruticans, Teucrij folio lucido, calyce, & flore magno candido, tantillâ purpurâ varie notato, Hort. Catholic. Fr. Cupani. 106.

Fol. 204. ad lin. 16.

Lamium foliolo, subrotundo, profundioribus incisuris, albâ lineâ per medium notato, humillimum, Fr. Cupani Hort. Catholic. 106.

Fol. 205. ad lin. 7.

Amamaxtla expurgans, s. Rhabarbarum vocatum Monachorum, Hernandez apud Rocc. fol. 217. Rhabarbarum Americanum, Monardes apud Clus. fol. 312. Rhabarbarum Monachorum fuit appellatum quod à Monachis Carthusianis diu pro secreto habitum, quamvis postea Monachi qui in Mesuem sunt commentari, secretum prodiderint. Aliis autem videtur appellationi occasionem dedisse Tzetzes in Hesiodum, qui Lapathi radicem dicit vocari Mor. Ita enim est edit. Heins. proxima, non autem Rhabarbarum ut Camerarius habet, Hort. Medic. pag. 84.

Ibid. ad lin. 23.

Hujus exhibetur pictura à D. Boccon. in Mus. Plantar. rar. sub hoc falso titulo; scilicet, Blicum angustifolium verticillatum, Tab. 80. atque in Tab. 104. Iterum repetitur eadem planta quancquam minus adulta nomine Lapathi aquatici Luteolæ folio; perinde ac si essent due novæ diversæ & nondum descriptæ Plantæ.

LAPATHUM longo, angustoque folio, Anthoxancho plurimum accedens, verticillis rarioribus caulem cingentibus, semine majori. Nuper inventum in Compascuo quodam ponè Westmonasterium, Totbil-Fields vulgò vocato, stirpium Indagator diligentissimus, D. Isaacus Rand. Pharmacopæus Londinensis, & magnæ spei Botanici.

Ibid. post lin. 23.

Lapathi anthoxanthi summis ramulis aliquatenus accedens, Planta Caustica, Ind. Orientalis. Kalurêvo Malabarorum.

Ibid. ad lin. 42.

Xanthium vulgare nostras, ex India Orientali aliquando nobis allatum est; & Marloómacee à Malibareis nuncupatur.

Fol. 206. ad lin. 13.

Pro hexapetali leg. pentapetali, Ibid. ad lin. 18. add. echinis lanuginosis, ad lin. 19. post vocem major add. echinis deorsum reflexis.

Ibid. ad lin. 27.

Agitmonia lappacea inodora, folio subrotundo dentato, Cat. Jam. 92. ubi dubium movetur, an sit eadem quoque illi, quæ in Almagesto nostra proxime subsequitur;

Sequitur; quanquam sanè duæ hæc plantæ toto calo inter se discrepant; Ast inter Herbas quam parum sapere visus hic Criticus in *Methodo* Legentium iudicium penes sit fides, ubi advertitur Admirabilem *Peruvianam*, unâ cum hæc Lappula nostra *Bermudensi*. à se collocari in medio Umbelliferarum, quarum *Criteria*, & Notæ Characteristicae, quæ omnibus in universum conveniunt, sunt Flos pentapetalos, & ad singulos flores, bina semina nuda, fibrillis simul juncta; Hoc equidem illi merè arbitrarium est, nam nota Characteristica generis alicujus, sive sit proprietas quædam singularis, sive Complexus accidentium, vel Attributorum concursus, omnibus sub illo genere contentis speciebus convenire debet, sed quænam quæso convenientia est inter has, & Umbellam, cujus Character apud omnes *Botanicos* accipitur pro summo caule, summisvè ramulis in plures ab eodem puncto ortos radios, divisis, & singulis radiis in plures itidem pediculos, qui flores sustinent subdivisis; quæ generis Umbelliferi optima Nota est. Eodem equidem jure has plantas ad Verticillatarum, vel etiam ad quodlibet aliud plantarum genus adnumerare potuisset; Quid enim Lappula nostra *Bermudensis* ratione Characteris cum Planta Umbellifera? Omnis denominatio Herbarum (ut rectè monet *P. Amannus*) undecunque etiam sit desumpta, nisi exprimat simul notam Characteristicam, à *Botanicis* non est attendenda, *Charact. Plant. Natural.* 27. Hæc est vera, & genuina *Methodus*, primò & per se cognitioni inserviens, & à *Naturâ* ipsis Vegetabilibus communicata Tessera, vel Nota infallibilis, in omnibus sub eodem genere contentis, perceptibilis; Admirabilis ergo *Peruviana*, atque etiam Lappula nostra, licet à priori maximè diversa, ab Umbellis Utræque averruncandæ, ob deficientem tesseram Umbellæ debitam. Et quis dènum est si examinare dignetur, Admirabilem *Peruvianam* & Agrimoniam lappaceam, & quantis inter se distent parasangis, qui mecum non libenter agnoscet, à male digerendis plantis ingens remora discensibus obijciatur; At quidem *Sloanus*, is scilicet qui *Catalogum Plantarum Jamaicae* composuit, licet aliquandiu illuc moraretur, planè ex iis, quæ vel ipse scribit præ se fert *Grammaticum*, indicatque se nunquam conspexisse herbas, quas exponit, sed aliis fidem habuisse, citrà ullam Explorationem. An *Quauhxyzapoli*, *Nove Hispan. Hernandez apud Recc.* 404. Huic nostræ sit aliqua affinitas, nobis suspicari licet.

Fol. 206. *ad lin.* 41.

An Frutex innominatus secundus, *Marcgrav. fol.* 80.

LAPPULA Althæoides *Americana* Mori albae foliis Viriginis, hirsutis ferrugineâ pubescentibus, *White-Barke, Barbadosibus* vulgò.

Lappula *Americana* spicata, foliis amplis fidium instar sinuatis, & eleganter crenatis, *White-Barke*, nostratibus dicta. Huic fortè cognata est Althæa Abutili foliis, fructu hispido, *Americana, Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 5.

Lappula *Malabarica* spicata, Betæ foliis Antagonistis, floribus interiùs lanuginosis; *Wellia Codiveli, Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 59. Betæ folio *Malabarica* semine lappaceo *Commel. Not. in Hort. Malab.* Huic fortè spectat *Pupal Valli, Hort. Malab. Part.* 7. *Tab.* 43.

Fol. 106. post lin. III.

Lappula fere umbellata, Astrantiæ foliis Virginiana.

Fol. 207. ad lin. 7. post 951. add.

Item Læserpitiū Alpino, ejusd. Parkinson. in append. fol. 168.

Ibid. ad lin. 11.

Deleantur quæ sequuntur, scilicet. Fortè etiam Libanotis Theophrasti quorundam, folio minus rotundo, ejusd. Ibid. 165.

Ibid. ad lin. 19.

Deleantur hæc verba, viz. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, JB. Tom. 3. 165. Item. Et eorum loco substituuntur quæ sequuntur verba. An Libanotis Theophrasti quorundam, folio minus rotundo, JB. Tom. 3. 165. Quæ supra ad penultimam pro Synonymo habeatur, ubi expungenda sunt, & hoc loco transferenda, sic emendabitur error.

Ibid. ad lin. 21.

Libanotis fortè Theophrasti magis genuina quod folia habet *ovata* (i.e.) palustri Apio majora.

LÆSERPITUM autem Petrolei foliis Martiana.

Fol. 208. ad lin. 9.

Et Angliæ nostræ indigena est.

Fol. 108. post lin. 9.

LATHYRUS major è Sicilia, flore amplissimo, odorato, vexillo rubro, labiis petalis rostrum ambiens, caruleis, filiqua hirsuta, plana, *Flori. Ovulen.* An Lathyrus distoparyphyllos hirsutus, mollis, magno & perameno, flore odoro, *Flori. Cathol. Espan.*

Ibid. ad lin. 30.

Lathyrus rectus gracilis, Gladioli folio tenui, monanthos, rubicundus, *Francisc. Espan. Flori. Cathol. pag. 107.*

Lathyrus congener spicata, foliis integris graminis, l. Catanance leguminosa, *Indorum* microlobos, semine quadrato. Nix-murri, *Flori. Malabar. Part. 9. Tab. 32.*

Lathyrus, vel Lathyrus congener, Linariæ foliis, *Æthiopicum.*

Fol. 209. post lin. 8.

Lathyrus affinis monophyllos, Carolina, pediculis foliorum alatis, *Hort. Compton.*

An Lathyrus *Carassavie*, pediculis foliorum alatis, *PBP. 345.*

Ibid. ad lin. 28.

An Quam-Ilac-Pavazli, *Novæ Hispan. Hernandez apud Rea. 405.*

Ibid. ad lin. 36.

Rufus angustifolius, fructu folio innascente, *Elem. Bot. pag. 70.*

LAUROTOXA epiphyllocarpos, crenatis foliis, maxima, è singulis foliorum crenis, bacifera. Ex *Insula Palma*; nuper allata est.

Laurotaxa epiphyllocarpos, Americana, crenatis latioribus foliis, non ramosa, ad oenaturas fructum promens.

Laurotaxa

Laurotaxa epiphyllocarpos angustifolia, minor, cernosa, bacis à crenis foliorum prodeuntibus, *Jamaica*. Inter Filices Hemionitides, in *Almagesto* perperam accensentur, fol. 150. Pl. 7, & 8. Hoc loco reponi deberent, sunt enim Plantæ bacciferae & monopyrene.

Fol. 209. ad lin. 37.
Laurotaxa epiphyllocarpos Alexandrina, medio folio bacca insidente, *Victorio-la quibusd.*

Ibid. ad lin. 40.

Ruscus latifolius, fructu folio innascente, *Elem. Bot. ibid.*

Fol. 210. ad lin. 3.

Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente, *Turnesert. Elem. Bot. ubi supra.*

Ibid. ad lin. 5.

Laurotaxa epiphyllocarpos minor, fructu majore, medio folio culpide aculeato, sessili.

Ibid. ad lin. 30.

An Quauh-Eloxochitl, *Nov. Hispan. Terentij apud Rec. 403.*

Ibid. post lin. 31.

Laurus serrata odora Promont. Ben. Spai. Bod. à Stapel. Nat. in Theophr. 333. **Lau-rus Africana** serratis foliis, *Bartholin. Ad. Medic. Anni 1673. Obs. 24.* A Myrto enim Brabantica accedente, *Almagest. & Aleagno Virginiana, Banisteri* quæ tantum prioris est varietas, plurimum differt hæc *Laur. Africana.*

Ibid. ad lin. 37.

Et aliquando *Barkudensibus nostratibus dicta.*

LAURIFOLIA Virginiana, Mirabilis Paruana floribus, summo ramulo veluti in spicam innascentibus.

Fol. 211. ad lin. 3.

Karu-Naregam, Flora. Malab. Part. 4. Tab. 13. **Lusitanis, Limao Gerardo** Ar-bor & folio, & fructu, huic nostra propius accedere videtur, attamen spinarum proventu discrepat.

Ibid. ad lin. 11.

Huic est congener *Alpam, Hort. Malab. Part. 6. Tab. 28.* **Siliquosa Indica**, flore triperalo, siliquis teretibus, pulpa absque seminibus repletis, *Raj. Hist. Pl. 1765.* & **Pee-Kandel** forte ejusd. *Hort. Malab. Part. 6.* nec non **Xaxahoacli**, *Novæ Hispan. Hernandez apud Rec. fol. 438.* Horum enim omnia sunt, olliculis fungosis.

Ibid. ad lin. 27.

Flos nondum apertus, pyxidi *Beata Mariae Magdalene* (ut aliquando fictum vi-dit *Banisterius*) similis est, à *Virginienfibus Colonis* *Yup-flowering* inter-gren, nuncupatur. An Arbor Febrifuga *Peruviana Jonston. Dendrograph. fol. 476. Tab.*

135. De hac Arbore Cortifera, & ejus loco natali, vid. *Sebastiani Badi Anastasin Corticis Peruviana, f. China-China defensionem*, quæ omnia habuit ex ejusdem *Badi Mercatoris Geynensis* narratione, ex Arboris ipsius ramo grandioribus lincis in ære inciso, rotæque Arbore, sed minutius figurata, in Iconibus quas *Romæ* habuit.

116 ALMAGESTI BOTANICI

Cl. Hieronymo Bardi, & à peritissimo Pharmacopola Collegij Societatis Jesu: ex harum postrema Catagraphe (ut consicere licet) Icon à Jonssono exarata est in *Deudographia*. Quantumvis autem *Peruviani* Corticis, implevit Nomen aures Medicorum, cujusnam Arboris spoliū sit, clarè non patet; Incerta sunt plerumque rerum magnarum exordia, densoque sub caliginis occultantur peplo, sub quo latent, quò profundius, eò majori appetitus sciendi fertur desiderio. An hæc nostra Laurustia sit, Tiliæ affinis Laurifolia, Arbuti floribus albis racemosis odoratis, fructu pentagono, *Cat. Jam.* 136.

Fol. 211. post lin. 29.

LENS *Africana* Elatines fam. folio singulari, pilis longioribus hirsuta, ex *Prom. Ben. Spei.* Elatines folio pilosissima, papilionaceo flore, *Maderaspatana* *Almag. Bot.* 133.

Fol. 211. ad lin. 33. add.

Hinc, folia *Vulgaris* sunt multo ampliora, subtus purpurea, quæ multiplicat. se radiculis suis tenuissimis, cum *Vulgaris*, radice tantum simplici, donata sit.

LENTICULA aquatica trichodes, ad margines foliorum, longioribus pilis fimbriata, in Angliâ nostrâ invenit, *Generosus Vir. D. Adamus Buddl.*

Ibid. ad lin. 36.

LENS palustris altera, *Matthioli. Hist. Lugd.* 1015.

Ibid. ad lin. ult.

Lemna (fortè) *Orethmeni* lacus *Theophrast. Hist. Pl. lib. 4. cap. 11.* Lemna enim quidam dictum volunt quasi *Lemna* (i. e.) squamam, corticem, membranam, à verbo *lema* quod significat *lema* desquamare: Nostra quidem gignitur in palustribus, foliis membranis, hinc inde à caulibus cortice prodeuntibus, & squamarum instar, cum circumvestientibus, in vertice densius stipatis, ac confertissimis.

Fol. 212. post lin. 8.

LEONTOPETALO affinis, *Scaphyllini* folio aliquatenus accedens, apicibus videtatis. *Leontopetalo* affinis, foliis quernis. *C. B. P.* 324. *Chrylogonum Dioscoridis; Rauwolfii. Hist. Lugd. append. 28. Ponz. Italice; Hinc, (quoad folia) plurimum accedit Tlicoxochitl de Guastepec-Orequa-Xochitl, Nov. Hispan. Tementii apud Recc. fol. 430.*

Ibid. ad lin. 13.

Frutex Æthiopicus conifer, foliis lanuginosis omnium maximus, *Breyn. Pradr.* 2. 49. An fortè *Shittai* Arbor *Hebræorum* in *Isaiah cap. 41.* recensita, cujus & in *Sacris Scripturis*, non alibi memoratur.

Ibid. ad lin. 17.

An Arbor *Indiana* *Archem*, cujus radix *Mater Dei*, dicitur. *Zanon. Iflor. Bot.* 23.

Ibid. ad lin. 19.

Dele nondum edit. & add. *Tab. 304. fig. 6. ad lin. 22.* Hinc fortè pertinet *Cecocpatli*, *Nov. Hisp. Terentii apud Recc. 362.*

Fol. 213. post lin. 18.

LEUCOIUM *Æthiopicum*, latiori folio in canum, trifidum & multifidum, flore caelesti. *Curâ D. Tidemannii Roberti, Jacobi fratris consanguinei, in Horto Cl. viri D. Christophori Wren, Equitis aurati & summi Architecti regii, apud Aulam Hamptoniam,*

Hamptoniam, ex seminibus à *Prom. Bon.* Spec. allatis, sibi natum habuimus. Rarumunculus purpureus *Hist. Lugd.* 1036. (quoad folia) hunc nostrum *Leucopis* haud multum impar.

Fol. 215. post lin. 10.
Leucoium alyssoides fruticosum; folio virente, ex Hispania. Alyssoides fruticosum, Leucoij folio viridi Turnesortii.

Fol. 215. ad lin. 39.
Fortè *Nerii* facie, arbor *Indica; Park. Theatr. Plant.* 1470. & *I.B. Tom. 2. fol. 142.* *Nerio* affinis, arbor siliquosa, folio palmato, sive digitato, flore albo. *Car. Jam.* 154.

Fol. 216. ad lin. 39.
Adversus morsum *Canis rabidi*, probatum est *Specificum; Dampier in Philosoph. Transact. Londini edit.* 1697.

Fol. 217. ad lin. 9.
Fortè etiam *Ligusticum alterum, Matthioli edit. Bauh.* 547. an *Libanotis Apii* folio, semine aspero. *C.B.P. Rosmarinus* foliis *Selinò* similibus, quæ *Libanotis* legitima, *Theophrasti Belli. Epist. 10. ad Glaf. modica* vulgo, quod *Vertiginem* inducere credatur, & nō fallor (inquit *Bellus*.) *Siler Creticum* à quibusdam perperam vocatur. *Libanotis Theophrasti Apii folio, Cretica. Park. Theatr. Pl.* 52.

Ibid. ad lin. 23.
An *Botrys Cypri, Canticorum. cap. 1. vers. 13.*

Ibid. ad lin. 25.
An *Amazquiliel, Novæ Hispaniæ Terentii, apud Recc.* 350.
LILIO-Narcissus *Indicus* umbelliferus, flore extris rubro, intris albo inodoro; Rapacea radice. *Narrevilancalunga Malabarorum.*

Fol. 218. ad lin. 11.
Lilium s. Mattagon Virginianum, floribus reflexis, ex luteo rubentibus, perpureis maculis eleganter punctatis. Banist. Cat. Mss.

Fol. 220. ad lin. 10.
Post *Viridario suo lege* apud *Hockesdon, Vicum Londini ad Aquilonem suburbani jam nunc superbiante.*

Ibid. ad lin. 13.
An *Lilio-Narcissus humilis albus, Banisteri Cat. Virg. ad lin. 36. Smilax unifolia humillima Turnesort. Elem. Bot.* 912.

Fol. 221. post lin. 11.
LIMONIUM *Hispanic. supinum, coma diffusa, Turnesortii. Ut nos monuit insignis Botanicus D.D. Carolus Preslen.*

Fol. 222. ad lin. 3. post C.B.P. add.
Quæ describitur in *Prodrôm. 106. an Linaria Myrsinites triphylla, flore candido sulphureo, rictu croceo, brachiata. Fr. Cupani Hort. Catholic. 114.*

Ibid. ad lin. 4.
Post vocem *flore, add. ejusd. C.B.P. ad lin. 6. adde cui folia sunt Centaurii minoris.*

ALMAGESTI BOTANICI

Linaria triphylla speciosa, ex aureo & carneo, pervenisse mixtis, summo
caule indiviso, an Linaria latifolia triphylla Sicula Boccon. de Pl. Sicul. pag. 44.
Qui Bauhinianam Linariam triphyllam latifoliam (excepta nota brachiata, in
caulis humilibus,) cum sua omnino convenire pronunciat. Hanc nostram sane
pervenisse plantam florentem vidimus, praeterito anno in cultissimo exotica-
rum Scirpium Horto, Eufeldae, ad Aedes D. D. Kvedale maxima cum voluptate.
Ibid. ad lin. 13.
Linaria folio capillo crassiore, spicato flore candido, rictu crocato, Fr. Cupan.
Hort. Cath. 113.

Linaria avenae, folio angustissimo, P. B. R. 48.
Ibid. ad lin. 24.
An Linaria erecta caerulea, Cat. Jam. 59. At hujus denominatio tam lata est, ut
quae illa sit herba, difficile est hauriri.
Ibid. ad lin. 40.
Fons Linaria Lappacea, procumbens, Polygoni folio, flore pallido caeruleo, ric-
tibus. Flor. Med. Anglesae cap. 7. cum Icone. An Linaria Saxatilis, Serpylli
folio, Turneforti, apud Colubianae D. Pellan. Ibid. ad lin. 6.

Linaria notha, Ancirrhini folio, flore candido decussato, quinque foliis fastigia-
tis cincto, Francisc. Cupani Cat. Hort. Catholic. 113.
Ibid. ad lin. 18.
Pseudoliriodendron lanceolatum folio crassulo, strobilo albo penaphyllo Cupan. H. Ca-
tholic. 173.
Ibid. ad lin. 22.

Huc forte spectat Texiquaholli: Non Hispania Terenti apud Rec. 413.
Ibid. post lin. 37.
Linum Ethiopicum, angusto nigro folio, elatius, & lignosum, floribus ceru-
lis parvis.
Lini Ethiopici similis, Planta Africana, Sanicula alpina, foliis albis, summo
caule fastigiatis. An Sanicula alpina frutescens, Ethiopica, Lini folio, flore
candidissimo?
Ibid. post lin. 43.

Linum pratense Marianum Cathartici simile, five Chamalinum flore luteo, Ame-
ricanum.
Linum parvum Virginianum Cathartici floribus albis, ad nodos caulum veluti in
spicam emergentibus.
Ibid. post lin. 23.

Lini facie multicaulis, Lini modo, summo caule foliolis ad intervalla, qua-
si in spicam dispositis. Idem forte cum precedenti in Almagesto. Provenit in Cy-
pro, in quibus forte colligitur D. A. Proffon.
Ibid. ad lin. 23.
An Linum Scandens, flore dilute purpureo, semine triangulari. Cat. Jam. 89.

Ibid.

Ibid. and line 18.

An Arbor Thurifera *Havironica* *Juba* *Nomadus* regis in *Commentariis* *Julio* *et* *C.* *Cæsarem* apud *Plin.* *lib.* *12. cap.* *24.* Cui romi sunt *Accris* maxime *Pontici* per-
similes. *Juba* enim rex iis *Voluminibus* quæ scripsit ad *Cæsum Cæsarem Augusti*
filium, ardentem famâ *Arabie* tradidit, comitari esse *candicis*, romis *Accris* maxi-
mè *Pontici*, ac succum *Amygdalæ* modo emittere; talesque in *Carmania* appa-
rere, & in *Egypto* sacris studio *Ptolemaeorum* regnantium, ut ex *legumibus* *Arabie*
regis *Boronicæ*, tradidit *idem Plinius* *ubi* *supra.* An Arbor Thurifera, *Partinsæ*
Theatr. Pl. 1602.

Fol. 225. post. lin. 2.

LITHOSPERMUM Buglossi foliis asperis, tetrasporon, five scissibus ad singulos flores quaternis, veluti in unum coalitis. *Ex India Orientali.*
Lithospermum Scorpioides; floribus rostratis pallide luteis. *Virginianum; Lemniflor.*
Cat. Strip-Virgin. Heliotropium (forte) minus, Lithospermi foliis, *Cat. Jam.*
 15. Ubi movetur dubium, An sit Echiodes parva albo amphibia *Pat. Colum.*
cephraf. 185?

Ibid. ad Bm. 47.

An Baccifera arbor calyculata, foliis laurinis, fructu racemato, discolorato, sub-
rotundo, monopireno, pallide luteo; Baccifera arbor Cal. Jan. 169. Item
Baccifera arbor calyculata, foliis integris, oblongis, acuminatis, fructu sphe-
ricante. *Eld.*

Fol. 125. post lin. 10.

TOTUS filiquosus, iurex, filiqua quadrata, foliis admodum hirsutis. Hanc quoque debemus **Claro** D. D. **Carolo** **Preston**, cujus sane studio in re Botanica plurimum debetur.

Fol. 125. post lin. 1.

Lotus Africanus, tenuissimis foliis ramosis, floribus luteis, perexiguis.
Lotus Æthiopicus fruticosus elegans, cauleculis rubicundis. *Manelli* (forte) *Flori*.
Malab. Part. 9. Tab. 37.

Ibid. and *loc.* 9.

Post 355. add. Meliloti majoris quarta species, Tragi. ejusd. T.B. ibid. 349. Melilotus Scrapionis, Lotus altera major, hirsuta, & erecta, gustu astringenti, Gesnerv. in Hort. Germ.

Ibid. post Tim. 12.

Lotus corniculatus *Ethiopicus*, frutescens, foliis subtus argenteis.
Lotus corniculatus *argenteus*, flore luteo, ex *Oris Gultiani*.

Ibid. ad fin. r 6.

Forté Lotus polycerasus, humi prostrata, pentaphylla, incana, hirsuta, foliis acutis, floribus luteis rubro virgatis. Fr. *Guyani*. *Cal. H. Carb.* 125.

Ibid. post lin. 27

Lutos Aethiopicus argenteus, flore singulati rubro.

Ibid., post loc. cit.

Lotus argenteus minor, *Gaditana*.

Fok.

Fol. 227. post lin. 5.

Loto corniculati & Coluteæ media, pilosis foliis, siliquâ quadratâ; *Code serupau-
Jada Malabarorum*. Huic fortè congener est *Tejovanna-Manneli Hort. Malab.
Part. 9. Tab. 38.* An sit *Yztacpatli nona Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 431.*

Lotoïdes Ethiopicum, Saxifragæ prætenfis folio, plurifariam quinque partito.

Ibid. post lin. 15.

Loto affinis *Lusitanica*, pinnatis foliis, flore minimo versicolore. Barba Jovis mi-
nor *Lusitanica*, flore minimo, variegato, *Turnesortii Elem. Bot. 511.* *Glaux supina*
viminosa, Lusitana, Grislei Viridar. Lusitan.

Ibid. post lin. 25.

Loto affinis *Lagopoides, Nov. anglicana*, frutescens, foliis ternis, subius sericeâ lanu-
gine argenteis, monospermis.

Loto affinis trifoliata, frutescens, glabra, ex *Terra Mariana.*

Ibid. post lin. 28.

Loto affinis monophyllos, *Polygala* foliis, argenteâ hirsutie pubescentibus; *Nel-
lacrandee Malabarorum.*

Fol. 228. ad lin. 5.

Medicago Vulceraria facit *Hispanica; Turnesortii Elem. Bot. 328.* Item *Medi-
cago Cretica Vulceraria* facit, *enfil. ibid.*

Ibid. ad lin. 37.

An *Cytisus arboreus*, bituminosus, *Hedera* foliis, non angulosis; *Cat. Jam. 141.*
Sed quâ causâ, hæc nuncupatur *Cytisus*, nullo modo divinare possum. An for-
tè hæc sit *Draco arbor Indica* siliquosa, *Populi* folio *Anglana* vel *Anglava Java-
nica Hort. Medic. Amstelod. cap. 109.* Quam nos *Aceris* cognatam *Tilia* foliis &c.
fecimus in præcedentibus.

Ibid. ad lin. 33.

Osmunda foliis lunatis, *Turnesortii Elem. Botan. 436.*

Ibid. ad lin. 35.

Osmunda foliis *Adianti*, *Turnesortii Elem. Bot. 437.*

Ibid. ad lin. 38.

Osmunda multifido folio, *Turnesortii Elem. Bot. 436.*

Ibid. post lin. 40.

LUNARIA racemosa minor *Matricariæ* folio *Breyn. Cent. 184.* A *Lunaria Ci-
cutariæ* foliis *Jamaicanâ*, est plurimum diversa: *Lunaria elatior, Matricariæ* fo-
lio, spicâ duplici, *Cat. Jam. 14.*

Osmunda Matricariæ folio, *Turnesortii Elem. Botan. 436.*

Lunaria multifido folio crasso, racemo florum ex pediculo propè radicem prodeunte,
ex *Terra Mariana*, à præcedentibus plurimum diversa. Aut si *maris, Lunaria Ma-
rilandica* ramosa, segmentis crassioribus, *Halicacabi peregrini* divisuris, thyrsis
florum ex pediculo propè radicem irruente.

Fol. 229. ad lin. 8.

Item *Lupinus angustifolius*, flore è candido-purpureo, *Fr. Cupani Hort. Cathol.*
nostra tamén folia, haud propriè angusta dici mereantur.

Ibid. ad lin. 34.

Huc (fortè) spectat *Camopaltic, Nov. Hispaniæ, Terentii apud Recc. 360.*

Fol. 229. post lin. penult.
LYCHNIS Coronaria. *Monomotapensis*, umbellata, multiplex; f. *Garyophyllus* holostius tomentosus, *Aethiopicus*, latiori folio, flore argenteo completo. Vell *Lychnis Umbellifera* *Gnaphaloides Monomotapensis*, flore argenteo completo.

Fol. 230. post lin. 33.

Aethiopica
Lychnis parva, hirsutis foliis, *Aethiopica*, caule nudo, floribus in laxiore spicam, nunc versu

Ibid. post lin. 38.

Lychnis parva, ramosa, cauliculis nodosis, floribus in laxiorem spicam, nunc versu dispositis, ex *Insula Rhodiorum*.

Lychnis aizoides glaucophyllos, ad nodos caulium fasciculis atrocenè purpureis *Rhodiensis*. In *Hort. Medicinæ* apud *Chelseam*, curâ D. Doody, ex seminibus nutritam conspeximus, at majori perfectione ex inde lustravimus, in *Horto Cl. viri D. du Bois*. Huc fortè spectat *Lychnis Mexicana* vermiculari folio, radice grumosa, f. *Tlalizta-Quilitl* Nov. *Hispan. Terentii* apud *Recc. 422.* an *Lychnis marina* pusilla, *Alfines* folio crasso, minore, glutinoso, polyanthos. *Cupan. H. Cath.*

Fol. 231. post lin. 1.

Lychnis Virginiana, vermiculatis Kali longioribus foliis, caule nudo, summo fastigio, floribus umbellatis.

Lychnis Hispanica fruticosa, Kali folio multiflora; *Turnefortii*; *Elem. Bot. 281.* à D. *Carolo Presten* nobis communicata.

Ibid. ad lin. 5.

Hanc autem plantam, ad *Alfines* genus, potiori jure, quam ad *Lychnidis* pertinere merito suspicatur *Rajus Hist. Pl. 997.*

Fol. 231. post lin. 24.

Lychnis viscosa humilis, *Virginiana*, latiori folio, floribus albis amplissimis.

Ibid. post lin. 30.

Lychnis Virginiana elatior, floribus parvis, in summitate caulis.

Lychnis Campanulæ hortensis folio, calyculis parvis, ex *Insula St. Helenæ*.

Fol. 231. post lin. 33.

Lychnis viscosa Lusitanica, capsula subrotunda glabrâ. An *Lychnis viscosa angustifolia*, alpestris, flore interius albo, exterius rubro, imis foliis *Ocimi*, *Cupan. Hort. Cath. 119.*

Fol. 232. ad lin. 6.

Huc fortè spectat *Apanxaloe* Nov. *Hispaniæ Terentii* apud *Recc. 353.*

Fol. 233. post lin. 20.

Lychnis minor *Caryophylloides*, angustifolia, *Insula St. Helenæ*.

Ibid. post lin. 31.

Lychnidea Virginiana *Blattariæ* accedens, umbellata, maxima, *Lyfimachizæ* luteæ foliis amplioribus, binis ex adverso positis.

Lychnidea Virginiana *Blattariæ* accedens, Been albi *Officinar. foliis*, à regione binis, longè inter se distantibus.

Lychnidea Virginiana *Blattariæ* accedens, Been albi foliis crebrioribus, floribus in umbellam positis.

Lychnidea Virginiana *Blattariæ* accedens, *Alfines aquatica* foliis, floribus summo caule brachiatis, sive in ramulos divaricatis.

R

Lychnidea

Lychnidea Mariana elatior, *Alfines* aquaticæ foliis, floribus in longam spicam densam dispositis.

Fol. 133. post lin. 34.

Lychnidea umbellata, *Satureia* duris longioribus foliis, ex *Terrâ Mariana*.

Ibid. post lin. 38.

Lychnidea Clinopodij Canadensis fistulosi, foliis pubescentibus, *Marilandica*, flore albo amplissimo.

Lychnidea fistulosa Marilandica, *Clinopodii vulgaris* folio, flore amplo singulari.

Ibid. ad lin. 39.

Post 58. add. An *Rhamnus solutivus Pannonicus* 2. ejusd. I B. *ibid. fol. 57.*

Fol. 134. post lin. 4.

LYCIUM *Asiaticum*, non ferratum, *Prunifolium*, minus, ex *Insula Rhodensi*, an

Lycium Hispanio, folio oblongo. C. B. P. fortè *Courou-Moelli Hort. Malab.*

Part. 5. fol. 77.

Ibid. ad lin. 16.

Todallo Malabarorum. *Ibid. ad lin. 20.* an *Lycium* (fortè) foliis subrotundis, integris, spinis & foliis ex adverso sitis. *Cat. Jam. 171.*

Fol. 134. post lin. 22.

An *Ricini* fructu glabro, arbor jufifera, lactescens, folio *Myrtino*; *Cat. Jam. 131.*

an *Lycium Buxifolio* rotundiore, integro, flore purpureo tetrapetalo, spinis validissimis, & longis armatum. *Cat. Jam. 171.*

Ibid. ad lin. 24.

Cujus baccae sunt grandiores, trigonae vel triquetrae, & stinis ornatae.

Ibid. post lin. 27.

Lycium confertis Buxi foliis, spinis horridum, compresso *Guaiaci* triquetro fructu, *Malabaricum*. *Cauraichedde Malabarorum*. An *Lycium Siculum Buxi* folio, fructu trigono, rubro-nigro, *Cupun. Hort. Catb. 121.*

Fol. 134. post lin. 33.

Lycium Indicum elatius, floribus calyculatis, ex sinu foliorum plurimis simul junctis, fructu albo *Pini* formæ & magnitudine. *Petumecootan Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 31.

An *Cacao* affinis frutex spinosus, *Lycii* facie, *Jasmini* flore albo, fructu in dispares particulas inter se arctè hærentes, diviso. *Cat. Jam. 135.*

Lycium Casomandelanum, *Phillyrea* latioribus foliis, spinosum, floribus, *Jasmini*, longo tubulo donatis.

Fol. 135. ad lin. 4. add.

Chachedde Malabarorum.

Fol. 135. post lin. 14.

LYSIMACHIA *Chamænerion dictæ* latifoliae similis, filiquosa, floribus parvis *Hyacinthoidæis*, in longiorem spicam dispositis, *Provinciae Mariana* alumna est.

Ibid. post lin. 16.

Lysimachia Chamænerion dictæ alpina CBP. 245. et in *Prodr. 216.*

Fol. 135. ad lin. 18.

An *Lysimachia* filiquosa alpina, erecta, *Alfines* folijs, *Bocconi. Mus. Plant. Tab. 15.*

Ibid.

Fol. 235. post lin. 18.

Lyfimachia filiquosa glabra, minor, *Mariana*, angustioribus sive *Hyslopi* foliis. *Zacanal-Haotl Chullulensis* f. *Anagallis Mariana* *Hernandez apud Recc. 241.* huius est omnino similis.

Lyfimachia *Chamaenerion* dicta minor, *Virginiana*, flore albo.

Ibid. ad lin. 31.

Huius fortè spectat *Pazabualizpalli* *Nov. Hispan. Hernandez apud Recc. 398.*

Ibid. ad lin. 33.

An *Lyfimachia* lutea non papposa, erecta, major, foliis hirsutis. *Car. Jam. 85.*

Ibid. post lin. 35.

Lyfimachia non papposa *Terra Mariana*, leptoneurophyllis, flore tetrapetalo rubello, folio & caule hirsutie ferruginea hispida.

Lyfimachia lutea corniculata, *Hyslopi* folio, ex *Virginia*. An *Lyfimachia* flore luteo, rubo longissimo, *D. Oldelandii* *Mus. Pet.*

Fol. 236. post lin. 2.

Lyfimachia non papposa, *Hyslopi* folio, fructu *Caryophylloide* parvo. *Vellocootan Malabarorum.*

Ibid. ad lin. 28.

Post *Vocem* folio, lege *Stenolium* petalis falcatis.

Ibid. ad lin. 37.

Post *Dioscoridis* add. *Ajuga* (fortè) *Chamaepitys* altera, *Matthioli* edit. *Valgrif. 941.* *Chamaepitys* 3. f. altera *Matthioli Hist. Legd. 1160.* fortè etiam *Anthyllis marina* altera, *Narbonensis*, *Pentstemon* *Hist. Legd. 1382.* Icon tamen infeliciter exculptra, minus convenit. *Chamaepitys* prima *Dioscoridis* odoratory *Labelij* *Icon. 383.* *Chamaepitys incana*, exigua folio *GBP. 149.*

Ibid. ad lin. 38.

Post *Vocem* donavit. add. *Erica* marina humilis *Saccensis*, *Erica Alexandrina* folijs, mollibus, pilosulis, albicantibus *Francisc. Cupani. Hort. Cath. 69.* Fortè etiam *Thymelæa* *Sedi* minoris perenni folio, atrocinere, *Sc. Lemina*, flore albo semina, *ejusd. Cupani. ibid. pag. 212.*

Fol. 237. ad lin. 13.

Deleantur hæc verba scilicet, à quâ *Tsjeruparra* *Hort. Malab. Part. 10.* haud multum abludit. quia hæc potius ad *Althæarum* genus pertinere videtur; quocquain *Commelinus* in locum; Illam posuit pro ipsissima *Cabrita*.

M

Fol. 237. post lin. 18.

MACER *Gregorum*, *Particular. Thag. Plant. 1599.* *Macra* *Iudorum* sive *Arbor Dylentensis*. Ea *Arbor* *S. Thomæ Christianorum*, *Christophi* *Stoff. Aromat. cap. 12.* *Macra* veterum *Glas. lib. 4. cap. 4.* *Macra* & *Macra*, *Tali-*

R 2

f asar,

124. **ALMAGESTI BOTANICI**

sasar, radicis cortex, *Avicennaz. CBP. 408.* Cortex ad alii profluvia, in *nova Orbe Monardis.*

Ibid. ad lin. 22.

Origanum Indicum Park. Theatr. Pl. app. 1674. Ibid. ad lin. 24. Et ex Cap. Bon. Spei, nuper habuimus.

Ibid. ad lin. 33.

An *Loti arboris folio angustissimo, Arbor baecifera, racemosa, fructu minimo, croceo, monopyreno. Cat. Jam. 163.*

Fol. 237. post lin. 33.

MALVA flore luteo, *Sicula*, folijs moscharis, crispis; *Boccon. de Plant. Siculis. pag. 68.*

Fol. 238. ad lin. 2.

Hujus quoque datur Species minor, ex *Alepe*, quam ex Seminibus euntitiam, vidimus in *Horto exoticarum amoenitate instructissimo. D. Caroli du Bois*, unde dicitur.

Malva trimestri Similis, sed multo minor. Chalepensis. An Malva trimestris, ac pumila Clusii Hist.

Fol. 238. ad lin. 6.

Hujus autem fructus ex pluribus capsulis constar, in capitulum globosum congestis, proinde rectius inter *Aleas* annumeranda esset.

Ibid. post lin. 6.

Malva, Africana procumbens, Betonica folijs, margine lacinijs minoribus eleganter simbrato; Almag. Bat. app. fol. 401. An Malva acuminato, lacerato folio Betonica, hirsuta repens, Capani Flora. Cat. 122.

Malva odorata, folio crasso, et veluti crispo, densa lanugine incano, Xanthij, æmulo, floribus purpureis parvis, ex Insula Coe. In Hortis exoultissimis Dris. Uvedale & D. Caroli du Bois observavimus.

Fol. 238. post lin. 8.

Malva parva, Guditana, folijs incanis.

Ibid. post lin. 14.

MALUS Sylvestris, *Azarolz* fere folijs, *Caroliniana*, fructu pusillo aureo. In *Horta Gulielmi Darby* crescentem observavimus.

Fol. 238. post lin. 21.

Malus rosea Malabarica Syalica dicta, Flora Malabarica. Part. 3. fol. 39. an Apraxap- mep. sive Fructus panificius, The Bread-fruit, vulgo dictus, Insula Guam, vel Marica, qui ut testatur Dampier Arboris est fructus, quæ amplitudine, et proce- reate, maximas nostratis Insulae Malos adæquat; diffusum habet verticem, ramis luxuriantem, et folijs atrovirentibus, fructus ex ramis provenit instar po- morum, quoad magnitudinem, instar panis denario empti, quando modius mitici quinque solidis constar, figura rotundus, & coriaceo putamine cinctus: Cum fructus maturuerit, fit flavus, & mollis, gustui Suavis, ac jucundus. Indigenæ hujuscæ Insulae, (Guam, vel Marica) pro pane utuntur, adustum Col- ligunt dum viridis, ac durus exillit, tum furno pifunt, quod torret putamen, & nigrescit, radunt vero exteriorem, nigram crustam, remanente altera crusta molliorcula, ac tenui, pars autem interior mollis, & tenera est, & in- stap

kar medullæ panis denario empti cander; neque semen, neque officulum habet, sed omnino instar puræ panis substantiæ apparet. Necessè est ut edatur dum recens, si enim reponatur diutius, spatio viginti & quatuor horarum, arescit, & tan- core strangulatorio resipit; gustui autem egregiè placet, priusquam temporis mor- nimis veterascit. Hicce vero fructus octo menses, singulo quoque anno viget, quo- durante tempore *Indigenæ* nullo alio cibo panificii generis utuntur. Nunquam alibi hunc fructum mihi conspiciere contigit. *Indigenæ* quidem nobis significa- bant, maximam hujusce fructus copiam, in ceteris *Ladronensibus Insulis* nasci, at nunquam audiui eum in alijs locis provenire. Hactenus *Dampier Orbis Cir- cumnavigat. pag. 298.* An Fructus in *Insula Sæ. Mariæ*, *Pyra* majore referens, intus muculentum. *Par. 3. Ind. Orient. 107. CBF. 439.* *Fol. 238. ad lin. 25.* Huc fortè spectat *Yztlacatinpatli*, *Nov. Hispaniæ. Hernandez, apud Rec. 453.* *Fol. 239. ad lin. 12.*

Post vocem imitatur, add. qui et ipse videtur, has duas species distinctas *Theo- phrasti* plantas, malè confunderet. *Ibid. ad lin. 17.* Variat etiam hujus Arbor *Limonia*, seu *Mali Medicæ* folio, & fructus medolla albicante. An non Arbor *Scientiæ* ejus, fructus erat *Malum*, in *terrestri Para- dyso*, primis *Parentibus* interdictum, & quod Nobis exinde omnium *Malorum* ortum dedit *saralem*; *Theologis* inquirendum propono; nobis enim hoc verisimile videtur. *Ibid. ad lin. ult.*

An *Limones* sua specie pusilli, in *Indiæ Insula Zeilam* *Hist. Lugd. fol. 1838.* At- tamen re verà hujus Arbor est *Coru Parkinsoni* species, fructu minore. *Fol. 240. ad lin. 14.*

Mamei folium, *Hist. Lugd. fol. 1836.* an *Mombini* et *Momulina*; *Almag. Bot. fol. 307.* an *Mammee Sylvestris*, *Dampier Circumnavigat. 204.* **MAMMEE** *Cubatinæ* folijs, & facie, Arbor ex *Insula Jahama.* *Ibid. ad lin. 30.*

Fortè *Tlapaltio-Cacolaxochitl* *Hernandez apud Rec. 94.* *Ibid. ad lin. 33.* Senæ spuria, aut *Aspalatho* affinis, arbor filiquosa, folijs bifidis, flore penta- petalo vario. *Cat. Jam. 50.* fortè *Ticaxochitl* aut *Tlahuichulxochitl* *Nov. Hispan. Hernandez, apud Rec. 94.* Chera-Mandatee *Malabarorum.* *Ibid. ad lin. 38.* Aateenarchedde *Malabarorum.* *Ibid. ad lin. antepenult.*

Dudaim in *Sacris Quorund.* de qua vid. *Epist. erudit. apud Stuckium in Corv. lib. 3. cap. 8.* Dabit etiam aliquid. *Kyberia* in *Latin. Trago*, ut & *Tremell.* *Annot. in Genes.* *Fol. 241. post lin. 12.*

MANGHA *Sylvestris*, angustis folijs, nitore lucentibus, *Thica* *Indiæ* *Malapore* simulans, *Morutan* chidde *Malabarorum.* *Manghas Sylvestris* altera, angustis densioribus folijs *Indiæ Orientalis*; *Caurimaun- chedde Malabarorum.* *Fol.*

Manghas aque *Americana*, folio subrotundo, *Barbadosibus* inter mangas dicta.

Hujus sunt fructus foris Amygdale pares, formâ, et magnitudine multo minores, Quos intus imâ sunt parte intrâ valvas concha marisera putat, in modum, villis longiusculis, & tenuissimis auranti coloris obfites, edis.

Hujus siliques, si potius folliculi, sunt longitudine duas, vel satem sesquipl. thamam excedunt, pulpâ absque seminibus repleti.

An Mangle julifera, foliis subrotundis, vertice summities latissimis confertim nascentibus, cortice ad eptis densanda edli; *Alise Barb. Hist. Cat. Jam. 156.* Item Mangle julifera foliis ellipticis ex aduerso nascentibus; an Cercibuna *Pi. form ejusd. ibid.*

Ibid. ad lin. 33.

Post 79. add. Mandioca radix in *Insula St. Catharina Hist. Brasil. l. Part. 3. Americ. cap. 4. 9. 11. 15. 17. ejusd. CBP. 90.* *Ayri Brasilianorum*, radix sesqui pedalis &c. *ejusd. CBP. 91.* Cassavi radix *Part. 8. Ind. Occid. ejusd. ibid.* Item Cocusehaw *Hist. in Virginit. ejusd. Pinac. 92.* *lit. & Arbor venenata 3. l. Succo venenato; radice esculenta ejusd. CBP. 512.* an Mandioca papiæ radix, cast. amara sapore; *Part. 7. Ind. Occid. ejusd. pag. 91.* an Mandioca Mandapore radix, ex qua Vinum conficiunt *ejusd. Pinac. ibid.*

Ibid. ad lin. eandem.

Post 794. add. Arbor farinifera venenati succi *ejusd. IB. Tom. 1. lib. 4. 505.* Arbor innoxiosa a succo venenato, radice esculenta *Juss. Dendrogl. 467.* Tucubis *Niemburgi 318.*

Ibid. ad lin. 39.

Est equidem hæc planta de Ricinorum genere, & nominati meretur Ricinus farinifera heptaphyllos, ex cujus radice venenata, & panem conficiunt *Americani.* Sub Ricini titulo in *Cat. Jam.* rectè ponitur. At, hujus Aardor apud more consueto, Nominum confarciunt fasciculum, & nobis sanè in errore verari viderur, quod Mânel foliis Patonia; *Part. 9. Americ. ejusd. 20.* ut & Tockahough, quæ non sunt Species ab Aro diversa, cum hoc suo Ricino confundit, nam ad unam eandemque plantam, utraque appellatio referenda sit.

An fortè Marrubium villosius, *Spanum, l. Montis Libani ejusd. Beerni ibid. 66.* An Pseudo dictamnium nigro, rotundo, crispo folio. *Boccon. Mus. Pl. pag. 152.*

Ibid. ad lin. 104.

Marrubium *Hispanicum*, rotundifolium, majus, seu latifolium; *Bocconi Mus. Pl. pag. 167. Tab. 12.*

An Marrubium foliis crispis, serratis, & incanis; *PBP. 10.*

Fals. 243. post lin. 2.

MATRICARIA maritima; *CBP. 179.* *Patthenium maritimum minimum, H. L. Engd. 1395.* Chamamelum maritimum; *Dalchamps. ejusd. 1394.*

Chamamelum maritimum, Dalchamps. ejusd. 1394.

Ibid.

Fol. 243. ad lin. 11.

MEDICAGO trifolia frutescens incana; *Turnesort. Elem. Bot. 318.*
MEDICA frutescens minor, *Ind. Or. Subrotundis*, sericeis foliis, filiqua falcata
 planâ, & *Maderaspatan*; nuper allata.

Ibid. ad lin. 16.

MEDICAGO annua, Trifolia facio, *Turnesort. Elem. Bot. 318.*
Ibid. post lin. 20.

MEDICA *Aethiopica*, foliis incanis, purpureis, floribus spicatis.
Ibid. post lin. 36.

MEDICA *Lusitanica*, dicarpos, fructu glabro, depresso. *PBP. 352.*
Fol. 244. ad lin. ult.

MEDICA polycarpos, *Turnesort. Elem. Bot. 327.*
Fol. 245. post lin. 4.

MEDICA minor *Syrinca*, floribus coronatis, luteis, ex foliorum alis, binis pectolis
 longioribus insidentibus; ex *Alippo*.

Ibid. ad lin. ult.

Varanna-mulle *Malabarorum*.

Fol. 246. post lin. 14.

MELILOTUS *Arabica*, Loto hortensi similis, flore luteo coronato; sive flori-
 bus luteis in sceta congestis.

Ibid. ad lin. 19.

Trifolium fructu racemoso; *Baroni Mus. Plantar. pag. 163. Tab. 124.*
Ibid. ad lin. 36.

Melilotus sive *Sertula* campana; *Hist. Lugd. fol. 511.*
Ibid. ad lin. 40.

Melilotus quædam *Cretica* *Prosp. Alpin. de exot. pag. 273.*
Fol. 247. ad lin. 8.

Yelanainreve *Malabarorum*.
Ibid. ad lin. 15.

Melissa arvensis hirsuta, procerior, haud ingrâtè olens, albido folio. (*Fr. Capani*
Hort. Cath. 140. **Melissa** sylvestris, foliis albidioribus, & lanuginosioribus. *Petr.*
Cascl. Hort. Messa. **Melissa** sylvestris hirsuta major *Italica*; *Buccari. Mus. Pl.*
pag. 166. Tab. 117. fortè etiam *Lanium* fetidum *Lusitanicum*, folio *Melissæ*;
PBP. append. **Marrubium** nigrum amplioribus foliis odoratis, ex *Insula Coe*, ut
 velit quidam apud *Nostrates*, non ita pridem in re *Botanica* *Neophytus*.

Ibid. post lin. 25.

MELISSA *Vulgaris* folio, & facie, inodora, ex *Provincia Mariana*.
Ibid. ad lin. 18.

Mentastrium maximum, flore cæruleo, Nardi odore. *Cat. Jam. 64.*
Ibid. ad lin. 21.

Hæc autem *Melissa* non est, sed re verâ ad *Mentharum* genera accenseri meretur,
 & nominari licet *Mentha* pilulifera *Betonica* formâ, & odore aromatico, ex
Insulis Fortunatis. *Polihomons Insulanis* dicta.

Fol.

Fol. 247. post. lin. 32.

Melissa Canarina multifido folio spicata, odorem *Camphora* spirans, penetrantissimum. *Vide Almog. Bot. app. fol. 1401.* An *Moldavice* Species trifolia, ex *America*, nuper ad nos missa; *Turnefort. de opt. Melb. instituend. in re Herbar. epist. ad Sherard. pag. 18.* Folia habet terna, quaterna, interdum quina serrata, hirsutie aspersa. Rubi foliorum æmula, summis caulibus emergunt flores ampli, galeati, pallide rubentes, labio superiore seu galea bifido, inferiore trifido albicante, lateralibus alis ex albo purpurascentibus, aut dilutiore purpure nitentibus, lineis albis intus variegatis & calycibus striatis, margine in quinque lacinas s. radios in extremitate incisos dissecto, uno pediculo pluribus simul natis, spicam habitiozem *Betonice* vel *Sideritidis Anglica* strumosa radice *Park.* similem conficientibus, singulis floribus succedunt quatuor semina simul juncta, oblonga, pulla, quæ dilapso flore, aliquandiu restant in calyce. Huic fortè congener est *Katu-Kurka Hort. Malah. Part. 10. Tab. 90.* quoad flores saltem; & eorum dispositionem; Hi enim in vertice caulium, in spica compactiore congregati proveniunt, foliolo viridi cuspidato reflexo succincti, perisco aureo pallidi, odoris grati, &c.

Ibid. post. lin. 38.

MELOCORCOPALI (fortè) *Scaligeria*. Arbor *Indica* Cydonii facie, fructu Melonis effigie. *C.B.P. 435.* Arbor *Cydonia* magnitudine & foliis, cujus fructus *Corcopal*, *Theveto*, & *Lugdunens.* Melory forsan arbor *Insula Nicobar D. Dampier Circumnavig. 478.* Hæc arbor quoad amplitudinem & proceritatem ad nostras *Malos* accedit, nigricanti cortice imbuta, folio non admodum lato; Fructus hujus arboris, magnitudine æquat *Artocarpophoron (V. c.)* *Bread-fruit* in *Insula Guam*, s. panem denario emptum, quoad formam *Pyro* similis, putamine lento, sed laxi, dilute viridi colore, pars fructus interior quoad substantiam poma admodum similis, fibrillis verò lignosis filamentorum magnitudine refertus, *D. Dampier* nunquam alibi hanc Arborem crescentem conspexit. Hæ sunt arbores *Melory* dictæ, & sua sponte provenire videntur. Indigenæ hujuscæ *Insula* ollis majoribus utuntur duodecem, vel quatuordecem amphoras continentibus ad incoquendum hujus Arboris fructum, has ollas fructu impleant, & modicam aquam adhibentes os ollæ foliis tegunt, quibus vaporem includant inter bulliendum, ubi fructus coquendo fit mollis, corticem delibrant & pulpam radunt à fibrillis plano ligniculo instar cultelli, exinde in frusta grandiora componunt instar *Casæ Hollandæ*, tum in sex aut septem dierum spatium conservari possunt, flavum habet colorem, & gustui placet, & pro cibo maxime utuntur.

Fol. 247. ad lin. 40.

Post vocem dispositis add. *Plu-ne-Læ*, vulgò dicitur, & *Salufandra* dici mereatur.

Fol. 247. ad lin. ult.

Et dici mereatur, *Gentianis* cognata, paludosa, foliis ternis fabaceis, formâ, & magnitudine, floribus in spica simbratis.

Ibid. post. lin. ult.

MENTHA tuberosa radice *C.B.P. 227.* *Mentastrium* tuberosa radice *Classi Hist. Plantar.* *Nepertha* tuberosa spicata purpurea *Hispanica Boccon. Mus. Plantar. pag. 44. Tab. 36.*

Mentha

Fol. 247. post lin. ult.

Mentha spicata nostras, *Cardiacæ* sativæ formâ, & odore, æmula, folio rugosiore. *Mentha angustifolia* spicata glabra, folio rugosiore, odore graviore; *Raji Synops.* 128. Hanc multis abhinc annis invenimus ad ripas Fluvii *Medway* dicti in agro *Cantiano* propè oppidum ~~apud~~ vulgo dictum.

Mentha Saxifraga, angustiore folio spicata, sapor eacri firvid. *Mentha* spicis brevioribus, & habitioribus, foliis *Menthæ* fuscae, sapore fervido *Piperis*. *Raji Synops.* 124.

Fol. 248. ad lin. 2.

An *Yxiayahual Chapaltepacensis*. *Nepeta Mexicana*, *Hernandez.* apud *Recc.* 224.

Ibid. ad lin. 3. add. *Phytogr. Tab.* 308. fig. 1.

Ibid. post lin. 7.

Mentha Costi Hortensis folio, *Balsamum apoplecticum* redolens, ex *Insulâ St. Helenæ*. *Mentha Syriaca*, magnis *Balsamitæ* foliis, odoratissima, *Chalopensis*. à præcedente diversa.

Ibid. post lin. 9.

Mentha Melissoides Americana, propè summitatem caulis floribus, ex alis longo pedunculo *Lupuli* ad instar glomeratis. Et re vera est de *Mentharum* genere, quanquàm inter *Scabiosas* ponitur in *Almagest.* fol. 335. sub hoc alieno titulo, viz. *Scabiosæ* affinis, *Chrysanthemi* facie, *Lamii* foliis *Americana*. Sub quo etiam depingitur in *Phytogr. Tab.* 222. fig. 7. *Barbadensibus* nostratibus *Arxangel* (hoc est) *Lamium* à foliorum similitudine, & aliquando ~~inter~~ *Scabiosas*; (i.e.) *Scabiosa* redolens, & quibusdam *Persum d. hops* (i.e.) *Lupuli* odoriferi nuncupatur. An *Sideritis* spicata *Scrophulariæ* folio, flore albo, spicis brevibus habitioribus rotundis, pediculis insidentibus, ~~amido hops~~, *Car. Jam.* 65.

Ibid. post lin. 13.

Mentha arvensis verticillata, folio rotundiore, odore aromatico, *D. Vernæ. Raji Synops. Stirp. Brit.* 123.

Mentha arvensis verticillata, fragrantissimè moschum redolens, à *Terrâ Marianâ*. *Auricularia Indorum* ad Surditatem efficax, *Car. Mart.* vulgò *D. Martæ*.

Ibid. ad lin. 23.

Ricino quodammodo convenit.

MERCURIALIS *Coromandelienfis*, tricoecos, major, *Urticæ* facie, cum acetabulis. An *Welia-Cupameni*, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 83.

Ibid. ad lin. 27.

Ut & *Yxyayahuatl* vel *Yxyayahual*, *Nov. Hispan. Terentij* apud *Reccum.* fol. 448. Fortè etiam *Yzquinchichicalli*, apud eundem *Recc.* fol. 449.

Ibid. post lin. 27.

Mercurialis Mariana, *Urticæ* folio trinervis, floribus albis perexiguis.

Ibid. post lin. 29.

MESPILUS folio laurino major; *CBP.* 453. *Mespilus Setania*, *Hist. Lugd.* 334.

Mespilus peregrina, non serrata, *Saliciæ* capreæ longioribus foliis auriculatis.

Fol. 248. post lin. 34.

Mespilo Alni lanato folio majori similis, non crenata, Arbor ex Insula St. Helena.

Ibid. post lin. 36.

Mespilus Mariana, lanatis foliis minutissime crenatis, floribus in spica digestis.

Fol. 249. post lin. 3.

Mespilus Mariana, mucronatis Pruni foliis, pallide virentibus, fructu brevi pediculo insidente.

Eadem foliis late virentibus, pomis longo pediculo innixis.

Ibid. ad lin. 16.

Hujus autem arboris fructus duobus tantum officulis sunt præditi, ergo deleantur quæ sequuntur verba, viz. An Oxyacanthus quinque officulis, fructu magno inclusis, *Banisteri*. Et eorum loco inserantur Oxyacantha officulis binis, fructu magno inclusis, *Banist. Cat. Virgine*. Quæ eodem in folio ad lin. 23. & 24. Expungantur, ut Synonymum prædictum illic male attributum, ad hunc locum transponatur, & sic emendabitur error, hujus enim fructus officula instar novæ Lunæ quodammodo arcuata, & ad extremitates acuta, sunt numero quinque.

Ibid. ad lin. 32.

Hujus fructus sunt nucleis gemellis, Officulis subrotundis.

Mespilus Virginiana, Pyracanthæ parvis subrotundis foliis, subtus incanis, spinis longissimis armata.

Mespilus Nova-anglicana, Oxyacanthæ similis, officulis binis hæmisphæricis, ita inter se junctis, ut unum globum rite conficiunt.

Ibid. ad lin. 40.

Hujus sunt Baccæ parvæ tetrapyrænae, (i. e.) quatuor seminibus s. nucleis repletæ, sigillatim & seriatim stipitibus adnatæ; sive distinctis baccis Oxyacantha.

Ibid. ad lin. ult.

Pæonia Ceylanica titulus, quoniam non est multiflora, sed tricapsularis hexapetalos, male huic plantæ tribuitur; potiori jure *Lilium Ceylanicum* seminibus ad *Pæoniam* accedentibus dicatur. *Sheranarchalunga* & interdum *Calapecalunga* à *Malabareis* nuncupatur apud quos radix pro Antidoto habetur.

Fol. 250. ad lin. 6.

Milium semine albo; Peelehellendenaicum à Malabaræis vocitatur.

Ibid. ad lin. 32.

An *Millefolium alpinum*, tomentosum, odoratum, nanum, *Bocc. Mus. Plant. pag. 166. Tab. 120.*

Ibid. ad lin. 38.

Tanacetum album tenuifolium, flore candido, *Bocc. Mus. Plant. pag. 83. Tab. 25.*

Tanacetum odoratum, Absinthij Pontici profundo dissectis foliis viridibus, *Battistæ Trionsetti.*

Ibid. post lin. antepenult.

MILLEFOLIUM camphoratum aureum, *Manomotapense.*

Fol. 251. ad lin. 3.

Ad *Alepeum Urbem Syriæ* maximum & *Emporium* celeberrimum, hoc *Millefolij* *Ghamacypariffi* facie, perpulchrum genus collectum habuimus. Huc forte spectat *Abrotanum* femina incanum, albo *Achillææ* flore, *Creticum*. *Boccon. Mus. Plant. pag. 46. Tab. 34.*

Fol.

Fol. 251. ad lin. 5.

An *Argyrocome* *Ericoides*, f. foliis *Rosmarini* angustioribus, *Cap. Bon. Spei.*
Breyn. Prodr. 2. 15. *Chrylocome* f. *Argyrocome* *Africana*, *Ericoides*, flore
albo, *ejusd. Prodr. 1.*

Ibid. post lin. 13.

Millefolium *lenticulatum* *Indicum*, capsulis orbiculatis; *Yellapathée* *Malabarorum*
(i. e.) *Planta aquatica.*

Ibid. ad lin. 27.

An *Æschynomene* *spinosa* *arborescens*, frondibus orbicularibus, pinnis *Acaciæ*
latioribus, siliquâ parvâ, filo pilis rigidis radiato, cinctâ, *Breyn. j. Prodr. 2.*
pag. 9.

Ibid. ad lin. 38.

Nec non ex *Oris Coromandel* ad nos allata est. *Acacia* *Javanica* *sulcata*, caule &
foliorum costis spinosis, *Hort. Med. Amst. fol. 205. cum Icone.*

Ibid. ad lin. ult.

Huc fortè spectat *Yztacpatlis* *Tepehicensis*; Frutex quem *Michuacanenses* *Hoximo*,
vocant *Hernandez. apud Recc. 106. cujus & altera Icon habetur fol. 481.*

Ibid. post lin. ult.

MIMOSA *hirsuta*, *pumila*, flore purpurascente, quæ tactu ramulis non modo
clauditur, sed humi prostratur. *Mimosa* *humilis* *herbacea*, *Ind. Orient. se-*
minæ vulgaris æmulo; *Chaddailackaræ* *Malabarorum*. Huic nostræ *Tlacoxi-*
loxochitl flore barbato; *Hernandez apud Recc. fol. 104. plurimum convenire*
videtur.

Mimosa *humilis* *quadripennis*, *glabra*, *procumbens*, guttis sanguineis maculata,
ex *Insula Ceylon*. Hanc perelegantem plantam curâ *Industrii Hortulani D. Joan.*
Adams, à seminibus enutritam in *Hort. Episcopali Fulhamiæ* conspeximus.

Mimosa *Indica*, siliquis plurimis simul junctis, latis, brevibus, flore parvo, globo-
so. *Varainchudde* *Malabarorum*.

Mimosa *pumila* *Ceylonensis*, erecta, multifolia, pinnulis singulis, maculâ purpureâ,
utrinque notatis.

Fol. 252. ad lin. 4.

Pooncheddai *Malabarorum*. *Ibid. ad lin. 15.* An *Mimosa* *herbacea*, non spinosa,
minima, repens, *Cat. Jam. 153.*

Ibid. ad lin. 24.

Vid. *Phytogr. Tab. 4. fig. 4.* An *Malam-Todda-Vaddi*, *Hort. Malab. Part. 9.*
Tab. 21. Fortè etiam *Mimosa* *arbores*, non spinosa, *Indica*, *Cristæ pavonis* fa-
cie, pinnis latissimis *Tamarindi*, siliquâ spadiceâ, maximâ; *Breyn. Prodr. 2.*

Ibid. post lin. 24.

Mimosa non spinosa, *Coluteæ* foliis, floribus stamineis, siliquâ latâ, fuscâ, brevi,
& lignosâ; *Erewetamaram* *Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 33.

An *Herba sentiens*, & *pudica*, *Bontij fol. 120.* *Herba viva*, foliis, & floribus
longis pediculis uni thyrsi insidentibus, *Ambonica*; *Rumph. Eph. Germ. Ann. 11.*
Olif. 32. An fortè *Charitoplepharon* *Jubæ* regis *Mauritanie*. *Herba amatoriis*
efficax, quæ circa *Trozodytarum Insulam* nascitur; *apud Plin. lib. 13. cap. 25.*

Fol. 252. ad lin. 38.

Jalappa vera, Mirabilis Peruviana, flore rubro, Manting. cultur. Plantar. 212.
 The flower of the span, in Ligon. fol. 99. & vulgò, The tower & clock flower,
 nuncupatur.

Fol. 253. ad lin. antepenult.

Hujus radicis cortex, Sam pe pt à Sinensibus vocatur; Cleyeri Med. Simpl. Chi-
 nens. pag. 530. no. 280.

Fol. 254. post lin. 2.

MORUS Mariana, densioribus subrotundis foliis, ad oras amplioribus ferris:
 An Morus Virginiana Park.

Ibid. ad lin. 10.

Ut de Larico Musco suo dicit Johan. Bauhinus, Tom. 1. Part. 2. 273. Sic dici
 possit de nostro, Totus citrino colore nitet perameno.

Fol. 256. ad lin. 3.

Fortè etiam, Muscus terrestris, Cupressinus, nanus, Styriensis; Baccon. Mus.
 Plant. pag. 161. Tab. 108.

Ibid. post lin. antepenult.

Musculus polytrichoides, humi instratus, The Carpet-moss dictus.

Musculus erectus Abietiformis; ex Insula Johanna.

Fol. 258. ad lin. 6.

An Musculus terrestris, minor, repens, cujus ramuli, foliis multis & minimis se-
 riatim quadrato ordine dispositis, cinguntur, Cat. Jam. 12.

Ibid. ad lin. 31.

An Aphyllon Indicum JB. Tom. 2. lib. 15. fol. 211. Rosa Hierobonica exsic-
 catæ similis, Blatterlofs. Hollandus; Fruticulus ad Scorbutum; Ind. Orient.
 Part. 4. fig. 21. Casp. Baub. Pinac.

Ibid. post lin. 38.

MYROBALANUS citrina, Carcai Malabarorum, est Arbor Prunifera. Pruna
 rectius appellari censet Garcias arem. lib. 1. cap. 27. Invehiturque in Arabum
 Interpretes quod Myrobalani vocem Arabicam Delegi, Halilegi glandem reddi-
 derint cum pruna longè convenientius vertere potuissent. Mesue recenset opi-
 nionem Illorum qui Citrinas, Indas, & Chebulas, ejusdem Arboris fructus esse
 judicant, citrinas quidè, ubi nondum maturi sunt fructus, Indas ubi maturu-
 erint: Chebulas ejusdem arboris eodem anno esse fructum. Ipse autè de di-
 versis esse arboribus videtur asserere, verior sententia diversas esse, ut diversa
 operationis. Garcias ab Orto, & post eum Chrystophorus à Costa diversas esse ar-
 bores testantur. Vessingius de Pl. Egypt. rectè, Errant (scribit) qui tot Myroba-
 lanorum genera, unius arboris fructus esse arbitrantur. Species septem ex Se-
 rapione enaxare se posse existimat Gabriel Fallopius, insignis Simplicium in Patavino
 Athenæo demonstrator, quinque tamèn tantum sunt Officinis notæ. Ignoræ fuisse
 hæc Arbores, & hi fructus veteribus Græcis, ab Arabibus primò in Scholam Medi-
 cam introducti. Citrinæ Myrobalani dictæ primum obtinent locum. Quæ in
 Lotio, bovino calide infusæ, & ægro propinatæ, infallibiliter ut aiunt, hydropi
 medentur. An verò sit hæc Arbor eadem cum Phœnico-balano, Plin. Hist.
 Nat. lib. 12. cap. 22. f. Palmæ Myrobalaniferæ, lib. 23. cap. 5. Ut & ista fun-
 gosa.

gosa substantia Tuberibus similis, quæ Myrobalani citrinæ flores, & à quibusdam Faba *Bengalensis* dicitur, ad omnes hæmorrhagias, præsertim ad hæmoptosyn sistendum, summè utilis, sit primum istius Palmæ fructus rudimentum, quam *Plinius* Adypson vocitet, nos solertissimis Naturalium Indagatoribus considerandum relinquimus.

Fol. 258. post lin. 38.

Myrobalanus Bellerica Officinæ. Taunecai Malabarorum. Cujus fructus sunt quasi pilosi, in extimâ facie, ut ritè dixit *Fallopianus*; Fortè Tani, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 10.* Cujus in descriptione, fructus sunt cortice tenui glabro nittente, ac rubicundo cincti, nostri tamèn cortice sericeâ lanugine ex subrufo, nittente sunt obvoluti, cæteris autem huic omnino convenit, ut eandem esse Arborem meritò suspicari liceat. Perperam enim mea quidem sententiâ huic Tani *Malabaricæ* à *Commelino* adscribitur; Fructus in *Insulâ St. Mariæ* pyra majora referens, intus muculentum, *CBP. 439.* Myrobalano *Bellericæ* ut nobis videretur *Idu-Mulli, Hort. Malab. Part. 4. Tab. 18.* congener est; & nominari potest *Myrobalanus Indica*, Arbor spinis horrida, angustiori folio longo, fructu racemoso. Hujus quoque *Indolis*, scilicet quoad fructus saltèm, est *Punanchidde Malabarorum.* Quæ sub titulo *Purnaval* etiam aliquandò ex *Orient. Indiâ* accepimus (i. e.) Arbor aromatica è *Coromandel* Laurinis foliis binis, ternisve nostra; *Raij* cujus ramulus absque fructu tunc nobis in viso, in *Phytogr. Tab. 14.* exhibetur; & dici mereatur *Prunifera triphylla Indica* foliis & ligno aromaticis; fructu umbellato pyriformi, sericeâ lanugine tecto. Forsitàn non incommodè ad *Agallochum*, barbarâ appellatione, nunc ob sâporem amarum, *Xyloaloe* referri possit, Arbor ad *Thymiamata* rectorioribus sæculis frequenti usu, cujus fit mentio in libro *Proverbiorum, cap. 7. v. 17. Canticorum 4. v. 14. Psal. 45. v. 9.* Eadem arbor aromatica, seu idem *Aloës* lignum designatur *Joan. 19.* cum scribitur quod *Nicodemus* venerit φάρμακον μύρρης & αλόης ἀραιά λήτης ἰατρὸν, ferens misturam Myrrhæ & Aloës, quasi libras centum. *Agallochum Officinæ, CBP. 393.* Lignum Aloës vel *Paradisi*, vel Sanctæ Crucis, *Cornaro.* Lignum est (*Autore Dioscoride lib. 1. cap. 21.*) quod ex *Indiâ* & *Arabia* adfertur, Thyiæ ligno simile, ἑτερομύρον, ὁμοῦ δὲ ὁμοειδὲς ὅν τε γινώσκουσιν ποτὶς πικρὸν, punctis & maculis distinctum, odoratum, cum amaritudine quâdam gustum adstringens; quod verò *Agallochi* arborem, fructum proferre rotundum, *Piperis* modo; & rubentem *Serapio libr. Simplic.* refert, à veritate alienum esse suspicor, cum nec reliqui *Arabes, Rhafis, Avenroës* & *Isaac*, usquàm ejus fructus meminèrant, tametii *Agallochi* facultates descriperint: Cum verò rarissima sit hæc Arbor, Santalum flavum, aut citrinum ejus Ἀρκαλλόμυρον ponitur, Ita *Renodæus, Si desit* Lignum aloës, *Sandalum citrinum substituendum.*

Myrobalanus Emblica angustis *Acaciæ* foliis, *Hosculis Tamarisci* racemosis. *Nellemaram Malabarorum.* An *Myrobalanus Emblica, Clusij Not. ad Garc. Arom. Hist. lib. 1.* *Myrobalanus Emblica, foliis Securidacæ, Breyn. Prodr. 2. 74. Nilicamaram, Hort. Malab. Part. 1. fig. 38. vid. fol. 6.* hujus *Almagest.*

Fol. 259. ad lin. 3.

An *Myrrhis annua alba*, hirsuta, nodosa, *Pastinacæ sylvestris* folio candicante, *Hort. Catb. 148.*

Fol. 259. ad lin. 8.

Cicutaria bulbosa, esculenta; *Boccon. Mus. Plantar. pag. 171. Tab. 123.**Ibid. ad lin. 11.*An Myrrhis altera parva *Lobelij Hist. Lugd. quoad Iconem fol. 761. cujus parvitas (forte) debetur, eo quod in Genevæ & Salevæ vicinis montibus reperta fuit.**Ibid. ad lin. 15.*Quam Chærefolij sylvestris speciem fecit *Morisonus, Umb. 79.*MYRRHIS *Virginiana*, Angelicæ multiplici lobato folio. An Myrrhis *Americana* foliis *Angelicæ*, semine brevi, crasso, *Breyn. Prodr. 2. 75.*Myrrhis *Chalepensis* elegans, Pastinacæ subrotundis parvis foliis, oris profundius incisus.*Fol. 260. post lin. 4.*MYRTIFORMIS baccifera *Ind. Orient.* fructu subrotundo coronato, *Codalunge Malabarorum*, adversus Diabeten presentaneum remedium est. Avacari forte sive Planta miræ efficaciam adversus inveteratas dysenterias *Garcia ab Orto, Plant. Hist. lib. 2. cap. 8.*Myrtiformis baccifera, Salicis pumilæ foliis, *Æthiopica*, sericea lanugine fusca incanis. An Myrtiformis frutex *Æthiopicus*; *ten Rhine*; *Breyn. Fasc. 22.* Est species *Vanamaram Malabarorum* f. *Arbusc.* baccif. monopiren. ex *Territorio Divi Georgij* apud *Indos Orientales.**Ibid. ad lin. 13.*Hæc vero non est *Laurus odorata Stapelij*, ut semel putavimus, sed ab ista plurimum diversa, ut ab istius exemplaris genuini ad *D. Stonestreet*, à *Pramont. Bon. Spei.* allati propria inspectione nos nuper didicimus.

N.

*Fol. 261. ad lin. 4.*NEC ab eâ plurimum distat *Curutzeti* vocata Planta à *Michuacanensibus*; *esufd. Recc. fol. 46.* ab aliis *Aphatzipunzumati* aut *Aphatzestrangua*; sunt qui *Tziphatlici*, & *Tzipesi* vocent.*Ibid. ad lin. 11.*An forte *Nasturtium Pyrenaicum aquaticum*; *Herman. Paradis. Batav. 203.* *Nasturtium Pyrenaicum aquatic.* latifol. purpurascens flore, *D. Fagon. Schol. Bot. pag. 85.**Ibid. ad lin. 14.*Hæc forte spectat *Tlac-cetec* vel *Tlaliztic*, *Novæ Hispan. Terentii* apud *Recc. fol. 414.*

Fol.

Fol. 261. post lin. 39.

NASTURTIIUM *Aethiopicum*, tenuissimis Coronopi falcatis foliis, flore elegantissimo, caelestino. Auspicis D. Doady ex seminibus natum, in Horto Medicinæ Chelseiano, Observavimus.

Ibid. post lin. antepenult.

Nasturtium *Virginianum*, Cochleariæ folio, flore albo ampliore. An Cochlearia flore majore, Banister. Cat. Stirp. Virg.

Nasturtium *Virginianum* *Babylonici* foliis, lætè virentibus. Plurimis convenit præcedenti folia habet longiora magis dentata, & flores paulo minores.

Nasturtium *Marianum* *Myagri* foliis integris.

Fol. 262. post lin. 2.

Nasturtium *Marianum* *Anemones* sylvaticæ foliis enneaphyllon, floribus exiguis.

Nasturtium *Marilandicum*, Cannabinis foliis flore majore enneaphyllon.

Ibid. post lin. 12.

Nasturtium petrarum angustifolium; ex Prom. Bon. Spei.

Nasturtium petrarum *Aethiopicum*, siliquâ in plurimos loculos, isthmo connexes, dispersitâ, floribus albis.

Fol. 263. ad lin. 12.

An Nerium arboreum altissimum, folio angusto, flore albo, Cat. Jam. 154.

Ibid. ad lin. 14.

An Apocynum erectum fruticosum, flore luteo maximo, & speciosissimo, Cat. Jam. 89. **Savanna-flower** *Jamaicensibus* dictum.

Ibid. ad lin. 18.

Fortè etiam Perebecten *Insulæ Hispaniolæ* Hist. Engd. 1901.

Ibid. ad lin. 24. add. & fol. 312.

Ibid. ad lin. antepenult.

Inter Nigellarum genera, & Xochipalli Artimesi folia, Hernandez apud Recc. 240. locum sibi vindicare potest, & ad Nigellam latifoliam *Hispanicam*, accenseri meretur.

Fol. 264. ad lin. 4. post vocem differt. add.

Quæ fortè eadem est cum Tataricâ, Caroli de Noyelle, & Athanasij Kireberi. *Tataria Hungarica* Clus. Hist. rarior. lib. 6. cap. 14. Panaci Heracleo similis *Ungarica*, CBP. 157. An Baltracan in *Tartaria* nascens, Josephi Barbari. Hujus radice *Ungariæ* *Agriæ* *Vicini*, alterius panis penuriâ vescuntur, & Tartari foliorum in aquâ decoctum refrigeratum, Vini instar bibunt, quæ Sphondylion nostrati, sive Pastinacæ sativæ, adeo assimilatur, ut in *Japonensi* Terrâ, ipsa Pastinaca; magnæ sylvestris *Ninjin* nomen vulgò obtineat. An nostra sit Scandragora *Indoædis* *Rasæi* cap. 381. Marby Ebn Serapionis, quod est Mandragora Comarodes in Panacæa *Cleemperi* regiâ *Persarum*, apud Plin. lib. 24. cap. 17. ut ex *Georgio Velschio* didicimus. Nostra quidè fortè sit Hendem *Arabum*, JB. Tom. 1. fol. 339. vel ut quidam scribunt Genden *Bellunens.* ad margin. *Avicen.* viz. lib. 2. Tr. 2. cap. 503. Ubi addit *Gianzi henden*, totum hoc caput à Serapione accepit; Nux enim satis propriè nominari possit radix, quæ sapore nucem refert. Radices equidè sunt multiplices quæ à quâdam similitudine, vel usu glandes, & nuculae vocitantur, quemadmodum Lathyrus tuberosus, Bulbocastanum, Trasi quoque

que ex mente *J. Baubini Tom 1. lib. 3. 292.* sunt veluti Fructus, & Nuclei avelanarum. *Nisi Japoniarum.* Cujus figuram ex *Libro Herbario Sinenfi* dedit *Reverend. & Nobiliss. Müllerus.* Et aliquando vocatur *Gim-Sem. (i. e.)* Nativitas hominis *Sinenfis* ut invenio in *Epist. Georg. Hieronym. Velschij ad Joan. Matthæum Fabrum Hist. Strychnomaniæ* adnexa. *Gin-Sên Sinenhuon, Andr. Cleyer de Medic. Simpl. Chines. usitat. pag. 25. no. 4.* Necnon *f. Ningling D. Marboë Ols.* Insigne est Analepticum, de qua vid. *Ogilv. Chin. Tom. 1. fol. 244.* Instaurat spiritus & sanguinem, bibitur subindè instar potionis *Cbâ*, vulgò *Tbee* dicta, ut idem *Cleyerus ibid.* Omimezeli seu Os femoris *Hernandez apud Recc. 276.* Huic quodammodo convenire videtur, immò maximè consentaneum est, eò quòd radix nostra, in duo quasi femora divaricata, incoxantem quoque hominem, quodammodo refert.

Fol. 264. ad lin. 15.

Huic fortè spectat, *Nummularia Saxatilis*, minima, repens, foliis ercatis villosis, floribus albis, *Cat. Jam. 90.*

NUMMULARIA foliis & facie *Virginiana*, flosculis parvis tubulosis, summo ramulo binatim junctis; an fortè de *Rubiarum* genere, tunc dici meretur, *Rubeola Virginian.* Nummular. fol. binatis, flosculis in summo purpureo-cæruleis. A qua haud multum distare videtur, *Rubia parva latifolia*, foliis ad genicula binis, flore rubente, *Banissler. Almagest. Botan. 324.*

Ibid. ad lin. 20. post vocem alterum, add. fructu.

Ibid. ad lin. 33.

Nux Juglans trifolia, fructu magnitudine *Nucis Moschatæ*; *Cat. Jam. 128.* In juniore & tenellâ plantâ, modò trifoliata cernitur, cum magis adulta, quinquefoliata & interdum heptaphylla, s. septem latiusculis pinnis ornata, antea justam magnitudinem adipiscitur.

Ibid. ad lin. 35.

Kitcatana, Noë anglicana dicta, undè ad nos missa est, cui folia sunt angusta, *Fraxini vulgaris* haud abssimilia.

Fol. 265. post. lin. 14.

NUCIFER A arbor sempervirens *Indiarum*, prælongis foliis venustè venosis, cujus lignum *Arbwood, (i. e.) Erythroxylon Barbadosibus*, *Nux verò Dhumba Ceylonensibus* dicta. Cui flores sunt spissi, colore lactei, admodum odorati. Spectabilis magnitudinis Arbor est. Hujus est Fructus orbicularis, perpolitus, mucrone glandis, *JB. Tom. 1. fol. 313. Clus. exor. lib. 2. cap. 25.* An Arbor quæ vel *Brasiliensem* rubedine superat, *Ind. Orient. Part. 6. cap. 56. fol. 123.* Arbori *Brasilianæ* affinis, *CBP. 393.* *Araboutan 2. sive Pseudosantalo rubro Brasilienfi* affinis, *Jonston. Dendrolog. 457. Logwood Demino Battelio Purckes. lib. 7. cap. 3. Sect. 5. fol. 979.* An fortè *Mali Persicæ Mameyæ* dictæ folio longiore, arbor maxima, cortice sulcato, cinereo, amaro, *Bakard-Pamæ Træ, at Santa Maria, Cat. Jam. 180.* An fortè *Palma Maria, Dampier. Circumnavig. pag. 212.* Quæ ad Navium Malos conficiendos, ob altitudinem suam, tam *Angla*, quam *Histrus* usitatissima. Hujus ramulum ex *Ind. Orient.* jam olim missum habuimus sub gentilitio Nomine *Ponakal-verree.* Hujus arboris fructus, fructui *Ponnæ, Hort. Malab. Part. 4. Tab. 38.* quamplurimum assimilatur, *Fol.*

Fol. 265. ad lin. 25.

Hujus meminit Dampier in *Circumnavigat.* pag. 392.

Ibid. ad lin. 28.

An Belgis in Brasiliâ, vulgò Lotus Marogr. fol. 111. quoad picturam, Arbor filiquosa Brasiliensis, foliis pinnatis, costâ mediâ membranulis utrinque extantibus alata, Raij. *Hist. Plant.* 1762. Fortè etiam Juglandis folio fruticosa filiquosa, foliis pinnatis, costâ mediâ membranulis utrinque extantibus alata, filiquâ quadrangulâ, Cat. Jam. 1753. Hujus exhibetur Icon in *Hort. Med. Amst.* nuper edit. in Fol. ad cap. 94.

Ibid. ad lin. 32.

An Arbor baccifera Indiæ, foliis majoribus splendentibus, flore pentapetalo, *Hort. Medic. Amst.* cap. 90. cum Icone.

Fol. 266. ad lin. 4.

Hujus fructus globulis precariis parandis sunt aptissimi, undè forsân Arbori nomen *Pater noster*, à quibusdam sic impositum; *Ovet. Hist. lib. 9. cap. 5.*

Ibid. post lin. 6.

Nuciprùnifera Arbor Indiæ Orientalis, Populi albæ foliis amplissimis; f. pampineis foliis alba lanagine testis. Carututee Malabarorum. Locis montosis, saxosis, præruptis, aridis, ad Têrchubeani Montem, haud procul à Territorio Divi Georgij apud Indos, luxuriant hæ Arbores.

Ibid. ad lin. 13.

Post conspeximus add. Lignum Americanum fætidum, merdam olens, Palæfoulatio, *Lusitan. PBP.* 346. Huic Telabo Zeylanensium congener est, ut nobis videtur.

An fortè idem cum Quauhiyac, sive Arbore fœtidâ, *Hernandez apud Regg. fol. 68.*

Ibid. post lin. 28.

Nucipomifera Arbor, foliis densioribus subtrus argenteis, floribus in prælongam spicam dispositis, fructu tetragono; An fortè Samstravadi, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 6.* Quæ species est Tsjambou, ejusd. *Hort. Malab. Part. 1. Tab. 17. & 18.* Ut putat *Commelinus*, in loc. Noereaddumba Malabarorum.

Fol. 267. ad lin. 9.

Nymphæa Indica, flore candido, folio in ambitu serrato, Cat. Jam. 1750.

Ibid. ad lin. 7.

Alepoo Malabarorum. *Ibid.* ad lin. 9. Nymphææ minoris affinis Indica, flore albo piloso, *Commel. Not. in loc. Cat. Jam.* 121.

Ibid. post lin. 9.

NYMPHÆA minor Scaphoides, f. oblongo folio, umbilicata, ex Terrâ Mariand.

Ibid. post lin. 15.

Nymphæa Indica, latioribus albicantibus foliis, margine crispatis; Aucashdam-maree Malabarorum Kodda-pail, *Hort. Malab. Part. 11. Tab. 32.* Sedum Indicum palustre, foliis latissimis crispis, floribus albicantibus pilosis, *Commelin. Not. in loc.*

Ibid. ad lin. 18.

Post fig. 5. add. Nymphæa Indica, flore purpureo, ejus calyx, seu fructus, quasi per nebulam à *Cusio* describitur, *Bentij l. b. 6. fol. 128.*

Fol. 167. ad lin. 22.

Hujus accuratior Icon habetur, *Phytograph. Tab. 322. fig. 1.* De hujus quoque genere videtur, *Nymphaea* flore caeruleo, odoratissimo, *Cupitis Bon. Spec. Breyn. Prodr. 2. pag. 77.* Cujus foliorum tanta amplitudo est, atque durities, ut cum suapte natura concava fiat, poculi ministerium nullo prorsus adhibere artificio Catinorum, atque paroplidum vicem reddant; quin in ipsa Urbe *Alexandria* ad ipsos hos usus, illa folia publice venduntur, *Strab. lib. 17.* Atque ita fit ut Faba una tegumentum, umbraculumque multis convivis praebeat, pocula, paroprides, simul quoque esculenta, panem scilicet & obsonium, & quod utilius est, etiam plurimos durare solet annos in fructus; *Pyrri* enim regis etate, quodam specu *Ambraciae* usque ad *Pyraticum Pompeii magni* bellum durasse, annos circiter centum viginti, Faba compta est, *Plin. lib. 18. cap. 30.* Hinc fortè *ἐμπύλας* *Græcorum*, *Anglicè* *water-monty d. betwils*, or *Cups*, *Cooper.* Ecpetala Pocula perampla, quoniam folio perampla nuncupantur petala, *Cæli.* De radice hujus Fabæ, & ejus spinoso caule ita *Diocorides lib. 2. cap. 128.* Radix (inquit) subjacet *Harundinis* radice crassior, quæ cocta & cruda estur, & *Colocasia*, nominatur; quæ quanquam sit *Vox Egyptica*, fortè tamèn duci potest à *Κόρυς*, *Κόρυς*, & *Κόρυς* ornare, ob multas utilitates, flores enim sunt ad coronamenta; Fructus maturus ad cibarium opulas; & Radix ad edendum. Vel dict. ab amplitudine foliorum, quasi *Κόρυς Κόρυς* (i. e.) parva lacerna. *Ross.*

Ibid. ad lin. 32. add.

Et *Glin. Tom. 1. fol. 130.* Hæc quoque in folliculo perampla, ad Coni inversi effigiem, & Coli instar perforato, seu *Vespertina* favi cartilagineo modo, in cellulas excavato, Fabas, sive fructum suum habet inclusum.

Nymphaea minoris folio, *Mentis Tabulari*, Planta terrestris. Fortè *Brassica* folio *Nymphaeæ*, *Cajou-a*, *J.B. Tom. 2. 385. ex Lerio. Hist. Americ. cap. 73.* *Brassica Brasiliensis*, fol. *Nymphaeæ*, *CBP. 111.* Quam *Ari* gènus facit *Sloanus Cat. Jam.* 6. Ubi *Tajaobo* prima *Pisoneis* quæ de *Rapunculorum* est genere, ut *Cl. Rajo*, & nobis videtur, pro hujus *Synonymo* ponit, ac in parvo spatio multa miscet indistinctè pro more consueto. Utendum ergò in rebus *Botanicis* hujus *Herboldij* Catalogum, semel & simul consulo, ubi non hallucinatur, quod ei tamèn nimis familiare est; Hic enim ex probatis Autoribus multa, ac ex inidoneis quam plurima congestit, quæ cum judicio oportet recipere; Nautarum etenim dictis, quibus hujus Catalogus est maxime fructus, in re *Herbaria*, vix quælibet vel minima datur autoritas, quod plerumque hi sunt homines admodum dilutæ fidei, & parum probatæ; Nec in *Plantarum* disquisitionibus, unquam volui ad *Nauclerum* Narrata, seu aliquod *Veritatis Tribunal* appellare, cum hi non æqui sint Judices, & ad *Botanicas* litigationes componendas, maxime inidonei: Hos ego nec laudo, nec vituperor testes, ac sæpenumero de eadem re, modo affirmant, modò negant, & nos sub cultro relinquunt. Quinetiam tot nodi apud ipsum Catalogi *Scripturam* malè probatissimos Autores interpretantem, res ipsas implicant, qui nisi *Mercurius* quidam de *Cæli* mitteretur, ut eos solveret, mihi sanè videntur inexplicabiles. An hæc sit *Asari* folio, Planta *Ethiopica* *D. Hermon Breyn. Cent. 178.* Studiosis inquirendum propono.

O.

Fol. 268. ad lin. 4.

HUIC etiam pertinet Huicxiqua Michuacanensium, L. Mexiconsisbus Xoxocapali, Hernandez apud Recc. 113.

Ibid. post lin. 14.

OCYUM Indicum, Melissæ folio fragrantissimum, semine fusco.

Ocymum Indicum Mercurialis folio odoratum, spica florum gracili. Karunde-poon-doo Malabarorum.

Ibid. ad lin. 17.

Karu-Tumba (fortè) Hort. Malab. Part. 10. Tab. 92.

Ibid. post lin. 24.

Ocymum Indicum, Melissæ foliis atro purpureis, odoratissimum. Param-Tulsce Malabarorum. Fortè idem cum proxime præcedenti.

Ibid. post lin. 28.

Ocymi genus Indianum, Tragorigani ferè facie, odore gratissimum, flosculis ad verticillus densis stipatis. Kerande-chidde Malabarorum.

Ibid. ad lin. 37.

Daucus pratensis, Dalechampi Hist. Lugd. lib. 6. fol. 718.

Fol. 269. ad lin. 5.

Ziziphus alba argentea Zeylanica, Hermanns Brycn. Prodr. 2. 105.

Ibid. ad lin. 8.

An fortè Frutex innominatus, Marcy. lib. 2. cap. 2. Hanc etiam habuimus ex Prom. Bon. Spet. Fortè Sideroxylum Africanum Cerasi folio, Hort. Med. Amst. cum Itone cap. 101. fol. 197.

OLEA Africana Nerij facie, foliis longissimis, an fortè Aspalathus albicans, to-mulo citreo, CBP. 391. Rhodium lignum, quibusdam Agallochum, Olea Ethiopica, ut videtur Cordo in Dioscorid.

Ibid. ad lin. 13. add.

Waspamaram Malabarorum.

Ibid. ad lin. 16.

His arboribus Panel. & Narum-panel, Hort. Malab. Part. 2. Tab. 9, & 10. Malè attribuantur à Commelino.

Ibid. post lin. 22.

ONOBRYCHIS major, Vicie foliis, spica florum ferruginea. Hanc plantam à seminibus ex Venetâ sibi missis, nutritiv in Hort. Med. e. Chelfeziano, D. Doodius, ubi & nos collegimus. An Onobrychis flagellis longissimis, Boccon. Mus. Pl. pag. 262. Tab. 129.

Fol. 269. ad lin. 26.

Onobrychis minor, siliculis echinatis, cristatis majoribus, & crassioribus aculeis præditis donata, *Morisono. Cupani Hort. Catb. 156. Polygon minus Saxatile, JB. Tom. 1. fol. 336.*

Fol. 270. ad lin. 3.

An *Hedysarum* caule hirsuto, *Mimosæ* foliis alatis, pinnis acutis minimis graminicis, *Cat. Jam. 74.* quibus verbis quid sibi velit Autor, planè non Intellego, & multum est si ipsemet seipsum intellexit.

Ibid. post lin. 9.

Onobrychis Orientalis, *Mimosæ* minoribus foliis, falcatis & dentatis siliquis exfoliorum sinu oriundis, *Neelchaddai Malabarorum*, & aliquando *Nerucheddey eorundem; Gentilibus Indis* Neerpundo nuncupatur.

Onobrychis Mariana, parvo subrotundo folio trifoliata, procumbens, summo caule ramulis floribunda.

Ibid. ad lin. 14. add. foliis mucronatis.

Onobrychis Americana trifoliata aspera; foliis magnis ferè orbiculatis, in *Terrâ Marianâ* collegit *D. Krieg.* & nobis communicavit.

Onobrychis phascolodes, floribus purpureis, siliquâ asperâ bidentatâ, & tridentatâ majori.

Onobrychis phascolodes ramosior, floribus sulphureis parvis, falcatis & dentatis siliquis, asperis. Utræque ex *Provincia Mariana.*

Onobrychis (sortè) *Asphaltites*, angustiori folio triphylla, floribus purpureis, spicatis, ex *Terrâ Marianâ.*

Ibid. post lin. 16.

Onobrychis Mariana triphylla, *Passifloræ* pentaphyllæ angustiori folio, & facie, siliculis dentatis asperis. A præcedenti plurimum diversa. Ab eodem Ornatisimo Viro *D. David Krieg.* collecta est; & nobis communicata.

Ibid. ad lin. 19.

An *Mallam Tsjalli*, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 83.* *Hedysarum* minus diphyllon, flore luteo; *Cat. Jam. 73.* Ubi Autor more suo, duo plantarum diversa admodum genera, confundere adnititur.

Ibid. ad lin. 21.

An *Nelam-Muti*, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 82.* *Ponauverrepoondoo Malabarorum.*

Ibid. post lin. 23.

Onobrychis Indiæ Orientalis monophyllos, siliculis numerosis asperis, à *D. Adaire* accepimus.

Ibid. ad lin. 31.

An *Bois de Rose. D. Rochfort. des Antilles pag. 69.* An *Verbasci* folio minore, Arbor floribus spicatis, luteis tetrapetalis, seminibus singulis, oblongis, in singulis vasculis siccis, *Cat. Jam. 139.*

Ibid. ad lin. 37.

Ad *Helleborines* Symbola, proximè accedunt.

Fol.

Fol. 270. post lin. ult.

ORCHIS palmata peramœna, Caryophylli montani floribus, margine fimbriatis, ex *Virginia*. An Orchis *Amboinensis*, floribus albis fimbriatis; Flos *Sesamæ Rumphij*, PBP. 358. An fortè Orchis montana, purpureo hilariter sanguineo punctato flore, Gallinæ alas, caudamque extensas fimbriatas, referente, *Francisc. Gupani Hort. Catb.* 158.

Fol. 271. post lin. 6.

Orchis *Virginianus* speciosus, pistillo florum in plurimas ramificationes radiato, calcaribus corniculatis.

Ibid. post lin. 26.

Orchis spiralis elatior, ex *Terrâ Marianâ*.

Ibid. post lin. 30. de novo.

Orchis Hermaphroditica, *Prom. Bon. Spei.* Anisum redolens. Quam, *Anglicè* denominare placent.

Ibid. post lin. 43.

Orchis *Virginianus* elegans, flore albo, calcaribus rectis prælongis.

Fol. 272. post lin. 2.

Orchis bifoliata humilis, ex *Terrâ Marianâ*; majori-folio, & floribus purpureis magnis.

Ibid. ad lin. 5. add.

Gratissimo odore nares perstringit.

Ibid. ad lin. 6.

Huc fortè spectat Cihioapatli Tepoztemica, *Nov. Hispania Terentii apud Rea.* 370. ur & Moloncaparli, *eiusd. apud eund. fol.* 387. Jucunda suavitare nares demulcens.

Ibid. ad lin. 11.

An Origanum lignosum *Syracusanum*, umbellâ amplissimâ, *Boccon. Mus. Plant. Tab.* 38.

Ibid. ad lin. 18.

Post *Th.* 15. add. & in *Append. fol.* 1674. At figura minus placet.

Ibid. ad lin. 19.

Origanum album *Anguillare*, *Epist.* 5. & 12. Nihilque aliud esse ait; quàm *Hyslopum Cilicium* à *Dioscoridè* descriptum. *Hyslopus Græcorum; Pr. Alpin. de plant. exot.* 257. Omni Origano odoratior, est hæc planta, & suavi acrimoniâ naribus acceptissimâ, Castoreum quodammodo redolet.

Ibid. ad lin. 26.

Arbor, finium *Regundorum*, fructu Castaneæ echinato, *JB. Tom. 1. lib. 7. cap. ult. fol.* 130.

ORNITHOGALUM majus spicatum, flore albo, *CBP.* 70. Ornithogalum spicatum, albo flore *Monspessulanum*, *JB. Tom. 2. 628.*

Ornithogalum *Neapolitanum*, *Clus. exot. part. 2. append. 2. JB. Tom. 2. 633.* Narcissus quartus *Matthioli*, quoad *Iconem*.

Fol. 272. ad lin. 28.

Oxoxacanthus Hyacinthoides capillosa, *Hernandez apud Rec.* 168. Huic nostræ hæud multum absimilis est, cui si non eadem, saltem congener judicari debet.

Ibid. ad lin. 30.

Asphodelus bulbosus Galeni; apud *Hist. Lugd. lib. 15. fol. 1589*. Huic nostro maxime convenit.

Ornithogalum spicatum, flore albo stellato, *Prem. Bon. Spei.*

Ornithogalum spicatum minus Marilandicum; si non sit *Phalangij* genus.

Ibid. post lin. 37.

Ornithogalum minus Ethiopicum, angustissimis nervosis foliis, floribus albis, spica florum brevissima, à præcedenti plurimum diversa.

Ornithogalum spicatum rubrum, nervosis foliis, caule fistuloso, ex *Tereb. Mariana*.

Ornithogalum vulgare, flore albo, *Clus. Hist. 1. Ornithogalum vulgare & verius, majus & minus, JB. Tom. 1. 630*.

Ornithogalum magnum umbellatum Goense, floribus totis albis, pericarpio splendens nigro, medium florem occupante; Hujus radices ex *Ulfssopone* missæ sunt, nullo nomine adscriptæ, quas verno tempore horto credebam, & flores proferebant insequente *Angulo*. An *Ornithogalum umbellatum maximum, CBP. 69*.

Ornithogalum Arabicum, Clus. Hist. 1. Lilium Alexandrinum, f. Ornithogalum magnum Syriacum, JB. Tom. 2. 629. Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro, Swertij Florileg.

Ornithogalum Virginianum, floribus luteis, atrâ maculâ insignitis, summo caule veluti in umbellam diffusis.

Ibid. ad lin. ult. add.

Crotalaria Malabarum.

Fol. 273. ad lin. 17.

Tota planta est pellucida, & candidissimi nitoris, in sylvis *Marianis* itidem invenitur, sed rarus.

Ibid. ad lin. 18. ad initium.

Hæc planta sane deceptus fui, nec ritè à nobis denominatur *Orobanche*; liquidem *Gentiana* est legitima, ut candidè nos monuit insignis Botanicus D. *Samuelis Dowsy*. Ad *Gentiarum* ergo classem reponi curavimus; & ei hoc nomen imposuimus; *Gentiana Virginiana*, foliis inferioribus parvis, mucronatis, summo caule amplioribus, subrotundis, venosis, ad flores suos convolutis.

Ibid. post lin. 19.

OROBANCHE Species *Ethiopica*, ex *Prem. Bon. Spei.*

Fol. 274. post lin. 12.

OROBUS *Virginianus*, foliis salva sanguine tinctis, foliorum nervo in spinulam abeunte.

Ibid. post lin. 15.

Orobis Syriacus hirsutus, magno flore *Morison*; *Hist. 98. Astragalus Syriacus hirsutus, CBP. 351. Astragalus Syriacus Lobelio Hist. Lugd. 1348*.

Fol. 274. post lin. 15.

Orobis (fortè) Scelopendrix foliis tomentosis, ex *Aleppo*. Sub titulo Pseudo-Lonchitis accepta fuit; & fortè tantum præcedentis varietas.

Orobis Sylvaticus & Boeticus, lanuginosus, radice amplissima. *Morison*. Astragalus Boeticus, *Clus. Hist. & Cur. Poster.* Astragalus Boeticus lanuginosus, radice amplissima, CBP.

Ibid. ad lin. 17.

An Trifolium Busambarense minus; spica oblonga, elegantè purpureo-rubro flore cochleariformi, *Hort. Cathol.*

Ibid. ad lin. antepenult.

Aliam videtur sub eodem nomine describere herbam *Franciscus Hernandez* apud *Rees. fol. 306.* iisdem tamen viribus, ad vulnera sananda prælitam.

Ibid. post lin. antepenult.

OXYs corniculata minima villosa, ex *Terga Marianà*. Hæc reverè est Herba Joannis Infantis *Monard.*

P

Fol. 275. ad lin. 3.

Poonacai Malabarorum, magnum est ad Venerem Incentivum.

Ibid. ad lin. 7.

Hujus fructus petasoides, est bacca capsularis trilocos.

Ibid. ad lin. 26.

Hallucinatum fuisse *Sloani* in *Cat. suo Jamaic.* conjicio, dum hanc Arborem, quæ nucem prægrandem lacteo succo turgentem profert, cujus nuclei cavitas continet aquæ suavissimæ pintam *Hollandicam*, aut amplius, inter Arbores fructu sioco disponit, tam egregius fuit Ille diribitor Exoticarum, ut à cæteris suis sortis, viz. Palmis nuciferis, nobilissimam Arborem sejungere mallet, quam Aridarum Classi huic non dare Primatum, Iis autem Palmis vel mediocriter in arte Botanica versato, annumerari debere apparet, quarum nux tegumento exteriori crasso, & carnoso, undique obducitur, & includitur; à reliquis hujus generis abundè distinguitur, tum fructus magnitudine, tum exterioris ejus corticis crassitie, duritieque.

Ibid. ad lin. 30.

Post. 361. add. Cujus fructus à *Sinenfibus* Pin lām, & ejus exterior cortex live integumentum Tá sō pī, ab iisdem nuncupatur, *Cleyer. de Medic. Simpl. Chines.* usitat. pag. 45.

Ibid. ad lin. 34.

Post 75. add, Columnia arbor Principis *Cassij*, *Fab. Column. Not. in Rees. fol. 869.* Pauckmarum Malabarorum.

Fol. 275. ad lin. 35. add.

Pauckmarum Malabarorum. fructu turbinato.

PALMA Arcifera fructu compresso non turbinato; Nuci moschatæ, & Fauſol ſimilis nucleus, JB. Tom. 1. fol. 392.

Fol. 276. ad lin. 9.

Item Arbor farinifera, JB. Tom. 1. lib. 4. fol. 504.

Ibid. ad lin. 16.

An Libby arbor ab Indigenis *Infula Mindanao* dicta, *Dampier Circumnavig.* pag. 310. Palma altissima non spinosa, fructu pruniformi minore, racemoso, sparſo, Cat. Jam. 176. Item Palma non spinosa humilis, fructu racemoso, pruniformi minimo, Piſi magnitudine, *ejusd.* 177. Arbor farinifera *Ternatensium*, *Roberti Lovel. Enchirid. Bot.* 517.

Ibid. ad lin. 23. add.

Aumanamaram Malabarorum.

Ibid. post lin. 28.

Palma Polygonati angustis, longioribus foliis, pediculis spinosis, ex *Infula Johanna*

An *Palma Brasiliensis* parva, foliis Polygonati longioribus, magis spinosis, truncato spinosissimo, *Breyn. Prodr.* 2. 81. An *Palma spinosa* minor, caudice gracili, fructu pruniformi minimo, rubro, Cat. Jam. 178.

Ibid. ad lin. 32.

Palma prunifera humilis, non spinosa, *Infula Hispaniola*, fructu Jujubino similis, officulo triangulo, *Hort. Med. Amstelod. cum Icone.*

Ibid. ad lin. 37.

Perrepanchedde Malabarorum. Ex quo *Almagestum* nostrum edidimus, certiores reddimur de hujus arboris fructu, qui ad speciem *Rotang* spectare videtur; Nihilominus ad *Palmarum* nuciferarum genus, quam *Arundineum*, hanc arborem magis accedere censemus & ab *Arundine* nucifera *Rotang* dicta *Pisonis*, *Mantiff. Aromat.* 188. maxime diversam habemus; quanquam à similitudine hujus fructus, licet multo minoris, cum illo *Rotang* dicto, *Rotang* etiam nominari meruisse videatur; dicaturque *Palma nucifera* s. *Phœnico-Scorpiuros spinosa*, fructu parvo, *Rotang* instar tessulato. An forte *Arundo Indica*, arborea, maxima, cortice spinoso, D. *Hermans in Mss.* ubi additur quod *Cingalensibus* vocatur *Nayhas*, (i. e.) Arbor febrilis, quia febre corripiuntur ij, qui se lavant ex aquis, in quas arboris hujus folia deciderunt.

Ibid. ad lin. penult.

Post 369. add. An *Palma Ady*, *Infula Sancti Thomæ*, & fructus *Abanga*, & *Caryoccs* *ejusd.* JB. Tom. 1. 386. *Palma* foliorum pediculis spinosis, fructu pruniformi luteo, oleoso, Cat. Jam. 174. Veremur autem hoc in loco, hujus Catalogi Autorem, de incognitis sibi scripsisse, quasdam inter se Arbores planè distinctas confudisse, aut saltem aliqua intempestivè reperuisse.

Fol. 277. ad lin. 11.

Palma tota spinosa major, fructu pruniformi, Cat. Jam. 177. Item *Palma spinosa minor*, fructu pruniformi, *ejusd. ibid.* An *Quauh-Coyolli*, *Nov. Hisp. T. Terentij apud Rec.* 401.

Fol. 277. ad lin. 13.

Hujus fructus Nucis Juglandis magnitudine, tribus foraminibus ad extremum caput insignitus, Cercopithecae faciem aliquomodo exprimit, & ni fallor idem est, quem sub titulo Nucis Indicae velut larvam ostendentis, & alterius ei similis, si non eadem describit & depingit *Johann. Bauhinus*, Tom. 1. 387. ex *Angola* allatus est, & à nostratibus *Senkenberg*, ibi dictus. An Palma non spinosa humillima, *Cat. Jam.* 177. Quod observatu dignum fuit, intra medullam albicantem, ad sedem fructus in medio, oculus rotundiolus conspicitur, hic germen est prolificum, quod radicum fibras per foramina corticis exterioris edit, & in terram demittit, per quas alimentum, suae naturae conveniens, attrahat.

Ibid. ad lin. 28.

An Palma non spinosa, foliis minoribus, fructu pruniformi minimo, *Cat. Jam.* 177.

Ibid. ad lin. 30.

Palma *Brasiliensis* prunifera, folio plicatili, s. flabelliformi, caudice squammato, *Raij. Cat. Jam.* 178.

Ibid. ad lin. 36.

An *Melapolange Ludovic. Barthemæ* rerum Indicarum, lib. 2. cap. 24.

Ibid. ad lin. ult.

Post *Pag. 1.* An potius *Kaida Taddi ejusd. Hort. Malab. Part. 2. fig. 6. fol. 3.*

Fol. 278. ad lin. 6.

An Arbor *Manicongo* nucifera, *ejusd. JB. Tom. 1. 385.*

Ibid. ad lin. 8.

Post vocem recto add. *Vid. Phytogr. Tab. 323. fig. 3.*

Ibid. ad lin. 20.

Post *Barbadens. add. Vid. Phytogr. Tab. 324. fig. 4.*

Ibid. ad lin. 24.

Add. *Phytogr. Tab. 323. fig. 5.*

Fol. 278. post lin. 29.

PANACIS carpimos folio triphyllis, nervo medio transcurrentibus venis ad intervalla constricto, ex *Insula Johanna.*

Ibid. post lin. 31.

PANICUM Indicum, spica longa gracili, Cujus granis pascuntur Aves Indigenae; Tenne Malabarorum.

Fol. 279. ad lin. 31.

Querendum proponit *Cl. Rayus*. An hæc sit cujus meminit *D. Whéler* circa *Trogam* à se observata, flore nigro in fundo, superius rubro, paulatim in auream languente circa margines; hanc etiam ex *Insula Cypriorum*, & ad Territorium circa *Alexandriam* collectam, nos aliquando accepimus; & nonnisi Varietatem præcedentis habemus.

Fol. 280. ad lin. 18.

Trifolium siliquosum corniculatum, flore albo, tetrapetalo ephemero, cristæ pavonis æmulo, *D. Claßi. Paul. Amann. Charact. Plantar. 375.*

Fol. 280. ad lin. 24.

Naiwalle Malabarorum.

Ibid. ad lin. 30.

Vouffcheauchedde Malabarorum.

Ibid. ad lin. 33.

Kankapondoo Malabarorum.

Ibid. ad lin. 36.

Hujus flos est dipetalos. An forte Tlotchipallin *Hexotzincensis*, *Hernandez* apud *Rocci* 253.

Fol. 281. ad lin. 16.

Post vocem *communicatum*, add. sub *Thlaspedis* cujusdam speciei, à *Bobarto* fuit transmissa.

Ibid. post lin. 28.

PASSERINÆ minoris folio, Polygoni facie, planta *Mariana*, summo caule ramosissima.

Passerinæ foliis Planta *Æthiopica*, summis caulibus flore albo parvo singulari.

Fol. 282. ad lin. 9.

Balsamina altera *Indica* repens, *Hederæ* arboreæ foliis, flore subviridi, *Ambrosii*. *Phytolog.* 91. Flos *Passionis* minor, folio in tres lacinias non serratas, minus profundas diviso, *Cat. Jam.* 104. *Clematidis fusca*, flore minimo pallido, *Plumier.* fol. 73. fig. 88.

Ibid. ad lin. 22.

Flos *Passionis* minor, folio in tres lacinias non serratas profundius diviso, flore litreo, *Cat. Jam.* 134. A *Clematide* tamen *Indica*, folio *hederaceo* majore, fructu *Olivæformi*, *Plumier*, quam pro Synonymo indubitanter ponit *Sloanus*, plurimum est diverfa; Enimvero sane, ut quod res est fateamur liberè, Existimamus cum non intellexisse quid commentaretur, alioquin *diversarum plantarum Nomina*, non tam sædè confudisset.

Ibid. ad lin. 26.

Post vocem *Passiflora* add. *Scaphoides* L. foliis *Naviformibus* umbilicatis, *Americana*.

Ibid. ad lin. 28.

An Flos *Passionis* perfoliatus, sive *Periclymeni* perfoliati folio, *Cat. Jam.* 104.

PASSIFLORA *Americana*, flore suaverubente, folio bicorni. *Clematidis Indica*, flore clavato suaverubente, fructu hexagono coccineo, folio bicorni, *Plumier.* fol. 68. Flos *Passionis*, folij mediâ lacinia quasi abscissa, flore mino carneo, *Cat. Jam.* 104.

Ibid. ad lin. 33.

An *Clematidis Americana*, *Digitalis* flore, siliquosa, monophyllos major, *PBP.*

Ibid. ad lin. 36.

An *Clematidis Americana*, *Digitalis* flore, siliquosa, monophyllos, minor, *PBP.* 394. Flos *Passionis* *Guaianas* folio, *Hort. Leydenf.*

Fol. 283. ad lin. 26.

Et in Hort. Malab. Part. 11. Tab. 49. Huic fortè referri debet Ixtac Coantnepilis, s. Volubilis diuretica, Hernandez apud Recc. 119.

Ibid. post lin. 23.

PASTINACA sylvestris hirsuta, echinago fructu, CBP. 151. Daucus *λαός-ουλος* (i. e.) hirsuto caule, Thaly. Hanc. pag. 36. Pastinaca sylvestris angustifolia hirsuta, radice foris & intus atropurpurea, ex Smyrniā; fortè Pastinaca sylvestr. Hispanica, angustifolia hirsuta, s. Tragoselini foliis, & facie Brey. Prodr. 2. 82. Pastinaca Lusitanica, Tragoselini facie, RBP. append. in Horto D. Samuelis Reynardsoni Exoticarum plantar. instructissimo, ex seminibus è Smyrnia allatis, eputritam observavimus.

Ibid. post lin. 30.

PEDICULARIS Mariana Agorati angustis serratis foliis, singulis serris minus denticularis; floribus exalbidis amplis, in oblongam spicam, summo caule confertim nascentibus. Huic proximè accedit Pedicularis major Alpina, Hist. Lugd. 1138. Item Oenantha, sive Filipendula altera montana, Pene ejusd. 784. Alektorolophos Alpina, Clusij Hist. 2. fol. 210. Filipendula montana major al-bida, Park. Theatr. Pl. 436.

Ibid. ad lin. ult.

Huic & conspecies est Corosinam, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 69. Pedicularis Virginiana, Lyfimachia purpurea lanuginosa, subrotundis foliis, nervosis, flore oblongo purpureo, calyce altera parte altius elongato, & plurifariam dissecto.

Fol. 284. ad lin. 15.

Huic fortè spectat Arenxibunt, Nov. Hispan. Tarentij apud Recc. 355.

Ibid. ad lin. 22.

An Heptaphyllum alpinum, trifoliatum, Sabaudum, Recc. Mus. Plant. Tab. 9.

Ibid. ad lin. 26.

Caryophyllata montana Patachampi, Hist. Lugd. lib. 5. fol. 686.

Fol. 285. post lin. 33.

PENTAPHYLLUM Virginianum minus, villosum, flore parvo luteo, pallescente.

Fol. 287. post lin. 17.

PERICLYMENUM surrectum, laurinis foliis, cujus cortex, ad rubrum colorem inficiendum Tandaribus inservit, India Orientalis. Noonachedde Malabarorum.

Ibid. ad lin. 27.

De hujus Propia fortè est Chichihualtzechitl, Nova Hispan. Tarentij. apud Recc. 165. Et nuncupari potest, Periclymenum herbaceum Mexicanum, foliis amplis Geranij divisuris, longis petiolis insidentibus. Cui & plurimum convenit Hezmaytl, Nov. Hispan. ejusd. Recc. fol. 377. ut nos dijudicare licet.

Ibid. post lin. 27.

Periclymeno herbaceo quæ sub Deltoris Linhet nomine apud Virginenses nostrates passim celebratur, haud multum impar, planta Mariana, teretiore folio, flore albo parvo, ex alis foliorum unico.

Fol. 287. post lin. 29.

Periclymenum rectum, *Lythamachia lutea* folio & facie, ex *Insula Johanna*.*Ibid.* ad lin. 30.Post vocem *fructu* add. rubro & nigro.

Fol. 288. post lin. 4.

Periclymenum Indicum elatius, cuspidato folio majori, glabro. *Padavera*, *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 27. fol. 51.**Ibid.* ad lin. 27.*Persicaria Nerij* folio procumbens, floribus candido purpurantibus, *Cupani Hort. Carb. 166.**Ibid.* post lin. 33.**PERSICARIÆ** affinis *Virginiana*, foliis parvis pallescentibus, spica alba compactiore, brevi. An rectius sit de *Blitorum* genere.*Persicaria* similis. Planta aquatica, *Ind. Orientalis*, floribus summo caule in caputulum oblongum glomeratis; capsulis foliaceis; *Nonducallacree Malabarorum*.Hæc planta *Indigenæ* pro cibo utuntur. Huic forte *Pongati*, *Hort. Malab. Part. 11. Tab. 24.* accenseri meretur.

Fol. 289. post lin. 6.

PHALANGIUM *Liliflorum*, *Africanum*, maximum, floribus albis, prælongis tubulis donatum.*Phalangium minus Liliflorum*, floribus aureis, *Prom. Bon. Spec.**Ibid.* post lin. 10.*Phalangium Africanum*, ramosius, floribus albis, *Promontorij Bon. Spec.**Phalangium Æthiopicum* ramosissimum, caule fistuloso glabro, floribus albis lineis fuscis externe striatis. An *Phalangium ramosum Africanum*, floribus albis, fuscis lineis insipitis, *PBP. 363.* *Phalangium* forte *Æthiopicum*, ramosissimum, *Hort. Amstelodam. cum Leone.**Phalangium* (forte) *Æthiopicum*, ramosissimum, caule fistuloso fungoso, & hirsutie ferrugineâ villosa, floribus amœnè purpureis. *Orobanche* similis *Æthiopica*, ramoso caule, floribus amœnè purpureis. *Epidendron* (forte) *Æthiopicum*.*Phalangium Africanum* ramosum, floribus purpureis, florum petalis reflexis.*Ibid.* post lin. 14.*Phalangium Marianum*, non ramosum, flore albo minimo, stribus viridibus, spica longa gracili. Idem (forte) cum præcedente in *Almagesto*.*Ibid.* post lin. 22.**PHAODENDROS** sive *Arbor Ind. Orient. tædifera*. *Cochin* nostratibus dicta. Ex hujus enim ramulis, *Tædæ* & *Faces* parantur, quæ semel accensa, Viatoribus iter nocte suscipientibus, optimum lumen præbent. *Nicoone Malabarorum*. *Santali* citrini speciei alteri, haud multum impar.

Fol. 290. post lin. 10.

PHASCOLUS *Indicus*, siliquâ *Fœnugraci*. *Turkeyau verreckaichedee Malabarorum*.

Fol.

Fol. 290. ad lin. 12.

Phaseolus Indicus hirsutus, flore luteo, siliqua angusta, parva, hispida, *Breyn. Prodr. 1. 82.*

Ibid. post lin. 15.

Phaseolus Indicus minor, *Lathyr* siliquis pubescentibus, fructu parvo, subfusco.

Ibid. post lin. 17.

Phaseolus Indicus, flore flavo, caule, & siliqua tereti, pilis rarioribus obsitis. *Karu-Ulinu, Hort. Malab. Part. 8. Tab. 50.*

Ibid. ad lin. 18.

Post Americanus lege Biapmax m. sive.

Ibid. ad lin. 20.

An forte hæc sit Herba à *Milicibus* ad Civitatem *Philippi* evulsa, & gustata, eos propè ad furorem, & insaniam redegit, qui tamen affectus paulo post minor redditur, *CBP. 166. ex Part. 9. Ind. Orient. addit (querens demum) Quid sit?*

Ibid. ad lin. 26.

Surrupieria Malabarorum.

Ibid. ad lin. 35.

Phaseolus Indicus *Lotoides*, sive *Loto* affinis vesicaria, triphylla *Indica*: Aut *Melilocus vesicaria Indica* in *Jora*.

Ibid. post lin. 39.

Phaseolus parvus spicatus, divaricato caule, folio subrotundo, glabro, ex *Terrâ Mariana.*

Ibid. ad lin. ult.

Coodeoeræ Malabarorum. Radicem habet tuberosam.

Fol. 291. ad lin. 2.

Phaseolodes Americanum *Angulor*, pediculis angulosis, striatis, ex radicibus variè intortis, sursum rigentibus, folliculum sub terrâ condens. Junsa (forte) planta quæ in *Angra* instar *Frumenti* seritur, ad cujus radices grana rotunda, Pisi magnitudine, Pistachiorum sapore; *Linsebot. Part. 8. Ind. Orient. cap. 6. CBP. 346*; (nisi hæc potiori jure sit *Arachidna Indica* utriusque, tetraphylla, quæ sub titulo *Senæ tetraphyllæ*, &c. nostro *Almagesto* fol. 371. exhibetur.) An *Pisa Indica*, foliis longiusculis, *JB. Tam. 2. 301.* Legumen trifolium, sub terrâ fructum edens, *Raij. Hist. Plantar. 919.*

Ibid. post lin. 2.

Phaseolodes Mariana procumbens, angustiori folio triphyllis, flore gemello.

Ibid. ad lin. 38.

Siliqua longâ, fimbriis quadripinnatis ornata: forte *Tetragonolobo Loto* simili s, Siliqua peregrina, *JB. Tam. 2. lib. 17. fol. 359.*

Fol. 292. ad lin. 6.

Hæc est reverâ *Katabaramareca*, *Hort. Malab.* & quæ proximè subsequitur in *Almagesto*, est *Karu-tsjandi*, ejusd. *Hort. Malab. Part. 8. Tab. 43.*

Ibid. ad lin. 8.

Mooelle Malabarorum. Radicem habet tuberosam rotundam.

Fol. 292. ad lin. 12.

An Orobis Phascolodes *Americanus*, folio anguloso, subtus hirsuto, P&P. 359. Ar noster est omnino glaber.

Ibid. ad lin. 23.

Phascolus maximus, filiqua ensiformi, nervis insignita, & semine albo, membranula inclusa, Cat. Jam. 68. Ubi varia miscentur nomina, & inter se valde discrepantia.

Ibid. ad lin. 40.

Phascolus *Brasilensis* frutescens, lobis villosis pungentibus, maximus *Hermannii*, Cat. Jam. 68. Ubi plurima, specie admodum diversa, plantæ confunduntur.

Fol. 297. ad lin. 15.

Comunda contra *Marcey*, fol. 62. An *Vavate Phacusa* *Descript. Madagasc.* 118. Laburnum humilis, filiqua inter grana & grana juncta, serone eculento, Cat. Jam. 139. Arbor fabifera trifolia, Salvie foliis, Bonibus luteis elegantissimis, *Hort. Bosani*. A similitudine, forte hujus plantæ cum *Tangaraca prima Brasilensis* *Pison*. in trifoliatura foliorum, hæc quoque à *Lusitanis Orientalibus*, *Tangaraca* nuncupatur.

Ibid. post lin. 21.

Phascolus *Americanus*, incanis foliis, caule Geniste anguloso, filiquis lentiformibus, dispersis, ex *Terra Mariana*.

Ibid. ad lin. 34.

An Arbor *Coralli Americana*, semine oblongiori & tenuiore rubicundissimo, minus spinosa, foliis lætè viridantibus, *Breyn. Prodr.* 2. 19.

Ibid. ad lin. 35.

Pro tenuiore lege graciliore.

Fol. 294. ad lin. 21.

An Arbori *Corali* affinis, non spinosa, fraxini folio rotundior, foliis & ramulis pubescentibus, Cat. Jam. 244. Ubi movetur dubium, an sit *Quinquina* d. *Ox-melia*, pag. 72.

Phascolis accedens, Arbor pæcipua, Coral dicta polyphylla, non spinosa, orbiculatis lætè foliis amplexibus, sericea hirsute villosis; à *Rachaden* *Rhis* *Cuponi*, *Engelm.* *C.*, nuncupatur, atque ob pisces necandi, aut vendendi vim, *Synonym.* dici mereatur. An forte Coral arbor polyphylla non spinosa, fraxini folio, filiqua alis foliaceis extantibus, vote molendinariae fluvialis, vel seminum *Synonym.* *inter* *amela*, Cat. Jam. 143. Ubi Arbor nonnulla inominata recita in *Orsellana* pisces soporans *Juston. Dendrograph.* 467. sumitur pro *Synonym.*

Fol. 294. ad lin. 19.

An forte *Caxumba* in *Bantam*, Flores quo in cibis condiendis, & vestibus gossypinis tingendis adhibetur, *P&P. 3. Ind. Ornam.* 7. *CBP.* 37. *Vellem* *Ornam.* *Vel-*

Fol. 294. ad lin. 27.

Pæonia *Indica*, male tribuitur *Indica* *Alpin.* *Hort. Oxon.* 72. Phascolus *Glycyrrhizis* folio alato, piseo coccineo atrâ maculâ notato, Cat. Jam. 70. Cujus Antor

ut in Arte doctior sibi videretur, dubium movet, An sit eadem illi quæ in *Almag. nostro* proximè subsequitur; Cum tamen ex *Iconibus*, vel ipsis nudis Nominibus edificeret, Plantarum esse duo diversâ admodum genera.

Fol. 194. ad lin. 31.

An *Cococpalis acarlensis*, *Glycyrrhiza annula*, *Hernandez. apud Recc. fol. 241. L'Bois de Coral D. Rochfort: Histoire des Antilles 92.*

Ibid. ad lin. 41.

Post 265. add. *Oxyacanthæ colore fructus peregrinus durus, ejusd. JB. Tom. 2. Part. 2. 425.*

Ibid. ad lin. 43.

Fructus peregrinus decimus *Mates* nomine, *Clusij exot. lib. 2. cap. 30.*

Fol. 295. ad lin. 4.

Tandemaram *Malabarorum*. Cujus filiquæ sunt magnæ, & diversimodè tor-
tuosæ.

Fol. 296. ad lin. 9.

Veronica frutesca, surrecta, dulcis, hexangulati caule, florè dilute cæruleo.
Cur. Jam. 81. Item *Veronica hexangulati caule*, foliis *Satureiæ* ternis, serratis, *ejusd. ibid.* Hanc autem non esse de *Veronicarum* Sorte, ex ænigmati didicimus. An hujus farinae sit *Tzonpetic-Xihuict Mexic. s. Nectarea*, *Hernandez apud Recc. 240.* inquirendum propono.

Ibid. ad lin. 11.

An *Pilosella major* non repens, monoflora, in *Montibus Nebridibus*, copiose luxurians, *Cupani. Cat. Hort. Catholic. 167.*

Ibid. post lin. 15.

PIMPINELLA auriculata, *Sabunda*, rigida, *Boccon. Mus. Plantar. Tab. 9.*

Ibid. ad lin. 33.

Cucullata quibusdam, *Crias Apaleij, Hist. Lugd. lib. 10. fol. 1206.* *Pinguicula* vel *ῥορυγερ* *Viola humida*, aut palustris *Dodecatheon*, *Plinij, Gesneri, Camerarij Hort. Med. 125.*

Fol. 297. ad lin. 20.

Molago-Codi, *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 12.*

Ibid. ad lin. 22.

Post 412. add. *Piper abortivum, ejusd.* Item *Piper racemosum caudatum*, ex *Guinea, ejusd. CBP. ibid.* *Piper abortivum Brasma, JB. Tom. 2. 184.* Item *Piper caudatum, ejusd. JB. ibid. 185.* An *Cattu-Molago, Hort. Malab. Part. 7. Tab. 13.*

Ibid. post lin. 13.

PIPER LONGUM *Oriente*, foliis amplioribus quinquenerviis, petiolis oblongis insidentibus. *Cattu-tirpalli, Hort. Malab. Part. 7. Tab. 14.*

Ibid. ad lin. 28.

Sipplelee Malabarorum, hoc est *Piper nigrum* præstantissimum.

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum arboreum altius, folio nervoso minori, spica graciliori & brevior, *Cur. Jam. 44.* Item *Piper longum*, folio nervoso, pallide viridi, humilius, *ejusd.*

ejusd. Ibid. Item Piper longum folio nervoso, latiori, & tenuiori, atroviridi, *Cat. Jam.* 45.

Fol. 297. *post lin.* 28.

Piper *Ethiopicum* filiquosum, *JB. Tem.* 2. *fol.* 187. Siliquæ nigræ quas pro Carpesio *Paulus Hestius* ad *Matthiolum* misit Piper oblongum nigrum, *CBP.* 412. *Habzeli*, & Piper *Nigritarum*, *Serapioni*. Piper *Antropophagorum*. *Hieronym. Cardani. de rer. varjet.* 108.

Fol. 298. *ad lin.* 17.

Opuntioïdes tetragonium baccatum, capreolis gaudens, *Epidendron*. An *Viscum Opuntioïdes*, ramulis compressis, *Cat. Jam.* 168.

PLANTA *Indiana*, *Dictamni Cretici* foliis, capsularis, floribus in verticillas sitis. *Carvathackerce Malabarorum*.

Planta *Convolvulacea* baccifera, *Aristolochiæ* foliis, radice tuberosa, *Cheede Malabarorum*. Hujus foliorum & caulium Chymico more Extractum, ardorem *Urinæ* tollit, & *Gonorrhææ* medetur, attamen *Secessum* non mover.

Planta *Mariana*, *Solidaginis* foliis mucronatis, ex adverso binis, floribus in spicam racemosis, ex purpureo colore, *Lilach æmulis*.

Ibid. post lin. 17.

Eadem *Carolinensis*, latioribus *Melissæ Romanæ* foliis, *Lilach nostratibus* dicta.

Ibid. ad lin. 30.

Plantago alpina, folio nigricante, *Bocc. Mus. Plant. rarior. Tab.* 5.

Ibid. post lin. 37.

PLANTAGO *Lagopoides* quinquenervia, caulescens. Hanc in *Hort. Medicin. Chelspana*, auspiciis *D. Decodii*, ex seminibus sibi à *Parisiâ* transmissis, enutritam conspeximus Anno 1698.

Ibid. post lin. 40.

Plantago myosotis Marilandica, spicâ rarâ *D. Krieg.*

Ibid. post lin. 42.

Plantago omnium minima, hirsutis foliis *Marilandica*, spicâ compactâ brevi.

Fol. 299. *post lin.* 19.

Plantago montana *Holosteum* dicta, *Leontopodium Cretense*, sive *Catananæ Cortusi*, *Clus. Hist. Pl.* 3. 113. *Holosteum* I. *Leontopodium Creticum*, *CBP.* 190.

Ibid. post lin. 38.

Plantaginellæ auræ *Alopecuroidi Brasiliæ* similis, *Zeylanica*, *Breyer. Prodr.* 2. 84. An rectius sunt alicujus *Graminis Indici* capitula, quæ in penu nostro cum suis pediculis ex eodem loco nobis adjecta, invenienda sunt.

Ibid. ad lin. 42.

Hæc quoque spectare videtur *Plantaginis aquaticæ* folio *Anomala*, flore tripetalo purpureo, semine pulverulento, *Cat. Jam.* 76. Simul ac *Nymphææ* affinis palustris, *Plantaginis aquaticæ* folio, flore hexapetalo stellari cæruleo, *Cat. Jam.* 121.

Plantaginis aquaticæ quodammodo accedens, foliorum auriculis amplioribus retusis, floribus cæruleis *Hyacinthi* spicatis. In *Provincia nostra Mariana* apud *Americanos*, collegit laudatus vir *D. Krieg.* & nobis impertivit.

Fol.

Fol. 300. post lin. 3.

PLATANUS *Orientalis & Occidentalis* mediam faciem obtinens, *Americana*, globulis grandioribus, foliis splendentibus atris.

Ibid. ad lin. 5.

An *Anonyma decima Hernandez* apud *Recc.* 353. Fortè etiam *Chilmecatl*, seu *Ycha*, *Nov. Hispan. Hernandez* apud *Recc.* fol. 140. An *Dentellaria Lychnioides*, *Sylvatica*, scandens, flore albo, *Car. Jam.* 91.

Ibid. ad lin. 7.

Huic Arbori *Beenel*, *Hort. Malab. Part. 5. Tab. 4.* proximè accedere videtur, aut potiùs *Sundari*, *ejusd. Hort. Malab. Part. 5. Tab. 40.*

Ibid. post lin. 21.

POLIUM *Hispanicum* angustifolium, flore vario *Turnesfortij*, ab *Ornatiss. viro D. D. Preston* accepimus.

Ibid. post lin. 23.

POLIUM tomentosum *Chamaedryoides*, *Monomotapense*, floribus purpureis.

Ibid. ad lin. 27.

An **POLIUM** *Rorismarini* foliis, quorum comæ nequaquam canescunt, *Turnesfortij* *Epist. ad Sberard.* 14. In regni *Granatensis* maritimis, invenit hoc genus *Turnesfortius*.

Ibid. ad lin. 29.

Polygala foliis lanceolatis, brevibus, *Bocc. Mus. Plant. pag. 141. Tab. 99.*

Ibid. post lin. 33.

POLYGALA *Mariana*, angustiori folio, flore purpureo.

Ibid. ad lin. penult.

An **Coztic-Xihuic Mexicensesum**, *Hernandez* apud *Recc.* 303.

Ibid. post lin. ult.

Polygala *Aethiopica*, angustis hirsutis foliis, floribus obsoletè purpureis.

Polygala *Aethiopica*, angusto folio glabro, flore obsoleto.

Polygala *Aethiopica*, strictissimis glabris foliis, flore phœniceo.

Polygala arborea, *Myrtilli* subrotundis foliis, fructu magno *Tordylii*, *Prem. Bon. Sp.* An *Chamaemyrsine* quorundam *Dalechampi*, *Hist. Lugd.* 175. Sic hujus loci inquirendum propono.

Fol. 301. ad lin. 2.

Nostræ tamen caput, in globum ferè compactum est. An **Polygala** lutea, *CBP.* 215. *Onobrychis* quarta lutea *Dalechampi*, *Hist. Lugd.* 491. *Chilpatli* (fortè) *Nov. Hispan. Terentij* apud *Recc.* 367. An **Leucoium** luteum, sive *Keiri* minimum, **Polygalæ** facie, *Car. Jam.* 97.

Ibid. post lin. 5.

Polygala *Mariana*, quadrifolia, minor, spicæ parvæ albicante, à *Doctore Krieg.* accepimus.

Ibid. ad lin. 12.

An **Genista** affinis, *Anonyma* arbor flore *Colutæ*, *Buxifolio*, *Car. Jam.* 141.

Ibid. post lin. 17.

POLYGONATUM minus angustifolium, ramosum, flore ad geniculum singulari, longo, gracili pendente, *Virginianum*.

Fol. 302. post lin. 6.

POLYGONUM lignosum Boeticum, flore albo, apicibus petalorum croceis.
Polygonum Orientale, parvis & creberrimis foliis, humum flemens. Nechemi-
 poondoo Malabarorum. Longè lateque se diffundit super terram.

Ibid. ad lin. 23.

An Hernaria lucida aquatica, Car. Jam. 50.

Polygonum Serpylli foliis, ex adverso binis, ex Insula Palmâ, sericeâ comâ candi-
 cante. Idem fortè Cruciatæ Marinæ simili Plantæ Indiæ Orientalis. Phytograph.
 Tab. 277. fig. 3. & nostr. Almagest. fol. 122. pl. penult.

Ibid. ad lin. 20.

Fortè **Polygonum montanum**, niveum, roseum minus, compactionibus foliis,
 Boccon. Mus. Pl. rar. Tab. 7.

Ibid. post lin. 20.

Polygonum ex Insula Palmâ, Serpylli foliis ad genicula confertis, argenteâ comâ
 paleaceâ.

Polygonum sericeum Thymi angustioribus foliis, ad genicula binis, ex India
 Orientali.

Polygonum sericeum ramosius Indicum, foliolis Galli instar caulem cingentibus.
 Chaipoondoo Malabarorum. Amaranthus foliis acutis incanis, Molluginis fa-
 cie Zeylanica, Boccon. Mus. Pl. pag. 44. Tab. 39. Sed de his duabus novissime
 recentibus plantulis, plura vid. sub alieno titulo Almagesti nostri fol. 134. plant.
 9. & 10.

Ibid. ad lin. 32.

An **Rubecola minima alba**, HRB. Hoc etiam minus aptè nominatur, Sedum mi-
 nimus muscosum, tenuissimo folio rubens, apud Hort. Cathol. Francisc. Cupani.

Ibid. post lin. 34.

Polygonum Selinoides, Sedi minimi foliis, ex Prom. Bon. Spei. An forsitan rectius
 Valerianella polycarpus, Sedi minimi foliis Aethiopica.

Polygonum Selinoides, Spargula folio Indianum. Pulandee Malabarorum.

Ibid. ad lin. penult.

Alchimilla gramineo folio, majori flore, Raij. Turnesortii Elem. Bot. 409.

Fol. 303. ad lin. 9.

Fortè **Osteocollam Hiero-lu**, & **Abssyri**, Hist. Lugd. lib. 10. fol. 1205.

Ibid. ad lin. 32.

Portulaca Curassavica procumbens, folio subrotando, PBP. append.

Ibid. ad lin. 34.

Hort. Part. add. 10. Ibid. ad lin. 38. **Nonochto Nova Hispan.** Terentij apud
 Recr. fol. 392.

Ibid. ad lin. 42.

Portulaca erecta, Sedi minoris facie, capitulo tomentoso, Car. Jam. 88.

Fol. 304. ad lin. 2.

Camponga Brasiliensis secunda Pisonis fol. 243. **Herba innominata**, caule Por-
 tulacæ; Marogr. 399.

Fol. 304. ad lin. 4.

Malus Americana spinosa, *Portulaca* folio, fructu folioso, semine reniformi splendente, *Hort. Medic. Amstelod.* Ubi habetur *Icon* ad Arboris proceritatem satis fastuosa, sed perperam. *Portulaca* spinosa, lanuginosa, arborescens, *Americana*, *Catol. Plant. Paradis. Batav. Calci adnex.*

PORTULACA forte *Indica Orientalis* coccifolia, flore flavo tetrapetalo. *Nela Tsjira, Hort. Malab. Parr. 10. Tab. 31.* Sedi folio *Indica*, flore tetrapetalo flavo colore; *Commel. ad locum.*

Ibid. ad lin. 7.

An *Portulaca* affinis, folio subrotundo, succulento, flore pentapetalo dilute purpureo, *Cat. Jam. 39.*

Ibid. ad lin. 9.

An *Blitum Polygonoides* viride, s. ex viridi & albo variegatum, polyanthos, *Cat. Jam. 48.*

Ibid. ad lin. 16.

An *Acetosa Brasiliensis* *Pisonii*, fol. 244. *Acetosa Brasiliensis*, flore dilute purpureo, *Marcgr. fol. 23.* An forte *Portulaca Curassavica*, procumbens, folio subrotundo, *PBP. append.*

Ibid. ad lin. 35.

An *Oxylapathum aquaticum*, *Hist. Lugd. fol. 603.*

POTAMOGEITON gramineum marinum, imo caule geniculatum. *Alga angustifolia Vitriariorum JB. Hist. CBP.*

Idem minus, *Fucus marinus*, I. *Alga marina*, graminea, minor, *Dalci. Raj. Synops. Stirp. Brit. pag. 7.*

Potamogeton marinum *Vitriariorum* æmulum, segmentis tubulosis. The *Spanate. Grass, Jamaicensibus* dictum, *Alga juncea*, s. *Juncus marinus* radice alba, geniculata, *Cat. Jam. 5.* *Corallina*, aut potius *Alga nodosa, Vitriariorum* æmula, segmentis tubulosis, *Almag. Bot. 119.*

Potamogeton marinum *Vitriariorum* æmulum, ad foliorum planitiem folliculaceum, & seminiferum. *Fucus* s. *Alga marina* graminea, angustifolia, seminifera ramosior, *Raj. Synops. ibid.*

Potamogeton marinum in *Utricularis* epiphyllispermon minus, *Doodij. Raj. Synops. Stirp. Brit. novissime edit. pag. 146.*

Potamogeton fluviatile, longissimo gramineo folio nostras, *Alga graminea fluviatilis longissimo folio, Turnfortii, Elem. Bot. 414.*

Fol. 305. ad lin. 9.

Ranunculus aquaticus, Millefolij folio pennato, *Cupan. Hort. Cashol. pag. 186.*

Potamogeton Indicum, foliis variis, partim integris, partim pennatis. *Yellapashca Malabarorum* (I. C.) planta aquatica. *Nir-valli-pullo, Hort. Malab. Parr. 10. Tab. 15.*

Potamogeton Indicum minus, vasis foliorum elegantissimum, pennas avium referentibus. *Necpashca Malabarorum.*

Fol. 306. ad lin. 22.

An fortè Cacaxocotl Nierenbergii, *Exotic. lib. 14. fol. 318.**Ibid. ad lin. 37.*Haud aliter ac in fructu Adamaram, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 3.* Quo signo sibi in vicem maxime assimilantur:

Fol. 307. post lin. 5.

PRUNIFERA arbor *Afratica*, Laurocerasi fructu, ossiculo pyramidali compresso, summo apice bifurco. Hujus fructus ex *Asia minore*, ad D. D. *Uvedale*, fuit transmissus.*Ibid. ad lin. 8.*Hivourae, *Lerij Descript. Brasil. cap. 12. Thevet. Singul. cap. 50.* vid. Hivourae & Ibraeae arbor, apud *Forst. Dendrograph. fol. 79.* vid. *Lact. Ind. Occid. lib. 15. cap. 9. Clus. ad Monardem, cap. 20.* Arbor Hivourae (i. e.) Res rara, nuncupata. Mala-Elengi, *Hort. Malab. Part. 5. Tab. 55.* quoad picturam à nostra, haud multum abudere videtur; Hivourae *Americana* Pruniferae, *JB. Tom. 1. fol. 200.* Icon habetur in *Phytograph. Tab. 327. fig. 5.**Ibid. ad lin. 26.*An Arbore Indiano, quae pendulo Nidi d' Uccelli *Giacom. Zanoni. Hort. Bot. 21.* Fortè Ambalam, *Hort. Malab. Part. 1. fig. 50.* Mangae affinis flore parvo stellato, nucleo majori osseo, D. Seyn. *Not. ad Hort. Malab. ubi supra.* Myrobalanus folio Fraxini alato, fructu luteo, ossiculo magno fibroso, *Cat. Jam. 181.* Item Myrobalanus minor, folio Fraxini alato, fructu purpureo, ossiculo magno fibroso, *ejusd. 182.* Idem Prunus *Brasilienfis*, fructu racemoso, ligno intus pro ossiculo, *Raj. ejusd. Cat. Jam. pag. 182.*Prunifera Arbor, foliis per siccitatem rugosis, floribus purpureis stamineis, fructu calyce eleganti coronato. Cara-Angolam (fortè) *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 26.* Tum flores, tum fructus optime conveniunt. Odingee s. Odinee *Malabarorum* Cui & proxime accedit.Prunifera Arbor *Madera Catana*, Mali *Perficæ* folis rugosis, *Almagest. Bot. 307. Phytogr. Tab. 322. fig. 2.**Ibid. ad lin. 28.*An Prunus racemosa, caudice non ramoso, alato Fraxini folio, non crenato, fructu rubro subdulci, *Cat. Jam. 184.* Si non sit eadem cum praecedentibus.*Ibid. ad lin. 33.*Post inelriat; Eandem esse Arborem nunc suspicari licet cum Mamee *Indiae Occid.* Juglandis folio vinifera, cujus ramulus depingitur in *Phytograph. nostra. Tab. 204. fig. 2.* Fortè Cat-Ambalam sive Pee-Ambalam, lingua *Bramanum*, Coduco-Ambado, *Hort. Malab. Part. 1. fol. 93.* Huic proxime accedit Courondi, *ejusd. Hort. Malab. Part. 4. Tab. 50.* Et Corundi *Zanoni. Hist. Bot. cap. 13.* Umbu (fortè *Brasilienfis*, *Pison. Hist. Nat. 167.* An fortè Capalxochoatl seu Arbor gummosa, Pruniformis, quae à *Mechuacanensibus* Pompoqua vocatur, *Hiernandez apud Recc. 82.* Sloanus profecto si *Dis* placet, de hac Arbore agit, sub nomine Myrobalani folio Fraxini alato, fructu luteo, ossiculo magno, fibroso, *Cat. Jam. 181.* Multa enim Synonymia ibi enumerat, quae planè alteri erant attribuenda; Lectorem ignarum eò ducit, ut existimet; Pruno *Americano* nostro,

Q.

Fol. 309. ad lin. 31.

POST tumentibus add. Glандe majore compresso, *The Red Oak Virginianis* nostratibus nuncupatur.

QUERCUS *Virginiana*, glande lato, compresso, calyce magno, squammis hiantibus lignosis, ornato. Hujus cognitionem humanissimo Viro, D. Jacobo Marshali, debemus.

Quercus Mariana, glande minore, locis uliginosis, gaudens, summis glandibus molli lanugine villosis.

Ibid. ad lin. 33.

Post 1916. add. Glандe grandiori.

Fol. 310. ad lin. 2.

Post 197. add. An *Quercus Virginiana* putula, Banist. in Catalog. apud Raij. Hist. Plant. An *Quercus fruticosa* ejusd. Catalog. apud eund. ibid.

Ibid. ad lin. 4.

Instar glandium Arboris Tamalapatra, apud Gerard. emac. fol. 1534. An forte *Malabathrum* & *Folium Indum Officinarium*. JB. Tom. I. lib. 4. 430.

Ibid. post lin. 6.

Quercus Mariana, Oleæ folio, glande parvo compresso, ad apiculam eleganter radiato.

QUERCINIS foliis parvis, subrotundis Arbuscula, *Angolensis*, elegantissima.

R.

Fol. 310. ad lin. 14.

AN hæc potius sit de *Pulsatillarum* genere, incertum habeo.

RANUNCULUS *Anemone nemorosa* affinis, trifolius, seu potius emacaphyllos. *Anemone trifolia*, GB. *Phytopin.* 317. Dod. lat. edit. in fol. 433. *Tavernam.* Icon. 27. *Alabastris*, s. *Dentaria alba*, D. Brancion. *Lobelij Obs.* fol. 149 & Icon. 281. Idem forte cum *Cacapatli*, *Nova Hispan. Terentij.* apud Kerr. fol. 359. Ubi pictura (ut nobis conjicere licet) nimis imperfecta exhibetur.

Fol.

Fol. 310. ad lin. 25.

Proinde & Boccon. in *Mus. Plant. rarior.* pag. 84. Hanc plantam denominat, Thlactrum Batrachioïdes minus, flore albo, *Ital.* & sub eodem nomine depinxit, *Tab. 79.*

Fol. 311. ad lin. 12.

Ranunculus surrectis cauliculis; *Ger. emac.* 951. Ranunculus dulcis, sive Batrachium salutiferum, *Tabern. Icon.* 51. Ranunculus pratensis; sive primus *Ira.*

Ibid. ad lin. 17.

Ranunculus oleraceus; *Tabern. Icon.* 52.

Fol. 312. ad lin. 7.

Ad hoc genus Plantarum, forte referri potest Yrzenimparli, sive Canis intersector, vel Hordeolum, *Hernandez apud Recc.* 307. Et nominari mereatur, Ranunculus flammeus *Novi Orbis*, lanceatis foliis, seminibus in spicam prælongam adactis.

Fol. 314. ad lin. 14.

Huc fortè spectat Cacamilxochitl, vel Thlacamilxochitl Quauhquiculle, *Novæ Hispan. Terentij apud Recc.* fol. 358.

Ibid. ad lin. 25.

Valerianella palustris Coryledonis folio, *Hermanni*, monente *Sherardo. Parad. Batav.* 239.

Ibid. ad lin. 16.

Valerianella Curassavica, Nymphaeæ minoris folio, *Hermanni Parad. Batav.* 239.

Ibid. ad lin. 30.

Valerianella Zeylanica, palustris; repens, Hederæ terrestris folio; ad radicem florida, *Herman. Parad. Bat.* 238.

Fol. 315. post. lin. 14.

RAPHANISTRUM dispermon *Knauth Enumer. Plantar. D. Bohart.*

Ibid. ad lin. 17.

Rapistrum arvense, folio auriculato acuto, *Turnesortij Elem. Bot.* 179.

Ibid. ad lin. 21.

Eruca marina latifolia, Jacobææ foliis, siliquâ lanceolata, *Cupani & Hort. Catholic.* 69.

Ibid. ad lin. 29.

Veruntamen hæc planta, ex siliiculis suis sese declarat potius ad Lepidij classem pertinere.

Ibid. ad lin. 34.

Huc fortè spectat Pongolam, *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 59. fol. 111.*

Ibid. ad lin. 38.

Pro Iconraphani pone Icon Raphani.

Ibid. post. lin. ult.

RAPHANUS sylvestris f. Eruca *Virginiana* Drabæ foliis, siliquâ crassiuscula. *An. Barbarea* Drabæ foliis *Virginiana.*

RAPISTRUM Gaditanum, flore purpureo.

Fol.

Fol. 316. ad lin. 4.

Cupitri fortè, *Nov. Hispania Terentij apud Rec. 375* & *Alm.*
*Ibid. ad lin. 19.*RAPUNCULUS ramosus corniculatus, capite globofo, Polygalæ foliis, ex
*Terrâ Marianâ.**Ibid. post lin. 31.*Rapunculus f. Rapuntium alterum minus, *Solonienf* simile, *Virginianum*, *Banifleri*.Rapunculus f. Rapuntium *Solonienf* simile, minus alterum, glabrum, ex *Virginiâ*.
*ejusdem Banifleri.*Idem caule & foliis hirsutum, ex *Terrâ Marianâ.**Ibid. ad lin. 38.*Huc fortè spectat Rapunculus folio oblongo, serrato, flore galeato, integro,
pallide luteo, *Car. Jam. 58.**Ibid. ad lin. 39.*An Rapunculus galeatus minimus, flore cæruleo elegantissimo, seu cælestino,
foliolis dentatis minimis, *Breg. Prodr. 2. 87.*Rapunculus *Virginianus*, Hyssopi folio, floribus immaculatis.Rapunculus f. Rapuntium *Virginianum* veluti perfoliatum, floribus cæruleis, *Valerianæ Indicæ* folio & facie.*Fol. 317. ad lin. 2. caule ramoso.*Rapunculus Coronopi foliis *Æthiopicus*, caule villoso, non ramosus.Rapunculus Papaveris Rhaedis folio, *Æthiopicus*.Rapunculus *Valerianæ* annuæ seu *Æstivæ* Clus. foliis, *Africanus*.*Ibid. post lin. 6.*Rapunculus *Æthiopicus*, Polygalæ facie, floribus argenteis, non galeatis.*Ibid. ad lin. 5.*Reseda vulgaris major, flore candido, foliis crispis latioribus; *Cupani Hort.*
*Catholic. 189.**Ibid. post lin. 24.*RESEDA Mariana Luteola dicta, foliis supernis integris, crispatis, infimis au-
tem liliaceis plantis.*Ibid. ad lin. 39.*Rhamnus Americana, *Monspelicæ* similis, flore, & fructu majore, *PBP. append.**Ibid. ad lin. 18.*Vid. *Phytop. Tab. 322. fig. 2.* ex *Prom. Bon. Spei.* monente *D. Doody.* Ab *ha-*
ro, *Rhamni* primi altera species, *Clus. Hist. 109.* haud prorsus abhorret.*Fol. 318. post lin. 6.*RHAMNUS foliosis aculeis, *Berberidis* folio, *Chalepensis*.*Ibid. ad lin. 20.*Fortè etiam *Zaccon Hierichuntæ*, foliis *Olea*, *Cast. Durant. JB. Tom. 1. lib. 6.*
*fol. 29.**Ibid. ad lin. 21.*Paliuro adfinis Arbor spinosa, flore racemoso, herbaceo, pentapetaloidæ, fructu
lucido, nudo, canulato lappaceo; *Car. Jam. 137.*

Fol.

Fol. 318. ad lin. 27. Hæc fortè est de Capparum censu; & fortè idem cum Cappari *Maderaspatensi*, Eutonymi pallentibus foliis, spinis brevibus duplicatis, *Almag. Bot. fol. 80.* quæ proximè cognata videtur *Maladundee Malabarorum*, quæ inter hujus *Mantissæ* Icones, apud cæteras suæ Sortis exhiberi curavimus.

Ibid. ad lin. 30. Great flowering Dog-wood nostratibus dicta, ex seminibus naram vidimus quoque in *Horto Comptoniano Fulhamiæ*, curâ & Industria *Joannis Adams Episcopi Londinensis*, hortulani diligentissimi.

Fol. 319. ad lin. 10. Molle *J. Baub. Tom. 1. lib. 5. fol. 522.*

Ibid. ad lin. 25. An Sena spuria arborea, spinosa, foliis alatis, ramosis five decompositis, flore luteo, siliquis brevibus, sulcatis nigris, Sabinæ odore, *Indian Savin Tree*, *Cat. Jam. 149.*

Ibid. ad lin. 30.

Vitex trifolia minor, Indica, serrata, Breyn. Prodr. 2. Bernnôsi, Hort. Malab. Part. 2. Negunda mas Acastæ, Hort. Med. Amst. sed perperam.

Ibid. ad lin. 34. Post fig. 9. add. *Vitex trifolia minor Indica, rotundi folia, Breynij, Cara-nosi, Hort. Malab. Negunda fam. Acastæ, Hort. Med. Amst. sed nimis erroneè.* Non magis enim *Negunda* fam. denominatio huic competit, quàm *Negunda maris* plantæ præcedenti; Sunt utraq; de *Rhodium trifoliorum* genere, Plantæ *Africanae*. *Ibid. post quorundam add. Lentiscus humilis trifolia Africana, RBP. 346.*

Ibid. ad lin. 37. Mexico *Sæds D. Marloë* ad necandos Vermes in corpore humano, insigne remedium, *Observ. fortè Pâ teu Sinenfium, Cleyeri de Medic. Simplic. Chines. 46.*

Ibid. ad lin. 42.

Cici arbor in Ægypto copiosa, Plinij lib. 15. cap. 7. Cujus semen nulla animans attingit, lib. 23. cap. 4. Ex quo Oleum elicitur ad purgationes Ventris, & lacrimis utile.

Ibid. ad lin. ult. An *Avellana purgatrix Novi Orbis, JB. Tom. 1. 322. Fortè etiam Nux trifida exotica, ejusd. ibid. fol. 328. Clus. exot. lib. 2. cap. 25. An Castanea purgatrix, ejusd. JB. fol. 329. CBP. 419. Avellana purgatrices, Hist. Lugd. 1789.*

Fol. 320. post lin. 7. *RICINUS* facinifera heptaphyllos, ex cujus radice venenatâ, placentas & pachen conficiunt *Americani*. Vid. *Mailhor Indorum fol. 241.*

Ibid. ad lin. 11. A similitudine foliorum, *Wild. Cassia Jamaicensis* dicta, hujus enim foliorum varietate, mirè se oblectat ludibunda Natura.

Ibid. ad lin. 16.

Hæc tres novissimè reperiuntur plantæ, plurimum inter se diversæ confundi non debent, quanquam sædè commiscuntur in *Cat. Jam.* Ubi ad *Ricinum* minorem

Staphys

Staphys-agriæ folio, flore pentapetalo purpureo, nimis oscitanter quaestio move-
 cur, an sit Ricinus Indicus pilosus, trifidus, vel quinquifidus, Bosculis atropur-
 pureis in Umbellâ aggregatis: *Plukens. Tab. 56. fig. 2.* An Ricinus Maderaspa-
 tanus quinquifidus, durioribus foliis in margine spinosis, *eiusd. Tab. 108. fig. 3.*
 Ricinus Maderaspatanus, flore purpureo trilobato folio, mutibus denticellis cre-
 nato, *eiusd. Tab. 220. fig. 4.* Hoc petinde est tanquàm si dixerit, has tres inter se
 planè diversas plantas esse unum & eundem, sed si quæ mecum huc secessisset Autor,
 aliter omni proculdubio sentiret. Hujus autem Catalogo uudique non est adhi-
 benda fides, turpiter enim in plurimis Synonymis confandit: Ut ut hujus Ca-
 talogi Scriptorem multa studiosissime collegisse videretur, dedisseque operam ut
 ipse (si quâ posset) posteris aliquando prodesset, non assecutum fortasse; sed
 nec sic quidem contemnendum, immò vero (quod sæpè quoque usurpari conve-
 nit) Aristotelico more, gratiam illi habendum censeo, quod aliquot vera cum
 scripserit, veris etiam inveniendis viam (vel perperam scribendo) monstravit, &
 docuit.

Fol. 320. post lin. 23.

Ricinus Orientalis fructu villoso, pruritu excitans hirsutie capsularum: *Coupage.*

Aut nuncupari meretur.

Ricinus Tithymaloides lactifluus, Arbor Malabarica, Cammeri Hort. Malab. Part.
5. Tab. 45.

Ibid. ad lin. 34.

Rinei nuclei Malucani Acoſta, Aromat. cap. 57. apud Clus. 292. *Hist. Lugd. (fol.*

1874.) Lignum Moluccense ab Indigenis Panava, ejusd. Acoſta Aromat. cap. 34.

apud eund. Clus. fol. 277. Lignum Moluccense Pavana dictum, fructu Avellanz,

JB. Hist. Plant. Christophorus Acoſta (inquit Ammannus Charact. Plant. pag. 346.)

Hanc arborem & fructus non vidit conjunctim, sed seorsim, hinc nucleos pineos

Malucenses pro hujus Arboris fructu non reputat, tam facile decipimur in Sim-

plicij cognitione.

Ibid. ad lin. 42.

An Bodaglam, Fructus exoticus Paludano, *JB. Tom. 2. 188.*

Ricinus arborescens Aethiopicus, fructu calyculato, triangulari, parvo, ternis spi-

culis duris, lignosis, aculeatis, (ad singulos angulos singulâ) munito, granis a-

tronitentibus apud laudatum virum D. D. Robertum Uvedale conspeximus.

Fol. 321. ad lin. 4.

Pinei Cathartici, & Purgativa de Santa Domingo Mexicenses Hispanorum, *Fol.*

Columpe. Notis in Recc. fol. 870. Pinus Indica Occidentalis Recco, Jonsen, De-

drolog. 323. Juba fortè planta Insularum Philippicarum Nierembergii fol. 342. Hæc

autem Quauhay o hualis tenia semen arboris Cucurbitinae nuclei, Pinus formâ

purgans, Hernand. in Cat. Jam. pro Ricino Americano Curcas dicto, & Faba

pugatrice Indica Occid. JB. mea quidè sententiâ, perperam habetur, sapius

enim hujus Autor de Plantis satis confuse loquitur, & plura genera sub uno

mine nimis frequens comprehendit.

Ibid. ad lin. 6.

Am Tithymalus Americanus incanus, Halimi folio, *Hort. Fogelian. Bryn-*

ton. Prodr. 1799.

27192

Fol. 321. ad lin. 9.

Vellacanjerrae Malabarorum.

Ibid. ad lin. 10.

An *Welia Cupamenj*, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 83.*

Ibid. post lin. 13.

Ricinus (forte) *Jamaicensis*, ramolior, lignoto caule, *Urtica* foliis angustioribus. An *Urtica* caule lignoso, foliis tenuioribus, atrovirentibus; *Cat. Jam.* 38. Ubi quaritur, an sit *Urtica* urens ramola, *Lusitanica*, *Commel. Cat. Amst.* 369. *Urtica* (forte) urens arborea, foliis oblongis angustis, *esajd. Cat. Jam. ibid.* Item *Urtica* racemosa, fruticosa, angustifolia, fructu tricoeco; *esajd. ibidem.*

Ibid. ad lin. 19.

Post vocem *nuncupatur*, add. *Okcepenauk* radix rotunda, capitis humani magnitudine, quam cum carnibus, & piscibus, in panis penuria, comedunt *Virginiani*, *Harini. CBP.* 91.

Ibid. ad lin. 31.

An *Xca Peruviana* cum viriculis spinosis; *CBP.* 90.

Ibid. ad lin. 40.

An *Pentaphyllum Indicum*, *Clus. exot. lib. 4. cap. 18.*

Fol. 323. post lin. 29.

RORELLA maxima longiori folio, *Saniculae* Alpinae floribus, caule nudo *Manomotapensis*.

Rorella major oblongo folio *Manomotapensis*, flore albo, caule folioso. Utræque forte rectius ad *Sanicularum* alpinarum classem annumerandæ merentur.

Ibid. ad lin. 32.

Ad hoc genus *Plantarum* accenseri meretur, *Acarapuda*, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 20.* Quamquam ad species *Alfine* referendam putat *Commelin.* Not. in loc. Ubi nuncupatur *Alfine* *Myriophylli* folio, flore carneo.

Fol. 324. ad lin. 4.

Huic forte accenseri meretur, *Thalaco*, *Novae Hispaniae* *Terentij* apud *Recc. fol. 423.*

Ibid. post lin. 16.

RUBIA stellaris, sive *Asperula* minor humisparfa, floribus albis *Aethiopica*. Vid. inter *Alfines*.

Ibid. ad lin. 27.

An *Rubeola saxatilis*, Alpina, tenuifolia, *Boccon. Mus. Plantar. rarior. pag. 145. Tab. 101.*

Rubia stellaris, f. *Asperula* succosa, nodoso caule *Gaditana*, foliis parvis lanceatis. Sub hoc enim titulo tam diu proponere placuit, donec quis aptius nomen inveniet.

Ibid. ad lin. 30.

Pro *PBP.* lege *CBP.*

Ibid. post lin. 38.

Rubia facie quadrifolia, *Saniculae* alpinae flore majore, ex *From. Ben. Sci.* An *Sanicula Aethiopica* crucifera.

Fol. 324. ad lin. 39.

Post vocem *flore*, add. *cæruleo*, & post *Banist.* ejusd. lin. add. An *Chamaejasme* inodora *Alfines* facie, dispersos, retrapetaloides, quadrato caule, *Virginiana*, *Alm. Bot.* 97. & *Phytogr. Tab.* 97. fig. 9.

Ibid. post lin. 40.

Rubia Mariana *Alfines* majoris folio, ad caulem binato, flore purpureo-rubente *Rubia* parvæ latifol. foliis, ad geniculum binis, flore rubenti, *Banist. Cat. Stirp. Virgin.* plurimum accedit. An *Tsjeru-ralu-dama*, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 23. *Veronica* similis *Malabarica*, flore purpureo, *Commelin. Not. in locum.* Fortè etiam *Chichec-Tzompatic* de *Ocopetlayuc*, *Hernández apud Rec.* 366. Huic etiam accenseri debet *Aocoxochitl*, *Nov. Hispan. Terentij apud Rec.* 353.

Eadem angustiori folio, ex *Terrâ Mariana*.

Ibid. ad lin. ult.

Erythrodanum marinum, *Dalechamp. Hist. Lugd.* 1386.

Fol. 325. ad lin. 13.

An *Rubus* foliis longioribus, subtus molli lanugine obductis, & incanis, flore & fructu minoribus, *Cat. Jam.* 173.

S.

Fol. 326. ad lin. 11.

AN *Teucroides* filiculofum foliis laurinis, floribus, galeatis, & labiatis, *Cat. Jam.* 64.

Ibid. ad lin. 17.

Huic autem refragari videtur *Cardanus de rer. Variet.* 114. nec iniquè, ubi animadvertitur in *Bellonium*; Hæc (inquit) *Bellonius* de *Coniferis*, observavit diligentius, quàm commodè tradiderit: Nam quomodo *Sabinam* coniferam vocet, *Juniperum* autem non, hæc edocuit; Utræque sanè sunt *Arbores*, sicut atque quammultæ, *Juliferæ* simul & *bacciferæ*, quarum *Nucamenta* (quæ pro conis malè à quibusdam habentur) illarum fructus antecedunt.

Ibid. ad lin. 19.

An *Pien pe Sinensium* *Andr. Cleyer. Medic. Simpl. Chinesib. usitat. pag.* 43. Hæc autem est reverà *Cupressi* species, ut ex propria *Observatione* nos commonefecit *Reverendus* admodum in *Deo* *Pater Henricus Londinensis Episcopus*. *Stirpium Exoticarum* Insignis *Estimator*.

Ibid. ad lin. 29.

Gooletteyella Malabarorum.

Ibid. post lin. 35.

SAGITTÆ affinis *Malabarica* Inhamè nervosis foliis, flore albo tripetalo, ex thecâ foliaceâ quinis extantibus crispatis alis pinnatâ, summo caule irrumpente. Idem fortè cum præcedenti.

Fol.

Pol. 327. ad lin. 36.

An *Salix alpina*, minima, lucida, repens, Alni rotundo folio; *Boccon. Masf. Plantar. pag. 19. Tab. 1.*

Ibid. ad lin. 38.

Salix alpina, minima, repens, retuso Serpylli folio lucido; *Boccon. Masf. Pl. ravior. pag. 18. Tab. 1.*

Fol. 328. post lin. 2.

SALIX pumila Groenlandica, folio magno *Styracis*, aut porius *Xylostei* *Dodonico.*

Ibid. post lin. 4.

Salix caprea Mariana, angustissimo folio brevi.

Ibid. ad lin. 16.

Ab hujus specie *Calaf. f. Ban Alpini de Pl. Egypt. 61. (i. e.) Salix Aegyptiaca* in humidis nascens odorata, haud multum abluere videtur. *Calaf. f. Ban Alpini, JB. Tom. 1. lib. 8. fol. 220.*

Ibid. post lin. 16.

Salicis folio, sive *Euonymi*, an *Vitis Idaea Americana*, ex *Provincia Mariana.*

Ibid. ad lin. 24.

Ad hanc *Salicem* folliculiferam nostram male refertur *Ceratonix* affinis arbor siliquosa, Oleæ folio, flore tetrapetalo albido, siliqua tereti ventriosa, cujus interior tunica est mucosa; & elegantèr miniata, *Cat. Jam. 153.* Quæ ad *Ceratiæ* cariosam *Caribearum*, hujus *Mantissa* arcenda potius, & fortè species est à *Cynophallophoro* nostro, non multum aliena: Verum quoniam hujus *Catalogi* *Author*, istius *Ceratonix* affinem Arborem, *Salicem* nostram folliculiferam esse putavit, ex ipso satis prodit, sibi *Salicem* nostram incognitam fuisse; nec minus incognitum (fortè) *Cynophallophoron* nostrum, quanquam in *Catalogo* suo, *Acaciis* affinis arbor siliquosa, folio subrotundo singulari, flore stamineo albido, siliqua tereti ventriosa, cujus interior tunica est mucosa, & elegantèr miniata, non minus audacter ab ipso pro hujus *Synonymo* ponitur; Ita indit nostram diligentiam *Catalogus Jamaicensis*, & raro doctiores, sæpius autem magis confusi ac hæsitabundi ab eo redimus.

Ibid. ad lin. 27.

Vid. Iconem in *Phyogr. Tab. 327. fig. 6.*

Ibid. ad lin. 31.

An *Salicis folio* lato, splendente, Arbor, floribus parvis, pallidè luteis pentapetalis, & ramulorum lateribus confertim exeuntibus, *Cat. Jam. 170.*

Ibid. ad lin. 37.

Apancholoa (fortè) sive *Herba lymphis insiliens Nieremberg. de Exot. fol. 351.*

SALVIA major Hispanica, folio & flore amplissimo. Exsiccatam inter *Collectaneas Doctoris Preston. & in Horto Medicinæ Oxelliano*, crescentem observavimus.

Ibid. ad lin. 39.

Salvia major, folio glauco, serrato, *Cat. Jam. 64.*

Fol. 329. ad lin. 16.

An *Salvia Hispanica*, *Lavandulae* folio, quam inter *Madritum*, & *Burgas*, invenit *Turnesfortius* Epist. ad *Sherard*. pag. 14.

Ibid. ad lin. 37.

A forma *Capsulae* seminalis, quae exsiccata & aperta *Scutellam* exprimit, ad *Scutellariarum* novum genus à *Morisono* revocatur, ut videtis in *Prælad. Bot. part. altera* 384, & 445.

Ibid. ad lin. 41.

Hæc est *Viburni Americani*, spicata species. *Periclymenum* rectum, *Salviae* folio rugoso, majore, oblongo, bullato, flore albo, fructu longiore, *Cat. Jam.* 163. Item *Periclymenum* rectum, *Salviae* folio rugoso, longo, & angustissimo, *eiusd.* pag. 164. In huius enim plantæ foliorum figura, variè se ludit *Natura*.

Fol. 329. ad lin. 2. add.

De hæc autem videtis, fol. 237. Ubi adjicienda sit *Synonymia* viz. *Loti arboris* folio angustissimo, *Arbor baccifera* racemosa, fructu minimo, croceo, monopyreno, *Cat. Jam.* 163. *Manlapoo Malabarorum*.

Ibid. ad lin. 6.

Cui folia sunt *Fraxinei* *Aleperis* semè accidentia. Variat etiam aliquando bacis nivalis venâ sanguinea, striatis.

Ibid. ad lin. 8.

Huius folia sunt longiora. *Ebuli* nostratis æmula.

Ibid. ad lin. 22.

Grossulariæ fructu, non spinoso, *Malabathri* foliis oblongis, floribus herbaceis racemosis, fructu nigro, *Cat. Jam.* 165. Item *Grossulariæ* fructu, non spinoso, *Malabathri* foliis subulis nivalis, fructu racemoso, in *Umbellæ* modum disposito, *eiusdem* *ibid.*

Ibid. ad lin. 24.

Caryophyllata, L. *Geum alpinum*, *Penn. Edib. Lugd. lib. 5. fol. 687.*

Ibid. post lin. 37.

SANICULA aizoides serratifolia minor, *Cap. Bon. Spei.* ad *Dominum Steene-freer*, à fratre suo allata est.

Fol. 331. post lin. 26.

Sanicula alpina, *Alfines Holostij* foliis glabris, flore albo, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. post lin. 33.

Sanicula aizoides alpina, multifido folio, flore majore albo. *Præcedentis* fortè in *Almagesto*, varietas tantum.

Ibid. post lin. antepenult. viz. 44.

Sanicula alpina aizoides, *Africana*, folio & caule hirsutis.

Fol. 331. post lin. 15.

Sanicula alpina aizoides, foliolis orbiculatis pilosis, *Rorellæ* in modum ad oras fimbriatis, flore purpureo. An *Sedum saxatile* hirsutum purpureum, *CBP.* 184. quod 5 in *Prælad.* 132. Plantula hæc parvælegans, humistrata, cespitis muscique instar, *Saxa* exornat, & *Anglia* nostræ *Seprenriovalium*, alumna est. In *Horto Medicinæ*, apud *Cheltenham*, enutritam conspeximus.

Fol.

Fol. 332. post lin. 35.

Sanicula f. Corusca facie, Herba Africana, folio teneriori.

Sanicula facie Aethiopica, foliis rigidioribus. An Geranium Aethiopicum, Saniculae folio.

SANTALUM rubrum Ind. Orientalis, Chummarum Malabarorum. fol. subrotundis. Santalum rubrum Matthioli, CBP. 393.

Santali rubri species altera, precedenti admodum diversa. Chummarum Malabarorum. Secunda species, foliis mucronatis; Phacodendro nostro haud absumilis. Fructum fere nigrum, Myrtillis similem.

Santalum Citrinum Orientale; Chaudenamarum Malabarorum. Santalum pallidum Matthioli, CBP. 392. & fortè Santalum album Matthioli, ejusd. CBP. ibid. An Santalum verum ligno citrino & albo, foliis laurinis, Breyn. Prodr. 2. 88. Qui siccum à Cl. Wilhelmo ten Rhine accepit. Makassari fortè Aucennae, sive Santal citrinum alterum, vergens ad albedinem.

Santalum nigrum, Davadarum Malabarorum. vid. inter Arbores.

Ibid. post lin. 39.

SATURCIA durior Monmotapensis, radice perenni.

Saturcia Alexandrina foliis variis, ad furculorum summum longioribus, ad inumum vero brevioribus Thymi foliis, ad intervalla confertis. An Saturcia Thymifolio, CBP. 219. quam ex Horto Cl. Contarenti Thymbrae nomine, habuit Excellentiss. Autor. Propè Alexandriam collegit & Avissimis & Domino suo Doctori Patricio Adair attulit, qui nobis amice communicavit. An Marum tenuifolium, Thymifacie Hispanicum; Bocc. Mus. Plant. Tab. 13.

Fol. 333. post lin. 2.

Saturcia hirsuta, imis subrotundis Clinopodij, Austriacae foliis, subulis purpureis, ex Sicilia Hort. Uvedalens.

SAURURUS repens, folio orbiculari Nummulariae facie; Plumier. vid. Serpentaria Almagest. fol. 343. pl. penult.

Ibid. ad lin. 21.

In Hort. Medic. Chelseiano crescentem invenimus, bis autem repetitur, hoc loco, & fol. 344. sub hoc titulo, viz. Sefeli petraeum minus, sive Saxifragia tenuifoliae affinis, Caulalis falso dicta.

Fol. 334. post lin. 11.

SCABIOSA minor, elegans, Coruscae facie, folio, capite globoso, hispido, Alexandrina.

Scabiosa minor Alexandrina, cum pulchro stellato capite, Myrrhidis folio angustissimo.

Fol. 335. ad lin. 19.

Ad hoc fortè genus Plantarum accenseri meretur, Xoxotlatl, Nova Hispan. Terebantur apud Recc. fol. 441.

Ibid. ad lin. 21.

An Chrysanthemum Conyzoides nodiflorum, semine rostrato bidentis, Cat. Jam. 126.

Al.

Fol. 335. ad lin. 23. add. floribus albis.

Scabiosa conyzoides *Americana*, Clinopodij foliis, floribus purpureis parvis. No-
cheztic forsitan, *Nova Hispania Terentij apud Reco. fol. 392.*

Ibid. ad lin. 29. add.

Coatacorundee *Malabarorum*.

Fol. 336. post lin. 5.

Scabiosa globularia frutex, latè virentibus Scapylli foliis; Alypum s. Herba terribi-
lis *Afraticorum* à Doctore Preston accepimus.

Scabiosa globularia frutex, Erica foliis, Alypum s. Herba terribilis, *Prom. Bon. Spei.* An Sanamunda *Africana*, foliis Scapylli minoribus, asperiusculis, capitu-
lis Thymi, *Breyn. Fusc. rarior. 25.*

Ibid. ad lin. 7.

An Alypum, s. Arbor terribilis procerior, cortice cinereo scabro folio acumi-
nato, longiore, *Cat. Jam. 124.*

Ibid. ad lin. 11.

Pulegium fruticolum, crectum, verticillis densissimis, *Cat. Jam. 64.*

Ibid. ad lin. 14.

Hæc autem nova & spectabilis Arbutula, à quodam è Nostratibus in re Herba-
ria Neophyte, Valerianoides *Americana*, flore globofo, Bishaminis folio agnoui-
natur. Sed quâ causâ, ignoro. A Karou Tsjaka, *Hort. Malab. Part. 3. Tab. 33.*
Haud multum abluere videtur.

Scabiosa montana, globofo flore albo, s. Statice *Lusitanica*, Scorzonera folio maxi-
ma. An Statice maxima *Americana*, *Cornuti de Pl. Canad. pag. 213.* Hujus
exemplar acceptum referimus humanissimo viro D. D. Preston.

Ibid. post lin. 26.

Scabiosa nudicaulis, s. Statice minima *Maderaspatensis* specie, *Planta Mariana*, ca-
pitulis argenteis duris.

Ibid. ad lin. 39.

An Polypodium *Africanum* minimum, farie Ceterach, *PBP. append.*

Ibid. post lin. 39.

Scolymodendros *African.* ex Monte Tabulari. Hujus exemplar ab amico suo col-
lectum, & ad se nuperrimè transmissum, nobis ostendit Insignis Botanicus, D. D.
Jean. Woodward.

Ibid. post lin. 41.

SCORDIUM spinosum odoratum, *Cornuti de Pl. Canad. 113.* *Park. Theatr. Flan. append. 1676.* In Horto D. Uvedale stirpium exoticarum amenissimè in-
fructo, luxuriantem conspeximus.

Fol. 337. post lin. 11.

SCORPIOIDES arbor, Biti folio singulari, siliquâ nodosâ intortâ. *Muade-*
maermoodde Malabarorum. Fructum fert Scorpioidem, variè involutum, ceu

Capitis Medusa simulat. An Biti *Malabarice* accedens, Arbor *Maderaspa-*
tana, flore peculiari, *Almag. Bot. 68.* Cujus Icon absque fructu habetur in *Phy-*
toz. Tab. 18. Nisi quis malit Biti, *Hort. Malab. Part. 5. Tab. 58.* Idem esse cum
Maorsjau, *ejusd. Hort. Malab. Part. 6. Tab. 12.* Flores tamen non conveniunt;
quanquam enim in Icone & flores & fructus desiderantur, in descriptione dicitur:

Flors

Flores papilionacei flavescentes, racemis oblongis numerosi proveniunt, quibus siliquæ succedunt. Plura non licet, nostri autem flores purpurascunt, nec in racemis proveniunt.

Fol. 337. ad lin. 25.

Add. Catanance flore luteo, Turnesortij Elem. Bot. 380.

Ibid. ad lin. 32.

Fortè Mè-mèw rum Sinensibus Cleyeri de Medicam. Simplic. Chinens. pag. 26.

Fol. 338. post lin. 13.

SCROPHULARIA *Mariana*, Ebuli folio singulari.
Scrophularia Americana, densiori scabro folio, denticulis magis extantibus asperata. *Fortè Ahuapatlis, Chamædrys Mexicana, Hernández apud Recc. 133.*

Ibid. ad lin. 38.

An *Lysimachia cærulea* galericulata, foliis angustis, longis, serratis, sætidis, *Cat. Jam. 66.* Nostra tamèn folia minimè sunt serrata. Huic nostræ Huapahuizpatlis altera, *Nov. Hispan. Terentij apud Recc.* Si non floris color obstatet, maximè conveniret.

Fol. 339. ad lin. 15.

Cassida alpina supina, magno flore, *Turnesortii.*

Ibid. post lin. 15.

SCUTELLARIA (àn *Teucrium*) *Ocimi* folio, ramosissimum, ex *Terrâ Marianâ.*

Scutellaria Chamædryoides, floribus amplis, purpureis, in verticillas positis; ex *Terrâ Marianâ.*

Fol. 340. ad lin. 3.

Sedum majus Soboliferum, flore albicante *Agavæ.*

Ibid. ad lin. 8.

Post sinbriatum add. floribus ex flavo pallescentibus, per ramos numerosissimos recurvatos eleganti serie dispositis.

Ibid. post lin. 10.

SEDUM *Africanum*, angustis longioribus foliis, *Jasmini* floribus umbellatis.

Ibid. ad lin. 23.

An *Sedum* flore rubro pendulo, *Breyn. Cent. 180.*

Fol. 341. post lin. 5.

Sedum minus Arabicum, flore luteo, foliis planis mucronatis.

Ibid. ad lin. 14.

Avarce Malabarorum. Tepehoaxin, Nov. Hispan. apud Recc. 410. Huic nostræ quodammodo affinis videtur, cujus Icon (forte) à pictore minus diligenter expressa est, cum alas ad caulem, nimis laxè disposuerit, & auriculos, ad exortus alarum, planè omiserit.

Ibid. ad lin. 23.

Chamæcrista pavonis major, Hort. Med. Amst. cap. 27.

Ibid. ad lin. 42.

Post c. 31. add. Nasturtij Indici putata siliqua Peruviana, ejusd. JB. Tom. 2. lib. 15. 176. Tuberibus similis, Fructus Indicus, CBP. 376. Pistachia Indica Eru-ctus, Bas. Bessler. Fascic.

Fol. 342. ad lin. 1.

An Quadrifolium erectum, flore luteo, Cat. Jam. 74. quod sub Arachidæa tetraphyllæ titulo repetitur, pag. 72.

Ibid. ad lin. 5.

Cassia & Herba castæ medius Ind. Orientalis Frutex, Breyn. Cent. 57.

Ibid. ad lin. 13.

Propter harum eum spinis similitudinem fortè deceptus, in magnum errorem incidit D. Sloane, qui in suo Cat. Jam. pag. 144. Hanc Senæ spuria speciem, cum Lobo echinato Clusij, s. Inimboy Brasiliens. Marcgravij malè miscuisse, & confuisse videtur. Admonitum ergo te velim eosque qui in hosce libros incident, ne in verbis Facultatem nostram æstimatis, sed potius adhibitam rebus cum peritiâ curam; Etenim hæc omnia visu non exactissimè cognovimus.

Ibid. ad lin. 19.

An Ecapatli, s. parva Sambucus, Fernandez apud Recc. fol. 112. Aut potius Huazium, Nov. Hispaniæ Terentij apud eund. Recc. 380. Cherucunai Malabarorum.

Ibid. post lin. 31.

SENÆ spuria, s. Chamæcassia Orientalis species perelegans, Manmerzellemaram Malabarorum.

Ibid. ad lin. 35.

Tachara Malabarorum.

Ibid. ad lin. antepenult.

Post vocem Similis add. folio pingui & incano.

Ibid. ad lin. penult.

Defeat Periodus sequens, viz. Senecio incanus pinguis, CBP. 231. & ejus loco ponitur, Senecio Ambrosiæ odore, CBP. 131. Senecio flore odorato, Camera-rij, Hort. Medic. 158.

Fol. 343. ad lin. 2.

An Senecio major, florum calyce purpureo, Cat. Jam. 124.

Ibid. ad lin. 8.

An Senecio minor, Bellidis majoris folio, Cat. Jam. 125. Jacobæa humilis, Senecionis folio (flore) Boccon. in Mus. Plant. Tab. 100.

Ibid. post lin. 8.

SENECIO Myosotidis, sive Pilosellæ foliis, Marylandicus.

Ibid. ad lin. 11.

Est reverà species Jacobææ, & forte Jacobæa Æthiopica, flore purpureo, Breyn. Prodr. 2. 58.

Ibid. ad lin. 13.

Ad hoc genus Plantarum adnumerari licet, Senecio ille Mexicanus, Anethinis foliis, s. Tlalahoacatl, Nova Hispan. Terentij apud Recc. fol. 420.

Ibid. post lin. 20.

Senecio, Erini majoris folio, flore oblongo singulari.

Ibid. ad lin. 22.

Post fig. 4. add. Breyn. Cent. 1. 180.

Ibid. ad lin. 39.

Piper longum, racemosum, Malvaceum, Cat. Jam. 45.

Fol.

Fol. 343. post lin. 39.

SERPENTARIA trifoliata; f. *Saururus Indiarum Orientalis* triphyllus, foliis subtus lanatis, spicis ex alis summo apice compressiusculis, & aridentatis. *Shalamarum Malabarorum*. Inter hanc nostram & *Molagomaram*, *Hort. Malab. Part. 5. Tab. 25.* magna intercedit similitudo.

Ibid. ad lin. 42.

Piper longum minimum, herbaceum, scandens, rotundifolium, *Cat. Jam. 45.*

Fol. 344. ad lin. 21.

An Thymbra Hispanica; *Coridis folio*, *Turnesortij Elem. Bot. pag. 166.*

SERPILLI hirsutis foliis, inodorus Suffrutex, *Aethiopicus*, flosculis albis umbellatis.

SESAMOIDES parvum *Goromandelense*, Bliti minoris folio, capsulis bullatis. *Sesamoides* parvum spicatum, *Linariae* strictissimis foliis, ad unum latus vergentibus; ex *Virginia*.

Ibid. ad lin. 31.

An Arbor mirabilis ex *Insula Ferro* aquam stillans, *JB. Tom. 1. 463.* ex qua forte *Sagapenum Officinatum*. *Sagapenum* enim *Ferulaceae* Plantae gummi esse *Dioscorides* tradit, *lib. 3. cap. 95.* Quam *Galenus*, *Panaci* similem esse ait, in *lib. de Antidotis*. At vero *Mesue* ex Arbore *Oleandrum montanum* æmulante, prodire scribit, *lib. 2. de Simplicibus, cap. 19.* & secundum *Versionem Jacobi Sylvij* *Sagapenum* est liquor Fruticis ferulacei, *Oleandro montano* similis. Ideoque forte sit hujus nostri *Seselios fruticosi Lachryma*; Verum hæc ambigendo potius quam decernendo dicta sint. An *Ferulae in Ombrio Insula* una ex *Fortunatis* quam hodiè nostro *Ferreum* dicunt, quæ ad Arboris magnitudinem surgunt, uti habet *Solinus, cap. 58.* & *Plinius lib. 6. cap. 32.* Quæ aquam cunctis *Insularum* sufficientem suppeditare dicuntur; Arbores enim ex quibus ingens *Aquarum* scaturigo in *Insula Ferro* & *Sancti Thomæ*, *Ferulae* sunt arborecentes, asserente *Vossio, Not. in Pompon. Melam.*

Fol. 345. post lin. 25.

SIDERITIS hirsuta procumbens, *CBP. Tetrabit Herbaciorum, Loeselij.*

Ibid. ad lin. 33.

Tareponi (forte) *Nov. Hispan. Hernandez apud Rec. 407.*

Ibid. ad lin. 40.

Sideritis Salviz folio Donati, Boccon. Mus. Plant. pag. 164. Tab. 127.

Fol. 346. post lin. 9.

Sideritis Bugulae foliis Mariana, floribus purpureis, longo rubulo donatis.

Ibid. post lin. 11.

Sideritis hirsuta, Napifoliis, ex Terra Mariana. An Hormini species?

Sideritis Americana, Clinopodij Virginiani lutei folio, & facie, Camphoram acutè spirans, D. Uvedale.

Ibid. ad lin. 18.

Hæc est planta baccifera, & ad *Lyciorum* genus releganda.

Fol. 346. ad lin. 35.

An Malifolio subtrus. albicante. Arbor baccifera, ligno durissimo, fructu cono-
pyreno rubro, officulo canulato, *Tran. v. l. d. Cat. Jam. 170.*

SIDEROXYLUM *Surinamense*, Lentisciais minoribus foliis, rachi medio ap-
pendicibus aucto. An Lauro affinis, Jasmini folio alato, costâ mediâ membra-
nulis utrinque extantibus alata, ligni duritie, ferro vix cedens, *Cat. Jam. 137.*

Fol. 347. ad lin. 2. add.

Sceli *Æthiopicum* alterum, *Camerarij Hort. Medic.*

SILER *Virginianum*, Aquilegiæ folio minus, semine breviori. Fortè *Coziopati*
secunda, *Novæ Hispan. Hernandez apud Recc. 236.*

Ibid. ad lin. 4.

Respectu seminis binatim junctis, ad calcem Umbelliferarum averruncari debet.

Ibid. post lin. 20.

SISARUM *Syriacum*, CBP. 155. Secacul *Arabum*, & *Maurorum*, f. *Pastinaca* *Syri-*
aca. Rawolfij Hist. Lugd. app. 24. Cujus datur & varietas angustiori folio; quod
aliquandò ex *Aleppo* nobis allatum, habuimus.

Ibid. post lin. 42.

SISYNRICHIMUM *Marianum*, gramineis foliis, flore cæruleo parvo. Idem
fortè cum præcedenti, *Almagesto.*

Idem alterum *Americanum*, hirsutie ex omni parte pubescens.

Fol. 348. post lin. 8.

Sisynrichium Marianum monanthos, flore atropurpureo. *Helleborine Virginiana*
bulbosa, flore atrorubente, D. *Banister. Almag. huic plurimis convenit.*

Ibid. ad lin. 15.

An Coalquiltic, seu Olus Colubri, quam alij *Tzatzayanatquiltic* vocant, *Hernandez apud Recc. fol. 187.*

Ibid. ad lin. 20.

Apium palustre Fuchsj, Hist. Lugd. lib. 6. fol. 701. Quod à *Casparo Bauhino*
malè confundi ut cum *Paludapio*, f. *Apio Officinar.* ut videtis in *Pinace pag. 154.*

SIMUM Umbelliferum *Marianum*, integris ad imum *Violæ Martiæ* foliis, floribus
ad alas in umbellam exeuntibus.

Fol. 349. ad lin. 8.

Cocalmecatli, sive *Cunarum* funis, quam alij *Olcacatzan* vocant, *Nieremberg.*
320. An altera *Olcacatzan Pabnatlanica*, ejusd. ibid.

Ibid. ad lin. 11.

An *Smilax aspera*, fructu nigro, radice nodosa, magnâ, lævi, farinacea, *China*
dicta, *Cat. Jam. 105.*

Ibid. ad lin. 19.

Post D. *Byrd. add.* An Planta fruticosa scandens, ex cujus caule *Scipiones* cine-
rei flexiles, striati, & tuberculati, nervis & tuberculis spiralitè dispositis,
supple Jacks dicti, Cat. Jam. 214. Quia scilicet hujus *Stipites*, ratione tuber-
culorum, & eorum lentoris etiam ad verbera inferenda, idonei sunt.

Fol. 349. ad lin. 22.

Baccis quoque nigris invenitur.

Ibid. post lin. 22.

SMYRNIUM aureum, lobis ternis quinifve *Marianum*. Zayolpatli (forſan) *Mexicanſum*, ſive Muſcatum *Medicina*, *Hernandez apud Recc. 199.*

Ibid. ad lin. 23.

Post ſimile add. ſed procerius.

Ibid. ad lin. 25.

An Solanum vulgare, *Americanum*, lanuſinoſum, baccis nigris, *Breyn. Prodr. 2. 92.* Noſtri autem folia ſunt omnino glabra, in *Horto Regio Aulae Hamptonienſ.* per plures annos vigeſcit.

Ibid. ad lin. 38.

Fortè Totocapollin, *Novæ Hiſpan. Terentij apud Recc. 432.* Arbor racemola *Braſiliana*, foliis Apocyni, *Jacob. Breyn. Cent. 1 fol. 7.* Ab hac noſtra haud admodum abludere videtur.

Ibid. ad lin. 40.

Valerianellæ Americanæ genus, facit *Cat. Jam. 91.* Sed quàm rectè aliis judicandum relinquo; ſub hoc autem titulo illic habetur, *Valerianella Alſines folio ſcandens, floribus pallide luteis pyxidatis, in Umbellæ modum diſpoſitis, ſemine aſpero, Cat. Jam. 91.*

Fol. 350. ad lin. 2.

Post 12. add. Fortè Tzopelic-Quahuatl, *Nov. Hiſpan. apud Recc. 437.*

Ibid. ad lin. 4.

Frutex baccifer, folio oblongo integro, flore pentapetalo pallide luteo, odoratiſſimo; *Cloven-Berries, Cat. Jam. 173.*

Ibid. ad lin. 6.

The Muſtachee Tree right ſide of *Malabar*; Nomen trahit à *Modira*, ob ſimilitudinem myſtacum, quos ad ramuſculos producit, nam Vocabulum *Modira* in lingua *Malabarica*, denotat myſtaces.

Ibid. ad lin. 8.

An Solanum fructu fruticoſa, foliis laurinis oblongis, integris, ſubtus hirsutis, flore minore purpureo; *Cat. Jam. 173.* Fortè Xaltomatl, ſ. Tomatl arenolum, *Nard. Antonij Recc. 297.*

Ibid. ad lin. 14.

Post 208. add. (i. e.) *Spinachia fruteſcens, Americana, Muntingij.*

Ibid. ad lin. 20.

An fortè Planta Cachos vocata, *Hernandez apud Recc. 85.* apud *Monardem multa habes, cap. 30.* de Inſignibus hujus Viribus in cienda urina, propellenda arena, & calculo diſſolvendo; Eſt pomum (ait) altera parte ſeſſile, altera turbinaſum, cinereique coloris, acrimonie expers. Semen tritum ex aqua aliqua idonea, ſua vi lithontripſica, calculum (ferunt) in lurum diſſolvere. Cachos, *Hiſt. Lugd. lib. 18. fol. 1876.*

Ibid. ad lin. 29.

Et fortè Batleſchala *Æthiopia*.

Fol. 351. ad lin. 2.

Huic fortè congener est, *Hyosciamus peregrinus Dalechampi*, *Hist. Lugd.* 1713.
Solanum peregrinum, fructu rotundo, *CBP.* 167.

Ibid. ad lin. 6.Post *fig. 1.* add. Fructu majore aureo.*Ibid.* ad lin. 7.An *Solanum Cajanense*, spinosum, hirsutum, *Icon. Robertin.**Ibid.* ad lin. 11.Post *Spinosum*, add. staminibus florum majoribus luteis falcatis.*Ibid.* ad lin. 38.Yllamàtlanti, sive Dentes Vetulæ, *Hernandez apud eundem Rec.* fol. 128.*Ibid.* ad lin. 41.Huic fortè spectat *Cocauhcapaceli*, *Novæ Hispan. Terentij apud Rec.* fol. 372.*Capficum rotundum Dalechampi*, *Hist. Lugd. lib. 5. fol. 633.**Ibid.* ad lin. 44.An *Mandragora caulescens*, foliis laciniatis, radice fibrosa, *Turnesfortij Elem. Bot.* 67.

Fol. 352. ad lin. 27.

Fortè etiam *Alfinc-baccifera* similis, suis acinis, *CBP.* 250. *Herbz adversus hæ-*
morrhoides, admirabiles acini, *Clas. Histor. append. alt. ad lib. 6. Almorsanera*
Yerva, *D. Joan. Castancæ Medic. Hispanensis.*

Ibid. ad lin. 35.

An *Solanum lethale*, fructu rubro, semine copiosiori minutissimo, *Cat. Jam.* 60.
Aumacaraunca langa Malabarorum.

Ibid. ad lin. 41.

Solanum scandens bacciferum, foliis & flore *Ocymoidis*, *Cupan. Hort. Cath.*
pag. 104. Huic quodammodo convenit *Yhcaxochitl*, *Novæ Hispan. Terentij*
apud Rec. 442.

Fol. 353. ad lin. 15.

Amaranthus baccifer, *Indicus*, minor, *Circææ* foliis & facie, *Hort. Beaux. pag. 7.*
 Hujus bacca sunt quales *Ribium*, ut plurimum *monopyren.* *Amaranthus bac-*
cifer, *Circææ* foliis, *Hort. Medic. Amst. cap. 66.* cum *icone grandioribus lineis in*
ere incisâ.

Ibid. ad lin. 39.*Capficum fructu aculeato*, *Turnesfortij Elem. Bot.* 127.

Fol. 354. ad lin. 4.

Piper siliquosum, magnitudinis baccarum asparagi, *JB. Tom. 2. 944.* An *Cap-*
ficum minus, fructu rotundo, erecto, parvo, acerrimo; *Axi* rotundum acre,
 quod *Caribe* ab *Indis* nuncupatur, *Cat. Jam.* 111. Cujus *Catalogi Autor*, de *So-*
lanis cujuscunque generis, adeo superficialiter & confuse tradit, quemadmodum
 inter *Aloetica Plantarum genera*; Ubi sub unius titulo adeo diversarum miscet
 nomina, ut nostram plane ludit diligentiam, & quid statuendum nesciamus:
 Hoc Chaos quomodo Componendum ipse viderit, cui otium datur, & ad opus
 emaculandum horæ subsecivæ magis abunde suppetunt.

Fol. 355. ad lin. 7. add.

Quoddam descriptionem, Icone enim exhibetur *Elictracium* majus erectum lanifolium, CBP. ut vellet ipse *Bauhinus Pinac.* 127.

Ibid. ad lin. 11.

Lege clarus.

Ibid. ad lin. 13. add.

An *Cyclaminos* altera, hederaceis foliis Planta, *Lobelij Obs. & Icon.* quodammodo enim huic convenit. Per se etiam *Mexicana*, *Hernandez apud Recc. fol. 196* nobis videtur inter harum species militari; ut & *Huapa-Quiltic*, *Nova Hisp. apud eund. Recc. 380.* Atque forsitan eadem est cum *Soncho alato Virginis*, caule pilis duriusculis hispido; *Banisteri.*

Ibid. post lin. 13.

SONCHUS *Marianus*, *Attriplicis* folio.

Ibid. ad lin. 26.

An forte *Perin-Kara*, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 24.* Foliis enim sibi invicem valde assimilantur.

Fol. 357. ad lin. 2. add.

Variat quamplurimum suis foliis.

Ibid. post lin. 2.

STACHYS *Scordisoides* peregrina, sive *Sideritidi* affinis; ex *India Orientali.*

Ibid. ad lin. 6. add.

Oatepemarutte Malabarorum.

Ibid. post lin. 28.

STOEBE foliis *Cichoraceis* asperiusculis, *Mauritanica*, flore purpureo, *PBP.* 378. *Stoebe Barbarica*, foliis *Cichoraceis* rigidioribus, floribus purpurascens, *Hort. Beaum.* 38.

Ibid. post lin. 36.

Stoebe spinosa maritima, CBP. 273. *Stoebe peregrina*, *Clus. Hist. append. alt. auct.*

Stoebe ex *Codice Caesareo Dodon.* *Cyanus spinosus*, *Creticus*; *Ponæ Ital.*

Fol. 358. ad lin. 8.

Post 46. add. *Hispanis & Lusitanis* *Burladora* sive *Burladora* (i. e.) ludicra, aut ludificans dicta, ut enim hac *Adukeræ* maritis dementandis, atque confopiscendis usantur, ita & fures, ac *Pyraæ*, emungendis per soporationem incautorum loculis, eadem sæpius abutuntur, omnibus ferè totius *Orientis* regionibus, & *Insulis Indiae*. An Planta illa *pyratice* inebrians, & dementans, quam *Insule Mambonit* acceptam in *India Orientali*, *Casp. Bauhinus* refert, ex *Part. 7. cap. 120.* Quid dubium movet, an *Nicotiana* sit species? *Pinac.* 170. An fuit hoc *Nepenthes* quod *Jovius* scribit *Selinum Turcarum Imperatorem* comedisse, ut animo voluptatem afferret, & memoriam tolleret rerum molestiarum, quærit & credit *Excellent. Casp. Hofmannus de Medicam. Offic. lib. 2. pag. 421.* Quanquam *Bellonius lib. 2. Obs.* inclinat in *Rutan Syriacam* *Harmala* dictam, cujus femine palam *ve-*
sci Turcas aut.

Fol. 358. ad lin. 26.

An Nacazcul, sive Toloatzin ab aliis dicta, *Datura altera Mexicana*, *Hernández apud Recc. 113.*

Ibid. post lin. 31.

STRAMONIA *Indica*, fructu oblongo glabro. *Nilahummaru, Hort. Malab. Part. 2. fig. 29.* variat aliquandò triplici florum serie; undè *Mudela-nilahummaru, ejusd. Hort. Malab. ibid. fig. 30.* An fortè *Leum-Altachaha, (i. e.) Nux Mechl Serapionis, JB. Tom. 1. lib. 3. 339.*

Ibid. post lin. 32.

STYRACIS folio, flore roseo, *Arbor Æthiopica*, fortè de *Cistorum* genere; an *Arbor rosea Styrcis folio, ten Rhine Breyn. Fasc. 19.* sub *Arboris* nomine generico, in præcedentibus exhibetur.

STYRAX *Aceris folio Virginiana; Raij.* Dignum consideratione est (inquit *Casp. Hofman. de Medic. Offic. 449.* sitnè omnis *Styrax* ex unâ arbore, an verò ex diversis. Nobis etiam compertum est non unam esse *Styraciferam* arborem, nec hujus *Lachrymam* unicæ Speciei propriam sed communem quoque plurimis *Arboribus*.

Ibid. post lin. 36.

SYMPHYTUM *Marianum*, angustifolium, trinervium, flore pallidè luteo, seminibus duris, splendentibus *Lithospermi æmulis.*

Fol. 359. ad lin. 5.

Pulmonaria alpina, angusto folio *Italica; Boccon. Mus. Plantar. pag. 110. Tab. 86.*

Ibid. post lin. 9.

Symphytum f. *Pulmonaria Indica*, asperifolia, punctulis lacteis aspersa, floribus tripetalis rubris. *Soneri-Ila, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 65.* *Pulmonariæ maculato folio similis*, floribus tripetalis, rosaceo saturis, *Commel. Not. in locum.*

Ibid. post lin. 14.

SYRINGÆ cæruleæ foliis, Planta spinosa, ex *Oris Coromandel.*

Ibid. ad lin. 18.

Jasminum laurinis foliis, flore pallidè luteo, fructu atrocæruleo, polypyræno, velenato, *Car. Jam. 169.*

Ibid. ad lin. 33.

Est planta baccifera, cujus fructus sunt binati, & quasi testiculati. *Cautmullee Malabarorum.*

Syringa baccifera scandens Myrtifolia, fructu gemello, *Pecala Malabarorum, & Coode woolacneka Gentilium Indorum.*

T.

Fol. 360. ad lin. 8.

CUI flores sunt oblongi, ex carneo purpurei monopetali, ad oras inæqualiter incisi.

Ibid. ad lin. 13.

Thurifera (forte) Arbor Arabica, quam Antigonus Rex, allato sibi ramulo Terebinthum esse putavit, *Plin. lib. 12. cap. 14.* Cortice Lauri esse constat, quidam & folium simile dixere; Talis certe fuit Arbor Sardibus; nam & *Asa reges*, ferendi curam habuerunt. *Idem ibid.* Accedit quod idem *Plin.* scribit, Virgam Thuream Romani allatam à Legatis Arabicis, folia habuisse laurina, ex *Casp. Hofman. de Medic. Offic. pag. 453.* Nunc enim compertum habeo non unam esse Thuriferam arborem, immò verò non esse hanc Lachrymam ut de Stryace diximus unicæ speciei propriam, sed communem quoque plurimis Arboribus, At nihil subest certi. Non semper nobiscum loquitur Natura sine velo; potius latere vult multa, ut major sit eorum ex occulto Autoritas, & Veneratio.

Fol. 361. ad lin. 4.

An Frutex Æthiopicus, Portulacæ folio, flore exalbido virescente, *Hort. Med. Amst. cap. 91. cum Icone.*

Ibid. post lin. 12.

TAMARINDUS monococcus minor, pruniformis, pulpâ intus ossiculum ambiente, Aurantiæ coloris esculentâ, Carandas, *Garcia lib. 11. cap. 6.* Carandje Malais, *Bontij lib. 6. cap. 4. 93.* Hujus pulpa propter gratissimum ejus saporem, & refrigerandi Sanguinis efficaciam, delicatioribus ventriculis valde expetita est. *The Tamarind Plumme* nostratibus dicta. An Tamarindo similis Frutex, *CBP. 403.* Quaillos Frutex, fol. Tamarindi, fructu ut *Fabæ Romanæ* subduplico longiore, quo in cibis utuntur, *Part. 4. Ind. Orient. 8.* Ceratiæ & Tamarindo medjæ affinis, *Indiæ Orientalis.*

Ibid. post lin. 15.

TAMARISCUS Ind. Orient. Belgarum æmula, ramulis Cupressi. Autacorce Malabarorum.

Ibid. ad lin. 19.

Tamariscus Ægyptia, gallifera, *JB. Tom. 1. lib. 10. 352.*

Ibid. ad lin. 25.

Deleantur hæc verba viz. An Sanamunda Africana Ericoides minor, ramulis admodum lanuginosis, *Breyn. Fasc.*

Ibid. post lin. 38.

Tamariscus Æthiopicus, Sabinæ foliis incanis, flore phœniceo, Jaccæ capitulis inter ramulos sparsis,

Fol. 361. post lin. 38.

Tamariscus Monomotapensis, longioribus reflexis *Ericæ* foliis incanis, summo ramu-
li fastigio, spica spadicea, gnaphaloide, ornatus.

Tamariscus Ericoides foliolis incanis *Æthiopicus*, capitulis purpureis in summitate
globosis. Idem fortè cum precedenti.

Tamariscus Æthiopicus, Coridis folio incano, Jaceæ capitulis parvis tomentosis ad
ramulos dispersis.

Tamariscus Æthiopicus, Coridis folio glabro, *Herba Impia* capitulis in spicam
æquilibus. Vid. *Almagest. Botan.* 159.

Fol. 362. ad lin. 5.

Indè fortasse dictum, quod frequens crescat in *Hispaniâ Tarraconensi*. Hujus qua-
dammodò convenit *Chipequa* sive *Herba firma*, *Hernandez apud Recc. fol. 203.*

Ibid. ad lin. 10.

An *Portulaca Africana* procumbens, polyanthos, flore luteo? *Car. Plant. ad cal-
cem Paradis. Batav. edit.*

Ibid. ad lin. 33.

Lege *Indica*.

Ibid. ad lin. 39. add.

Hort. Medic. Amst. cap. 77. cum Icone.

Ibid. ad lin. ult.

Huc fortè spectat *Gonandina Brasiliensis*, *Marcgr. lib. 3. cap. 7.* An *Arbor In-
dica* dormiens, *Theophrasti apud Libanum, JB. Tom. 1. lib. 4. 501.*

Fol. 363. ad lin. 11.

Chamædrys alpina frutescens, folio splendente, *Turnesortii Elem. Bot. 174.*

Ibid. ad lin. 27.

Verbena Americana procumbens, *Veronica* aquatica folio subrotundo, flosculis
ad foliorum alas, *Breyn. Prodr. 2. pag. 103.* Hanc non diversam esse à *Pee Tsjan-
ga-Pussam*, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 59.* Nullus dubitaret *Commelinus*, excepto
quod flores aliquomodo colore differant; sed minus rectè ut mecum existimo.

Ibid. ad lin. 29.

An *Ricino* affinis odorifera, fruticosa, minor, *Teucrij* folio, fructu tricocco di-
lute purpureo, *Car. Jam. 44.*

TEUGRIOIDES *Æthiopicum* floribus parvis fistulosis, summo margine pro-
fundius incis.

Fol. 364. ad lin. 14.

An *Thapsia* quædam latiori folio; *Park. Theatr. Plant. append. 1683.*

Ibid. post lin. 34.

THEKA, *Hort. Malab. Part. 4. fol. 57.* *Kyati*, sive *Quercus Indica*, Bontè ex *In-
sula Johanne*.

Fol. 365. ad lin. 10.

Cui folio *Centinodij*, in *Horto Medicinæ Chelseiano*, ex seminibus è capsulis suis
per maturitatem spontè decidentibus, annuatim progerminat.

Ibid. post lin. 14.

THLASPI aureum *Lusitanicum*, *Leucoij* foliis, asperis, fruticosius.

Fol.

Fol. 365. post lin. 34.

Thlaspi spicatum Persicum, perfoliatum, maximum, foliis inferioribus tenuiter incis-
 sis Hypocoi ritu, superioribus à caule Perfoliatæ modo penetratis, *Morif. Hist.* 2.
 294. *Thlaspi verum primum Dioscoridis*, *Zanon. Hist. Nor.* 191. *Thlaspi Alex-*
andrinum Cortusi, *Joanne Bauhino*, *JB. Tom.* 2. 933. *Thlaspi Alexandrinum*, *CBP.*
 208. *Park. Theatr.* 849.

Fol. 366. ad lin. 1.

Post *CBP.* add. 106. Item *Thlaspi montanum sempervirens*, *ejusd.**Ibid.* ad lin. 2.Post 217. add. *Hist. Lugd.* Item *Thlaspi montanum candidum*, *ejusd. Hist.*
Lugd. fol. 1180.*Ibid.* ad lin. 4.Deleantur quæ sequuntur verba, viz. *Thlaspi montanum sempervirens*, *CBP.*
 106. *Thlaspi montanum candidum*, *Hist. Lugd.* 1180.*Ibid.* post lin. 21.*Thlaspi Umbellatum frutescens*; *Lusitanicum*; *Iheridis angustifolio*, floribus incar-
 natis, *PBP.* 380.*Ibid.* ad lin. 22.An de hoc genere *Plantarum* sit *Linum arboreum*, *Prosp. Alpin. de exot.* pag. 18.
Doctiorum iudiciis relinquimus.*Ibid.* ad lin. 27.An *Thymelæa humilior*, foliis acutis atrovirentibus, *Cat. Jam.* 168. Hæc forte
 spectat *Yzta-parilis Arotonilci* sive *Herba Francisci Zimbren*, *Hernandez apud*
Rece. 152.*Ibid.* ad lin. 33.Add. *Planta surrecta & elatior.**THYMELÆA Capensis* spinosa, Nepæ effigie angustiori folio humilis, & pro-
 cumbens.

Fol. 367. post lin. 5.

Thymelæa Alexandrina, Oleæ folio lubrus incano.Eadem foliis utrinque virentibus, ex eodem circa *Alexandriam* Territorio.*Ibid.* post lin. 13.*Thymelæa affinis quadricapsularis*, *Ethiopica*, *Cristæ galli* foliis villosis, pericar-
 pio magno pyramidal.*Ibid.* post lin. 15.*Thymelæa Africana*, Polij angustioribus foliis, floribus in capitula summo caule
 glomeratis. *Sanamunda* tertix *Clusij* affinis, foliis Polij, *Cap. Bon. Spei.**Thymelæa affinis pusilla planta*, villosis & crenatis foliis acuminaatis, *Prom. Bon.*
*Spei.**Thymelæa affinis*, *Valeriana alpina* minimæ facie, *Planta ut plurimum uncialis*, ex
*Promont. Bon. Spei.**Ibid.* post lin. 19.*Thymelæa Ethiopica*, *Passerina* foliis, *Breyn. Cent.* 1. 10. A proximo sequenti in
Almagesto maxime diversa; Hæc vero ad *D. Stonestreet*, à *Prom. Bon. Spei.* nu-
 pertime allata est.

Fol. 367. post lin. 19.

Thymelæa Æthiopica glabra, Passerinae foliis minor. An *Thymelæa Æthiopica*, foliis Passerinae minor, Cap. Bon. Spei. Breyn. Fasc.

Ibid. ad lin. 21.

Deleantur illa verba, viz. An *Thymelæa Æthiopica*, Passerinae foliis, Breyn. Cent. 1140.

Ibid. ad lin. 25.

Thymelæa Hispanica, foliis Myrti incanis, Elem. Bot. 468.
Thymelæa Africana, Myrti Tarentini foliis, & floribus sericea lanugine argentatis.
Thymelæa Æthiopica frutex, Polygoni angustiore folio glabro, floribus cum tubulis, ex uno calyculo plurimis.

Ibid. ad lin. 35.

Hujus itidem prosapiæ, si ex habitu plantæ judicare liceat, est illa quæ in Mus. Plant. rarior. à Buccone pingitur sub hoc titulo; viz. *Chamaestachys Hispanica*, pag. 35. & 63. Tab. 27.

Ibid. ad lin. 37.

Deleantur hæc verba, viz. An *Thymelæa Æthiopica*, foliis Passerinae minor, Cap. Bon. Spei. ejusd. Breyn. Fasc. rarior. Pl. et eorum loco inferantur. An *Sanamunda Africana* Ericoides minor, ramulis admodum lanuginosis, Breyn. Fasc. Hæc enim non est de Tamariscorum genere; ut semel putavimus.

Thymelæa fruticosa, Serpylli foliis hirsuta, Prom. Bon. Spei. An *Sanamunda Africana*, foliis Serpylli majoribus incanis, Breyn. Fasc. 25.

Thymelæa Gnaphaloides Africana, foliis & floribus sericea lanugine maximè tomentosis. An *Thymelæa* foliis Serpylli candicantibus, Serici instar mollibus, Breyn. Prædr. 2. 99.

Thymelæa Æthiopica fruticosa, foliolis in longum striatis, surculis valdè tomentosis.

Thymelæa Æthiopica Passerinae liratis foliis, ad caulem sibi invicem incumbentibus, margine tomentosis.

Thymelæa Scaphoides Monomotapensis, s. foliolis glabris, triquetris, cavis, cymbæformibus, floribus solitariis amplis, summo caule villosis.

Ibid. post lin. 44.

Thymelæa Æthiopica frutescens, angustis Passerinae foliis, densa serie caulem Versatilibus glabris, ad oras autem lanugine fimbriatis, flosculis in spicam purpureis.

Thymelæa Æthiopica, spicata, glabra, foliis longioribus angustis.

Thymelæa (fortè) frutescens, Juniperi latioribus foliis, Parali modo densius stipatis, Prom. Bon. Spei. An *Thymelæa Pyrenæica* Juniperi folia, ramulis surrectis, Elem. Bot. 468.

Thymelæa fruticosa, Pinaltri brevioribus foliis, floribus villosis, ex Prom. Bon. Spei.

Thymelæa Æthiopica, Abietiformis, floribus piceis.

Thymelæa Syriaca, Ericæ maritimæ nostrati similis planta, summo caule floribus coronata, ex Insula Cypro.

Thymelæa.

Fol. 367. post lin. 44.

Thymelæa capitata minor Africana, Serpylli foliis aculeatis. An *Sanamunda Africana*, foliis Serpylli min. asperiusculis, capitulis Thymi, *Breyn. Fasc. 25.*

Thymelæa capitata, Lycopodij foliis reflexis, mucrone pungentibus; f. *Alypum Ethiopicum*, spinosum, capitulo Succisæ.

Thymelæa capitata f. *Julifera*, angusto Salicis folio, *Prom. Ben. Spei. Phytoz. Tab. 229. fig. 6.*

Thymelæa capitata f. *Julifera*, longioribus & acutis foliis glabris, *Ethiopica*. Huic multum convenit *Thymelæa Capensis*, sericeis longioribus, & acutis foliis, caule geniculato, piloso, *Phytoz. Tab. 229. fig. 4.*

Thymelæa capitata *Rapunculoides*, *Ethiopica*, Saligneis foliis, perianthio magno coniformi, squammoso. Frutex *Ethiopicus* conifer, *Breyn. Cent. 1.* *Salix conophora Africana* major, conis grandioribus, *Almag. Bot. 328.*

Thymelæa capitata *Rapunculoides*, Nerij crassioribus foliis, summo apice tridentatis, *Ethiopica*, coniformi calyce squammato. An *Salix Conophora Africana*, rigido crassoque folio, *PBP. 373.*

Fol. 368. ad lin. 18.

Post vocem *Baubinus*, add. *Hyslopus* forte montana, *Fuchsij Hist. Lugd. 934. ad eand. lin.* deleantur hæc verba; viz. Item forte & *Libanotidis* species *Rondeletij*, *ejusd. JB. Tom. 2. 25.* (i.e.) *Tragoriganum* nothum *Dalechampij Hist. Lugd. & quæ sequuntur hoc loco expungantur*; & ad Fol. 30. Nostri *Almag.* inter lin. 17, & 18, transferantur, & sic emendabitur error. Eandem autem hanc existimamus, *Tragorigano Dictamni capite*, *Hispanico*, *Bocc. Mas. Pl. pag. 50. Tab. 43.*

Ibid. post lin. 31.

TILIA amplissimis glabris foliis, nostrati similis, ex *Terrâ Marianâ*. Cui folia quemadmodum omnis generis *Ulmorum*, uno latere latiori, ac ad petiolum versus inferiora, longius exprorecto, ac rotundiori ambitu insignita, suntque in oris crenata; Fructus sunt Nostratibus idem.

Ibid. ad lin. 35.

Tilia maximo folio, *JB. Tm. 1. lib. 8. fol. 137.* & satis propriè dicatur *Tilia hirsuta*, *Coryli foliorum æmula*, fructu anguloso.

Ibid. ad lin. 36.

Et magis propriè dici possit, *Tilia Betula nostratis folio*, fructu hexagono.

Fol. 369. ad lin. 6.

Tithymalus dendroides aphyllus, *Cap. Bon. Spei. ten Rhine*, *Breyn. Cent. 179.*

Ibid. ad lin. 15.

An *Tithymalus perennis*, & procerior, *Linii folio acuto*, *Car. Jam. 82.* in *Insula Maderâ* collegit Autor.

Ibid. ad lin. 21.

Fortè etiam *Anti-Euphorbium Dodonæi*, *Hist. Lugd. lib. 16. 1692.* Videbatur tamen *Dodonæo* hanc plantam ad *Telephij* genus esse referendam.

Ibid. ad lin. 42.

An *Arbor* foliis & ligno venenatis in *Hispaniola*, *Jonst. Dendrogr. 467.* *Laurifolia* venenata, folio leviter serrato, oblongo, obtuso, copiosum lac præbens, *Car. Jam. 136.*

Fol. 370. ad lin. 3.

An Spina apud Indos, laurino folio, cujus liquor aspersus oculis, cæcitatem infert omnibus Animalibus, *Plin. lib. 12. cap. 8.*

Ibid. ad lin. 16.

De hujus præconio conscriptus est libellus à primo ejus Inventore *Juba* Mauritanico rege, qui medici sui, *Antonij Musa* fratris (qui & ipse *Augusti* *Cæsaris* fuit Archiater) nomine, illam insignivit. Nobilitatum laude inquit *Rolfincius*, (*Guerner. Rolfinc. lib. de Purgant. Vegetab. 180.*) inventionis singularis hoc naturæ miraculum est. Duo erant fratres *Antonius Musa* & *Euphorbus* ille *Augusti* *Cæsaris*. Hic *Juba* Mauritanie regis Medicus. Ille *Augustus* jecinore viciario ad desperationem redactus, contrariam & ancipitem medendi rationem subjicit, & frigidis exterius & interius *Lactuca* nempe, eodem medico, subire coactus fuit. Re feliciter peracta Medico statua decreta. Hic, *Juba* arborem ipsam consecravuit, & dono dedit *Euphorbo*. *Antonius Musa* à Statua: *Euphorbus* ab Arbore, felix duorum fratrum Copula, Nominis immortalitatem sunt consequuti.

Ibid. ad lin. 23.

Euphorbio similis, *Sadricalli Indorum*: *Breyn. Prodr. 2. 44.*

Ibid. ad lin. 27.

Euphorbium Indicum, *Opuntia* facie, caule geniculato, triangulari; *Breyn. Prodr. 2. 44.*

Ibid. ad lin. 35.

Hic forte pertinet *Chucungarigua* prima, *Novæ Hispaniæ Terentij* apud *Recc. 368.*

Fol. 371. post lin. 11.

Tithymalus Virginianus, è *Lio Venetorum* similis, flore albo singulari, petalorum limbis crenaturâ donatis.

Ibid. post lin. 20.

TITHYMALUS humilis *Anagallidis* tertia *Labelij* foliis rarioribus, altè radicans, ex *Terra Mariana*. Ejusdem prolapiâ videtur *Chichilicpatli*, *Novæ Hispaniæ Terentij* apud *Recc. 366.*

Tithymalus parvus dichotomos, *Cochlearia* minimæ foliis, *Marilandicus*.

Ibid. post lin. 27.

Tithymalus Ethiopicus arboreus, *Myrti* angustioribus foliis, in aculeum abeuntibus, *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. post lin. 32.

Tithymalus fruticosus, *Ethiopicus*, *Taxifolius*, ex *Prom. Bon. Spei.*

Ibid. ad lin. 34.

Peplis fruticosa maritima, geniculata, *Cat. Jam. 83.* An *Teccequi*, *Novæ Hispaniæ Hernandez* apud *Rec. 408.*

Ibid. ad lin. 41.

Galastivida altera, s. *Tithymali* genus spinosum, *JB. Tom. 2. lib. 11. fol. 411.*

Fol. 372. post lin. 6.

Tithymalus Marianus, angustis rigidis foliis, summo caule ramosus, foliis atque ramulis ad divaricationem ternis, & quaternis. Planta perlegans. Cujus radix Medica nostratibus dicta.

Fol. 372. post lin. 13.

Tithymalus foliis Pini hirsutis, f. *Pityusa* *Æthiopica*, & *Humipilus*, *Prom. Bon. Spei*.

Ibid. post lin. 35.

Tithymalus Persicus, exiguis circinatis foliis, non crenatis, lignosis viticulis, fructu grandiore tricocco.

Tithymalus frutescens, *Nummularia* minoris folio; sive *Peplis* ex *Rhodiorum Insula*, fructu parvo striato, à D. d'Avillon accepimus. An *Peplis montana* *Nummularia* folio, *CBP.* 293. Fortè *Peplis* f. *Peplus minor*, *Tabernæm.* *Icon.* 597. Hujus enim folia superiora, quemadmodum illius in pictura, sunt apicibus parum elongata, & in mucronem desinunt. Est præcedentis fortè varietas fructu minore.

Fol. 373. ad lin. 1.

Fortè etiam *Hoacaltlaotl*, *Nov. Hispan. Terentij apud Rec.* 377.

Ibid. ad lin. 3.

Tithymalus Botryoïdes, majoribus serratis foliis, cauliculis rubentibus, ex *Ter. rã Marianã*.

Ibid. post lin. 3.

Tithymalus botryoïdes Marianus major, procumbens, caule sanguineo splendens, glabro, foliis hirsutis, purpureâ maculâ magnâ, notatis.

Ibid. ad lin. 10.

Tithymalus dulcis *Parietaria* foliis hirsutis, floribus ad caulum nodos conglomeratis, *Cat. Jam.* 82.

Ibid. ad lin. 14.

Huic fortè spectat *Chilpatlis Mexicenum*, *Hernandez apud Rec.* 139.

Ibid. post lin. 17.

Tithymalus Hypericoides Virginianus, subrotundis foliis glabris, floribus summo caule glomeratis fortè idem præcedenti.

Idem alter, longioribus foliis, & caule hirtutis pubescentibus, ex eadem *Provincia*.

Tithymali Myrsinites specie, *Arbuscula* *Æthiopica*, subrotundis foliis, & *Szechadis Arabica* squamato capitulo duro, *Lachrymam* fundens. An fortè *Sarcocolla Arbor Orientalis*: Hujus enim *Lachrymæ* fragminibus admista reperiuntur sæpè numero folia ex candido flavescentia *Tithymali Myrsinitis* folia sicca egregiè referentia, ut ex *Casalpino*, notavit *J.B. Hist. Pl. lib. 9. Part. 2. fol. 309.* An hujus sit *Species minor*, iste *Frutex Africanus*, *Fruticis terribilis Narbonensium* folio, capitulis oblongis, squammosis, *Breyn. Fals. Rarior.*

Tithymali Myrsinites specie, *Arbuscula* *Æthiopica*, folio parvo & lato basi in acutissimum mucronem subito desinente, capitulis *Origani*. An *Planta* quæ *Tithymali* folia refert, è cujus radice *Assæ* secunda species longè sæcundior, *Malacitæ* *Hin* dicta, exprimitur; *Bontl Animadvers. in Garc. ab Orto initio, lib. 4. de Medic. Indor. Oriental.*

Ibid. ad lin. 35.

Sefeli Siculum candidum, *Cretico* minori affine, folio rotundiori, multo minore, gracilius, *Cupani Hort. Cathol. pag. 200.*

Fol. 373. ad lin. 40.

Ab Arbore Margaritifera, quæ aliquando à nostratibus Colonis ~~Shag-Barke~~ quoque nuncupatur, maxime est diversa planta.

Fol. 374. ad lin. 9.

Deleantur hæc verba viz. *Thymum Creticum* frutescens, Marum forte; Et loco eorum inferantur, *Tencrium minus frutescens*. Et ad lin. 10. Addatur, *Chamaedrys maritima incana* frutescens, foliis lanceolatis, *Turnesortij Elem. Bot. 174*

Ibid. ad lin. 26.

An *Tribulus terrestris* major, flore maxime odorato, *Car. Jam. 90.*

Ibid. ad lin. 28.

Post vocem *aculeato*, add. *Tribulus terrestris* fruticosus, *Creticus* spinosus, foliis binatis, trifidis, flore purpureo, fructu lævi, seu non spinoso dissolubili, *Breyn. Prodr. 2. 101.* *Cistus spinosus trifolius*, *Morif. Hist. 2.*

Fol. 375. post. lin. 4.

Trifolium siliquosum, Loto affine *Indicum*, quadratis longioribus siliquis, caule anguloso, pallido, *Genistæ fungoso*.

Ibid. post lin. 9.

TRIFOLIUM fruticosum argenteum, canulato caule, flosculis parvis in orbem glomeratis, ad alas foliorum pediculis innixis, siliquis strictissimis duris. *Chemucan Malabarorum.*

Trifolium siliquosum Loto affine *Indicum*, punicante caule, rotundo, lignoso, siliquis ad exortum foliorum plurimis. *Cautauvertee*, s. *Caueuverree Malabarorum*. Ad *Rheumatismum* valde efficax remedium. ideoque nominari licet *Trifolium siliquosum Antirheumaticum*.

Trifolium Lotoides non ramosum angustiore *Bituminosi* folio, flore parvo luteo singulari ex *Terra Mariana*.

Idem ramoso caule *Marilandicum*.

Trifolium Marianum Bituminosi facie, floribus spicatis, parvis ochroleucis.

Trifolium erectum Americanum, angustissimo venoso folio, hirsuto caule, floribus spicatis luteis.

Trifolium spicatum luteum, venosis subrotundis foliis, averſa parte canescentibus, huic accedere videtur *Tlalamatl*, *Morbi Gallici* sedans dolores, & *Herba Joannis Infantii* quædam Iconem, apud *Recc. 306.* *Trifolium* (forte) ex *America*, *Dodon. fol. 566.* *Trifolium Americam*, *Lob. Icon. Tam. 2. pag. 31.* *Trifolium Americanum*, *JB. Tam. 2. fol. 368.*

Trifolium spicatum luteum, venosis subrotundis foliis, apicibus sinuatis, sericeâ lanugine subtus argenteis. An Loto affinis *Lagopoides*.

Trifolium siliquosum rotundifolium glabrum, floribus purpureis *Marylandicum*.

Ibid. post lin. 18.

Trifolium Cochleati (i.e.) *Forni Burgundiaci* folio, & floribus purpureis, frutescens, ex *Terra Mariana*.

Idem foliis angustissimis.

Trifolium Marianum frutescens, angustiori folio, albâ lineâ notato, floribus cruleis, ex aliis foliorum racemacim proceduntibus.

Idem foliis angustissimis.

Fol. 375. ad lin. 26.

Re verâ hoc est *Cytisi Rivini* exemplar imperfectum, ex *Pram. Bm. Spet.*

Ibid. post lin. 29.

Trifolium pratense album, flosculis magis parulis, *Mariannum*.

Fol. 376. post lin. 7.

Trifolium montano simile *Virginianum*, floribus amœnè purpureis, amplioribus, & magis parulis, summo caule glomerulis per maturitatem reflexis.

Ibid. post lin. 26.

Trifolium Lagopoides Africanum, *Dorychnij* facie argenteum, capitulo glomerato molli.

Fol. 377. ad lin. 3.

Trifolium nodiflorum tubinatum, *Boccon. Mus. Plant. rar. pag. 142. Tab. 104.*

Ibid. post lin. 37.

TRIOPTERIS *Indiæ Orientalis*, *Chamænerij* splendentibus foliis; *Veraüllee Malabarorum*. An forte Idem proximè subsequenti in *Almagesto*.

Ibid. ad lin. 38.

Sub harum vexillo militari debet, *Arboscula viscosa*, *Ælæagni* foliis latè virentibus, *Americana*, *tricocco*, *Phytogr. Tab. 141. fig. 1.* & dici mereatur, *Triopteris Ælæagni* foliis viscosis latè virentibus, *Americana*.

Ibid. post lin. 38.

Triopteris Americana scandens, fructu fulgente, majore, aureo. An *Aceri* aut *Paliuro* affinis, *Arbor* caudice non ramoso, folio *Sorbi sylvestris*, floribus pentapetalis, racemosis, speciosis, purpureis, fructu sicco, tribus membranulis extantibus alato, *Cat. Jam. 138.* Ex *Insula Barbados* ad nos fuit asportata. Ad *Triopteridum Scandentium* genera spectat, *Karu-Katsjil*, *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 36.* Quæ præter verrucosos fructus illos spurios, cauliculis supra exortum foliorum insidentes, habet etiam fructus genuinos plures congregatim provenientes, triangulares, ternis, amplioribus, extantibus alis præditos, in quorum singulis bina in se invicem decumbentia semina, sine ullo intersepimento reperiuntur.

V.

Fol. 379. post lin. 34.

VALERIANOIDES *Cortulæ Matthioli* facie, planta *Æthiopica*, foliorum ad lacinias supernâ parte, spinis stelliformiter echinata, & ad oras pilis longioribus fimbriata. De hac vid. *Almagest. Bot. fol. 62. pl. 2.* & *Phytogr. Tab. 271. fig. 5.* Ubi foliorum pictura habetur absque floribus; est *Valeriana* genuina species, ut existimo. Et *Valeriana spinosa* dici mereatur.

Ibid. ad lin. 13.

Fortè *Tala-dama*, *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 56.* An *Valerianella*, folio tubroundo, flore purpureo, semine oblongo striato aspero, *Cat. Jam. 91.*

Bb

Fol.

Fol. 381. post lin. 37.

Valerianæ Græcæ folio & facie, floribus albis tetrapetalis, planta bitapularis, ex Virginia. Matlalcochitl fortè, Nov. Hispan. Hernandez apud Recc. 383.

Fol. 382. post lin. 6.

VERBASCUM foliis incanis mas latifolium, floribus luteis, arctè caulibus adhaerentibus, sine foliis angustis inter flores emanantibus, Morison. Hist. 2.

Ibid. ad lin. 28.

Hic fortè spectat. Apitzalpatli, Adstrictoria prima, Fernandez apud Recc. 285.

Ibid. ad lin. 31.

As Verbena Americana, Urticæ folio minore, floribus dilutè purpureis, minoribus, Breyn. Prodr. 2. 102.

Ibid. post lin. 35.

VERBENA bodiflora incana minor, Indis Orientalis, Poordela Malabarorum.

Fol. 383. post lin. 7.

Verbenæ foliis, Planta Æthiopica, quadricapularis, flore parvo calathoides, caeruleo.

Ibid. ad lin. 26.

As Phytanodes Americanum, flore albo tetrapetalo, staminibus referto, foliis & ramulis per intervalia ternis, Almag. Bot. fol. 296. cujus frons habetur in Phytograph. Tab. 215. fig. 1. Neutiquam autem hæc planta, Veronica dici meretur.

VERONICA procumbens, Verbenæ foliis, Prom. Ben. Spec. As Verbena minima, Chamædryos folio, Cat. Jan. 64.

Fol. 384. ad lin. 14.

As Veronica minima, Clinopodij minoris folio glabro, Romana, Boccon. Mus. Plant. rarior. pag. 19. Tab. 9.

Ibid. ad lin. 21.

Veronica alpina pumila, caule aphylo, Boccon. Musea di Piana. nar. pag. 27. Tab. 9.

Ibid. ad lin. 30.

As Veronica alpina glabra, rotundo Alfinis Plantaginis folio, Boccon. Mus. Plant. pag. 18. Tab. 7.

Ibid. ad lin. 33.

Amgallis supina minima, Polygoni folio, Boccon. Mus. Plant. rarior. pag. 161. Tab. 108.

Ibid. post lin. 35.

Veronica Polygoni folio & facie necedens, Planta Virginiana, ex alis foliorum fructu utrinque ad caulem sessili.

Fol. 385. ad lin. 30.

Sis Lindbort, of Grew. Mus. Reg. Societ. fol. 250.

Ibid. ad lin. 36.

Post fig. 4. add. Viburnum Americanum odoratum, foliis Urticæ, floribus miniatis, D. Herman. Cat. Hort. Leyd. Breyn. Prodr. 2. 103. Viburnum Americanum, Urticæ foliis, Lami odorè, floribus miniatis, Flori. Med. Amst. cap. 78. cum Icone pereleganti.

Fol.

Fol. 385. ad lin. 42.

Post 397. add. nec non *Axihuitlapapactli*, ejusd. Rec. fol. 386.

Ibid. ad lin. ult.

Periclymenum rectum, *Urtica* folio hirsuto, majore flore flavo; Cat. Jam. 163.

Item *Periclymenum rectum*, *Urtica* folio; flore coccineo amplo, ejusd. 164.

Fol. 386. ad lin. 4.

Periclymenum rectum humilius, *Salvia* folio rugoso, majore, flore purpureo, fructu oblongo, esculento purpureo, Cat. Jam. 164.

Ibid. ad lin. 6.

Periclymenum rectum, *Salvia* folio rugoso, minore, bullato, flore albo, Cat. Jam. 163.

Ibid. ad lin. 8.

Periclymenum rectum, *Salvia* folio rugoso, minore, subrotundo; Catalog. Jamaic. 164.

Fol. 386. post lin. ult.

VIOLETTA minima, Indiana, graveolens, flosculis perexiguis, coccineo colore, ex alio foliorum spicatum prodeuntibus. In Horro Episcopali Fulhamia, ex seminibus à Ceylonensi Insula allatis, oriunda.

Fol. 388. ad lin. 1.

An *Viola rubra striata*, *Eboracensis*, Park. Theatr. Pl. 755. Fortè etiam, *Viola alpina minima*, *Nummularia* folio; Boccon. pag. 163, Tab. 127.

Ibid. post lin. 4.

VIOLETTA Virginiana, Platanus fere foliis, parvis, & incanis. An *Viola Americana* foliis variis Querundam.

Ibid. ad lin. 10.

An *Viola lutea Virginiana*, Park. Theatr. Pl. 755.

Ibid. post lin. 13.

Viola surrecta similis, *Planta Mariana*, pediculis foliorum hirsute pubescentibus.

Ibid. ad lin. 18.

Ab Autore non descripta, sed depicta tantum; at à Joanne Terentio in Notis exposita. Ab Hermanno tamen appellatur *Veronica* similis, fruticosa, Curassavica, Teucrij foliis, flore galericulato, cum in *Pradromo*, tum in *Paradiso Batavo* 240. Ubi ambigit, an sit *Verbena* fruticosa, Teucrij foliis. Et secum reputat *Loquiltic*, Hernandez fol. 382. Huic non prorsus alienum esse, ut videsis ubi supra.

Fol. 389. ad lin. 13.

An eadem cum illa, quæ in secundo loco enumeratur ab Hermanno in *Parad. Bat.* 243. eandem facere, & ipse videtur.

Fol. 389. ad lin. 28.

Hoc autem à Sloano pro *Bryonia* cujusdam specie intrepidè ponitur. Idemque esse putat, cum *Frutice Americano* *Pyrifoliis*, subhirsutis, floribus vulgaris viridantibus, *Heliotropij* in modum incurvatis, baccis nigris nigra macula insignitis; Hort. Beaum. pag. 21. & ab ipso *Bryonia* nigra fruticosa, racemi ramulis variè implicitis, atque caudæ *Scorpionis* instar, in se contortis, baccis albis, una

vel altera, nigra macula notatis, denominatur. Flachichinoa Patlahoal, sive Herba ulla tertia Hernandez, Huic plantæ, ex nostra sententia, rectius adscribenda sit; cum in Recchi. Exemplar. pictor baccas quasdam virides, alias nigras depinxerit, florem vero ex albo ad castaneam tendentem: At nostri quidem flores sunt impense flavi, & fortasse ad Heliotropiorum potius Cohortem sit averruncanda, perlegans hæc peregrina planta

Fol. 389. post lin. 39.

VIRGA AUREA *Indiæ Orientalis*. Hirculis albis lanuginosa. Pukerandee Malabarorum. An fortè rectius sit de Eupatorii cœnsu.

Fol. 390. ad lin. 5.

Virga aurea *Americana* ferrata, floribus ad foliorum alas conglobatis, Breyn. Prodr. 2. 104. quam in Hort. Lugd. Batavo, nomine Virgæ aureæ *Novæ Angliæ* Asterisci folio legit. Virga aurea *Canadensis* Asterisci folio, Parad. Batav. pag. 244.

Ibid. ad lin. 31.

Viscum Delphinij flore minus, petalis è viridi albicantibus, angustioribus, radice fibrosa, Car. Jam. 120. Nostri autem floris petala, sunt immaculati candoris.

Ibid. ad lin. 34.

Hujus est fructus capsularis, quatuor semina in se complectens.

Ibid. ad lin. 37.

Nuchulee Malabarorum. Gentilibus *Indis* Vaindechertoo nuncupatur.

Ibid. ad lin. ult.

Piperi similis fructus striatus, CBP. 412. Caryophyllus *Plinianus*, sive Negundo Imperati, fol. 676.

Fol. 391. ad lin. 24.

Viti *Idææ* similis, Frutex *Africanus*, PBP. 384.

Ibid. post lin. 24.

VITIS IDÆA *Malabarica*, fructu majori; Perin-Nirouri, seu Ma-Nirouri, Hort. Malab. Part. 5. Tab. 43.

Vitis *Idæa* *Malabarica*, fructu minore, Kâton-Nirouri, Hort. Malab. Part. 5. Tab. 44.

Ibid. ad lin. 26.

An Vitis *Idæa* *Ethiopica*, Buxi minoris folio, floribus albidis, Hort. Medicinæ Amst. fol. 125. Ubi habetur Icon.

Ibid. post lin. 30.

Vitis *Idæa* *Mariana*, Vincæ pervincæ minoris folio, Jasmimi flore gemello fructu nigricante, claviculis donata.

Ibid. post lin. 39.

Vitis *Idæa* *Mariana*. bullatis floribus amplis, uno versu in spicam dependentibus. Idem est cum Arbutula *Mariana* brevioribus Euonymi foliis, pallide virentibus, floribus arbutels ex eodem nodo plurimis, spicatum uno versu prorumpentibus, in præcedentibus memorata.

Vitis *Idæa* *Virginiana*, longiore mucronato, & crenato folio, floribus pentapetalis, lacinibus plurimis referis.

Fol. 391. post lin. 39.

Vitis Idæa Mariana, brevioribus obtusis foliis, floribus albis inter ramulos sparsis.

Ibid. post lin. ult.

Vitis Idæa Mariana, Salicis pumilæ foliis firmioribus. Huic etiam aliquatenus accedit *Tlaozācali*, *Nova Hispan. Terentij apud Recc. 418.*

Vitis Idæa, *Oleæ sativæ* foliis, *Marilandica.*

Fol. 392. ad lin. 15.

Huic fortè accedit *Curviri Brasiliensium*, *Marcgr. lib. 3. cap. 9.*

Ibid. post lin. 19.

Vitis Idæa (forſan) parvis subrotundis elegantissimè crenatis foliis, Fruticulus ex *Groënlandia.*

Vitis Idæa (forſan) sive *Myrtillus maritima*, foliis & fructu grandioribus. Sempervivum marinum bacciferum, *Marcgr. fol. 13.* An *Portulacæ* facie maritima, fruticosa, erecta, amaricans; *Cat. Jam 88.*

Vitis Idæa Mariana, *Amelanchier lanato folio*, floribus albis ad Umbilicum ferè laciniatis.

Vitis Idæa Mariana, lanatis foliis, *Sassafras* in modum tripartitò divisis, floribus comosis. Hujus enim folium, quemadmodum & *Cotonææ* veluti *gansape*, densa lanugine tegitur, est quoque oblongum, & utrinque habet incisuras duas latas & profundas, instar *Ancilium*, quæ hodièque in nummis *Romanis* videntur apud *Goltziū in Fastis. fol. 206.* & aliis. Vid. *Lips. 5. Antiq. lect. 16.*

Ibid. ad lin. 38.

Vitis fructu minore rubro acerbo, folio subrotundo, minùs laciniato, subtus albâ lanugine recto, *Cat. Jam. 171.* Fortè *Cevalchichiltic* s. *Vitis sylvestris Hernandez apud Recc. 128.*

Fol. 393. post lin. 19.

ULMIFOLIA, Arbor baccifera *Ind. Orient. antirheumatica.* An fortè hujus sit cortex Arboris *Ulmo* similis ad *Catarrhos*, *Monardes cap. 43. Park. Theatr. Plant. 1663. Rheumatich Bark. Penainchedde Malabarorum.* An *Pacal Indis* arbor jam descripta minor, *Monardes Hist. Lugd. 1876. Monard. cap. 58. apud Clus. fol. 342.* Quanquàm ad *Ulmifoliam* Arborem *Africanam*, bacciferam, floribus purpureis, *Phytogr. Tab. 237. viz. Arborem* huic lineæ in *Almagesto* nostræ proximè præcedentem, hæc *Synonymia* dubitanter retulimus.

Ibid. post lin. 22.

UNJALA *Hort. Malab. Part. 7. Tab. 28. sive Frutex Indicus*, foliis rigidioribus ternis, quaternis, immò quinis, fructu orbiculari, compresso, fungoso, unicum semen complectente. Hujusmodi ramulum ante annos aliquot ære redemi proprio, non à *Naturâ*, sed à *Medico*, qui dono acceperat; nomini ejus parco, ne videat in eum concitator.

Fol. 393. post lin. penult.

URTICA major iners *Virginiana*, *Malabathri* folio trinervis, à *Mexcuriali Virginiana* majori, haud multum abludis.

Fol. 394. ad lin. 4.

An Urtica major racemosa, humilior, pungens, sed non urens, Cat. Jam. 38.

Urtica racemosa humilior, iners, ejusd. ibid. Verbenz botryoides major, Canadensis, Munting. libr. ampliff. nupèr edit. fol. 784.

Ibid. ad lin. 8.

An Urtica minor iners spicata, folio subrotundo, serrato, fructu tricocco, Cat. Jam. 38. si hæc planta non sit de numero Mercurialium.

Urtica minor iners Mariana, seminibus ex alis foliorum racemosis, non ramosis.

Ibid. ad lin. 11.

Post Eph. Germ. add. Miscellæ. Curiosor. Anni undecimi.

Ibid. ad lin. antepenult.

Post 1850. add. An Arbor papyrifera Japonina, ficulneo folio, Breyn. Prodr. 2.

19. Fortè etiam Pacocaatinga Brasiliensis arbor, Mart. fol. 102. Copia Americanorum, è cujus Arbore legitur Pix, ut è Pin. Jousan. Dendrograph. 79.

Quare an Tarretæ, (i. e.) Pixygradendos Insula Condore, Dampier. Circumnavig. 391. An Alogis similis succus Irituch & Ajawee gravis odoris ad picandum, JB. Tom. 1. 346. Quem Musæfoliis involutum accipiebat, Cl. Classus.

An Guajera Mart. 77. minus aptè queritur à Sleano. Prunus maritima racemosa, folio rotundo glabro, fructu minore purpureo, Cat. Jam. 183.

De hujus autem Synonymiis ex Phytographia nostra plurima exscripsit Autor, ac si sua essent, non dignatus illam citationis honore, adeo nimirum omnia voluit scire, aut scisse putari, Botanice, ille sine amulo maximus, ut vel in eo se ipso fretus, noluerit alieni nominis subsidio, gradum sibi facere ad gloriam suam.

Fol. 395. ad lin. 3.

An Quamochitl, f. Arbor fructus crepitantis tertia, Maizio similis, Hernandez apud Recc. fol. 94.

X.

Fol. 395. ad lin. 6.

POST Sesamoides add. Coronopifolia.

Ibid. post lin. 8.

XERANTHEMUM Sesamoides amara purpureo, Stachadis citrinæ foliis, inferioribus, supernis autem Ericaformibus, caulti appressis, flore longiore completo, ex Premont. Bon. Spet.

Ibid. post lin. 11.

Xeranthemum Stachadis Citrinæ foliis rigidis laevibus, pinguentibus, flore albo duriusculo, ex plurimis flosculis immarcescentibus parvis, summo ramulo glomeratis,

ris, conflato. An rectius, Agerato affinis *Africana*, *Stæchadis cærinæ* foliis aculeatis. Fortè *Polium Africanum*, *fruticosum*, *cinericeum*, *Amanni Charact. Plantar.* 362.

Ibid. ad lin. 23.

An Arbores quibus versicolor est *Matories*, de *Laet.* fol. 328. An *Jecuibã Brasiliensium*, *Maregr.* 127. Cujus lignum egregium est ad varia sculpenda. An *Nerio* affinis Arbor versicolora materie, laurifolio lucido, flore pentapetaloidæ, sulphureo, amplo, *Cat. Jam.* 155.

Fol. 396. ad lin. 7.

Add. Vid. Almagest. Bot. fol. 19. *Pl.* 20.

Ibid. ad lin. 12.

Morus fructu viridi, ligno sulphureo tinctorio, *Cat. Jam.* 128. An Lignum croceo tingens, *JB. Tom.* 1. lib. 4. 493. An *Americæ* lignum luteum, ex quo Aliqui suos parant enses, *Thevet.* Considerandum (inquit *J. Bauhinus.*) An tale quid insinuet *Serapio*, quando ex autoritate *Aben Mesuaj* tradit Virtz afferri ex Provincia *Jaiemen*, esse Corticem Arboris, ex quo paratur color similis Croco, sub Virtz nomine eodem loco, meminit aliarum Plantarum, ex variorum autoritate, de quibus suo loco.

Ibid. ad lin. 15.

An fortè hujus Arboris fructus, sine *Fagara* minores *Imperati*, *Hist. Nat.* 676. *Fagara* minor, *JB. Tom.* 1. 350. Cujus ramuli exemplar ab *Orientalibus* quoque *Indis* nobis aliquando adfertur. Huic etiam *Mouli-Ili*, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 34. Rectè referendam esse putamus, quanquam bacæ hujus minus convenire videntur.

Ibid. ad lin. 17.

Euonymo affinis, Arbor spinosa, folio alato, fructu sicco pentagono, & pentacocco, ligno flavo, Santali odore. La premiere sorte de bois espineaux jaune du *Terr.* 156. *Cat. Jam.* 38. Ubi plurima inter se maxime diversa, male confunduntur. Fortè etiam *Paliuro* affinis; *Ligustri* folia, spinosa, flore monopetalo difformi, fructu sicco, subrotundo; *eiusd.* *Cat. Jam.* 137.

Fol. 397. ad lin. 12.

An *Pacocaatinga* herba *Brasilensium*, *Maregr.* fol. 48.

Ibid. ad lin. 29. & ult.

Ad hoc genus Plantarum referendam esse putamus, *Zedoariam* radice lutea, *Hort. Amstelodamens. Breyn. Prodr.* 2. 105. Quam itidem eandem esse suspicamur cum *Cassumuniar* radice *Indicâ*, aliàs *Rysagone* dictâ, & aliquando sub titulo *Bangalee* ex *Orientalibus* nos habuimus; cujus usus in curandis plurimis morbis, & ad Corticis *Perviani* correctionem (ut dicitur) maxime valet; graviter at quibusdam non ingrâtè olet hujus Radix, & colore croceoringit.

APPENDICE.


- Fol. 398. ad lin. 7. add.*
Beta aculeata *Cretica*; sub hoc titulo à multis jamdudum accipiebatur.
Ibid. ad lin. 17.
 Variat interdum flore ex ceruleo & candido, elegantissime striato.
Ibid. ad lin. 56. post Lufit. add.
 Anonis forte non spinosa, procumbens, *Lufitanica*, flore purpureo, spicata; *Bregm. Prodr.* Ononis non spinosa, rotundifolia, spicata, purpurea, *Hispan. Bocc. Mus. Plant. 60. Tab. 48.* An Anonis non spinosa, purpureo flore, *3B. Tom. 2. lib. 17. fol. 393.*
Fol. 399. ad lin. 8.
 Samaca (forte) *3B. Tom. 1. 111. An Baobab, Presp. Alp. de Plant. Egypt. pag. 66.*
Ibid. ad lin. 52.
 An Rapunculus aquaticus, foliis Cichorei, flore albo, tubulo longissimo, *Car. Jam. 58.*
Ibid. ad lin. 57. post loc.
 An Cichorio affinis *Americana*, Floris Cardinalis folio, floribus villosis, rubris, *PBP. 323. Car. Jam. 58.*
Ibid. ad lin. 58. post Virginis add.
 Clematis *Virgin. Pannonica* haud abfimilis, foliis amplioribus subrotundis, flore ochroleuco. *Nobil.*
Fol. 400. ad lin. 10. post fig. 4.
 An Convolvulus rectus minor, folio angusto, candicante, *Car. Jam. 58.* Noster autem non omnino furrigit.
Ibid. ad lin. 14.
 An potius Elchryson minus *Africanum*, flore aureo, *ejusd. Bregm. Fascic. Rarior. 22.* Forte etiam Chrysanthemum frutescens, *Aethiopic. Rosmarini foliis, flore aureo, amplo; ejusd. Bregm. Prodr. 2. 32.*
Ibid. ad lin. ult.
 Fumaria amplexicaulis, Vesicaria; *48. Halm. Anni 1677. Obf. 14.*
Fol. 401. ad lin. 17.
 Deleantur *add. & quae sequuntur verba viz.* An Hypericum frutescens luteum, Phillyreae foliis, *Ban.*
Ibid. ad lin. 47.
 An Malva minor Supina, Betonicae folio, flore coccineo, seminibus asperis, *Car. Jam. 96.*
Ibid. ad lin. 49. post fig. 5.
 Huic (forte) congener est Katu-Kurka, *Hort. Malab. Para. 10. Tab. 90.* Quoad flores saltem, & eorum dispositionem; Hi enim in Vertice caulium in spicam compactiorem Congregati prope-
 rant, folio viridi, cuspidato, reflexo, luccineli, persico aureo pallidi, odoris grati, &c.
Fol. 402. ad lin. post Campanian. add.
 Clematis Passiflora trifolia, flore purpureo, *Munting. libr. ampliss. nostrae edis. fol. 584.* Ubi de-
 pictum invenies.

Laudate Deum qui facit ut germinet foenum ad Jumentum; & herba ad
 Hominis usum. *Psal. 104. Vers. 14.*

FINIS.

ADMONITIO.

Omisimus in hac Opella ex Plantis exoticis quamplurimas alias, quae in
 Herbario nostro Vivo inferuntur, quia nondum exactius Observare & eas
 Denominare nobis licuit.















XXXV. HAT.







HERBARIUM


















fol. 23. pl. 2.





fol. 26. pl. 2.



fol. 27. pl. 2.




fol. 29. pl. 2.



fol. 33. pl. 2.

M. Rader fuchs scul.

IVYX...ENT



San. G. ...

ca. ...




fol. 25 pl. 7.



fol. 22 pl. 8.



fol. 22 pl. 8.



fol. 27 pl. 2.

M. Vander Gucht Scul.

Urtica dioica



Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica

Urtica dioica



fol. 27 pl. 3.



fol. 27 pl. 1.



fol. 26 pl. 6.




fol. 27 pl. 4.


M. Vander Gucht Sculp.

1790 CCXXXVII










X. XXV. 111.



INFRUCTUUM






1025. 1771




with the ...


...


...




PLANT. MEDIC. III.












PLANTAE















PLANT. IND. 200. 1111




PLANTAE INDICAE



PLANTAE INDICAE
PLANTAE INDICAE
PLANTAE INDICAE



333-817



INDEX Totius Operis.

Numerus Folium, Literæ Librum designant. A. quidem Alma-
gestum, M. vero Mantissam.

- A**
Atenarchedde Malabar. M. 125.
Abanga & Caryocoe fructus. M. 144.
Abelicea Cretica. M. 40.
Abelmosch f. Moisch. Arabum. A. 14.
Aberus Ambrosini. M. 13.
Abhel Guilandino. A. 125.
Abiegna Clusii. A. 125.
Abies. A. 1. 2.
maritima. A. 118. 129.
Scotica. A. 297.
Abrotanoides arbor. M. 1.
planta saxeæ. A. 118.
Abrotanum. A. 2. 103. 362. M. 1. 330.
Abrus Alpini. A. 294.
Abs, Abes, aut Gulen. Arabum. A. 368.
Abinthium. A. 2. 73. 308. M. 1.
Abinthio-Scirpium similis. A. 58.
Abtus Vestingii. A. 341.
Abutijon-quitusa. A. 17.
Abutrio affinis. M. 109.
Acacalis Disewidii. A. 361.
Acacia. A. 3. 4. 5. 6. M. 1. 2. 131.
Acacia accedens. A. 96.
Acacie cognata planta. A. 43. M. 2.
Acacoyori Mexic. A. 80.
Acacia Brasiliensis. A. 307.
Acacia bacupus fructus. Acacia Pison. A. 29.
Acanthium & Acanthioides. A. 84. 85.
Acanthus. A. 6. 82.
Acapathis Mexic. A. 11.
Acasapuda H. Mal. M. 169.
Acarisoba Brasiliensis. A. 314.
Acarna. A. 85. 86.
Acatsjavalli H. Mal. A. 126.
Acaxaxon Mexic. A. 125.
Acaxothictl Mex. A. 314.
Acer. A. 7. 224. M. 26.
Aceris cognata. A. 91. M. 3.
Acetosa. A. 8. 15. 304. 398. M. 3. 6. 115.
Acetosa arborecentis folio. M. 3.
Achaovan Achin. accedens. A. 2.
Achillea Disewidii. A. 316.
Millefolia odorata. A. 103.
montana. A. 103.
Syracca. A. 103.
Achiotei Hernandez. A. 272.
Acinaria marina. A. 161.
Acinodendron. M. 4.
Acocortis Mexicana. A. 144.
Acornus Brasiliensis. A. 264. 306.
Acornum. A. 108. 267. 303. 357. 398. M. 63.
Accorus Asiaticus. A. 8.
Acrivola Italorum. A. 388.
Acrocardiodendros. M. 4.
Acrocorion Plinii. A. 212.
Acuilotl Mexic. A. 196. M. 108.
Aculeosa Gaze. A. 83.
Mauritanica. A. 8.
Adamaram H. Mal. A. 18. M. 12. 156.
Adamboe H. Mal. A. 16. 115.
Addeweepaula Gentilium. A. 16.
Adel-Odagam H. Mal. A. 33. 245.
Adenes Canadensis. A. 99.
Adharode Zeylanicum. A. 9.
Adiantum. A. 9. 10. 11. 150. 152. 155.
M. 51. 77. 78. 81. 82. 83.
Adiantum aureum. A. 256.
Adianthi capitula Muscus in Ericetis
18. A. 255.
Adonia pusilla Alopecuroides. A. 11.
pusilla Myofuros. A. 12.
Adrachne Theophrasti. A. 49.
Aduca-manjen H. Mal. A. 135.
Adundee Malabar. M. 36.
Ady Palmæ species. M. 144.
Adypson Plinii. M. 133.
Egilops f. Cerrus max. A. 399.
Eleagnus. A. 260.
Elchynomene. A. 251. 252. M. 131.
Ethiopsis. A. 184.
Aga Creticum. A. 84.
Agallochum Officinæ. M. 133.
Agallochi forte genus. A. 138.
Agaricus ex-Larice fungus. A. 164.
Agaty. H. Mal. M. 87.
Agavanus Creticus. A. 84.
Agem Lilag Persarum. A. 359.
Ageratum. A. 12. 103. 237.
Agerato affinis. A. 12. M. 191.
Agihaud Lycio affinis. A. 234.
Agnæst Scaligeri. A. 38. M. 18.
Agnus castus. A. 390.
Agouti-treva de Lute. M. 99.
Agria. f. Agri-folia glandifera. A. 197.
Agri-folium folio tenuiore. M. 108.
Agrimonia f. Enpariorum. A. 206. M. 113.
Agriomelodendros Americana. A. 21.
Agucata Pyrus. A. 38. M. 18.
Agupam Cassii. M. 23.
Aguape Brasiliensis. A. 266.
Aguaça Quinha Bras. M. 108.
Aguaça Quinha Pisonis. A. 249.
Aguaçima Brasiliensis. A. 247.
Agul Arabibus. A. 166.
Aguriguespo-Obi Brasiliensis. A. 79.
Anate vel Ate Pamlico. A. 37.
Able-poris Salweeni Hispanorum. A. 114.
Ahoaton f. Quercus parva Bern. A. 137.
Ahothoetl Mexic. A. 2. 125.
Ahuacaguanhiel Hernandez. M. 18.
Ahuapathis f. Chamedryi Mexic. M. 169.
Ahuapathis Tiliacensis. A. 43. 198.
Ainpariti H. Mal. A. 14.
Ajuga f. Chamapitrys altera Marti
N. 123.
Aizoon minus Matthioli. A. 341.
peregrinum Camerarii. A. 340.
Aizoi majoris ortu persimilis. M. 13.
Aizoides fusiforme. A. 170.
Akara-patsjotti H. Mal. A. 43.
Alabastrites f. Dentaria alba. M. 168.
Alaternus. A. 12. 13.
Albará Pisonis. A. 80.
Albazzapoti Mexic. M. 19.
Alcmna Eritæ. A. 217.
A'cea. A. 13. 14. 15. 16. 17. 206. M. 6. 7.
Alcharad Arabum. A. 3.
Alchimelech Pr. Alpini. A. 246.
Alchimilla. A. 18. M. 7.
gramineo folio. A. 302. M. 144.
Alchimille vel Perchipsia affinis. A. 314.
Alcyonium. A. 385.
Alectorolophos alpina Clusii. M. 147.
Alepoo Malabar. M. 137.
Alga marina. A. 119. 161. 162. M. 155.
Algodon Lestiani. A. 102.
Alhagi Arabum. A. 166.
Alhaur. A. 51. 304.
Alhuarbor Zanon. A. 154.
Alisma Matthioli. A. 121.
Monspeliensis. A. 118.
Taffani Caroli. A. 166.
Alkekengi. A. 357.
Allabuch Aricem. A. 388.
Allium Sphærico capite. A. 303.
Ambainensis. A. 18.
Juncifolium mollecharum. A. 252.
Orlinum bifolium. A. 112.
Allium f. Moly Virgatum. A. 116.
Almendras del Peru. A. 28.
Almuranera Terna Joannis Callimeda.
M. 174.
Alnus, Alnifolia, fructu, & Alno affi-
nis. A. 8. M. 7.
Alnus nigra f. Frangula. A. 157.
polycarpus. A. 97.
Alniestigie lanato folio. A. 288.
Alors. A. 18. 108. M. 8.
Americana fructu unci. M. 23.
Alopecurus tomentosa. A. 127.
Alpam H. Mal. M. 115.
Alpine. A. 20. 21. 22. 33. 34. M. 1. 2.
alpina juncio folio. C.B.P. A. 303.
Cc
aguis

INDEX

- 2003

INDEX

Africana myrrham fundens, M. 74.
amar, A. 391.
Americana reticulata, A. 360, 361.
Americana Lindophora, A. 144.
Aromatica Magellanica, A. 39.
Brasiliensis, ramis extremis; Vesp. nidiaceae Pison, A. 44.
Camphorifera Japonica, A. 79.
Canellifera Indica, A. 88, M. 39, 40.
sylic. fol. prograndi, M. 19.
Cardiaca Hernandez, M. 24.
Callian foliis v. *forens* Duss, A. 89.
Chiapensis Seyraensis fundens, Lull.
A. 24.
Cochinilla, A. 146.
Contrarius facultatibus donata, M. 86.
Coralli Americana, M. 150.
Guarantifera Raji, A. 124.
Tabacifera de Luit. Ind.
Ficus Nigra, I.B. 146.
Dei Pars, A. 124.
Diaboli Christianum, A. 144.
Dysenterica, M. 129.
ex Maris hinculho folio, A. 120.
erectis foliis umbilicatis, A. 266.
exot. fructu Dactylis simili, A. 276.
exot. fructu saccharoso Chamaemeli
dict., A. 98.
exot. Lenticis folio, A. 273.
exot. spinosa foliis Lenticis, A. 46.
ex qua Asis facida, M. 23.
ex qua Gummi Almasa destillat in
Angla, A. 44.
Fabifera Bos-Tajinking dicta, A. 293.
Fabifera trifoliata Salvia folio, M. 270.
Fago similis in Cathay, A. 243.
farinifera, M. 144.
farinifera venenati succi, M. 226.
fabrifuga Provinciae Juss., M. 229.
fibris, M. 144.
ferens folia argentea Zou, A. 229, 269.
ferens Strifolia Nieremberg, M. 60.
hainum Regenderum, A. 272, M. 142.
flagellifera, A. 395.
foliis amplif. fructu Cucumeris,
A. 145.
foliis laurinis Nerii vulgo, A. 48.
fructum Melonis facie profertem,
A. 125.
Guaiacana, A. 180.
Jacoumifol. fol. Fraxini, A. 373.
Iguia Hernandez, A. 263.
Indica anonyms torria Thapir, A. 293.
Indica dormiens, M. 178.
Indica Horib. & fructu in globum eg-
gregat, A. 203.
Indica Fraxino similis Olive fructu,
A. 269.
Indica Juglandis fol., A. 63.
Indica Nerii foliis splendentibus, A.
210, 263.
Indica Orientalis tederifera, M. 148.
Juda, A. 92.
lanigera spinosa, A. 172.
Lavandula folio Clusi, A. 223.
Leprosi fundens Copalli, A. 166.
licens fructibus Halicacabi, A. 258.
lucens Jamaicensis, A. 228.
Malabaricum fructu Lenticis, A.
43, 283.

Mangifera Indica, A. 43, 241.
Mamongo nucifera, M. 145.
Melonifera Papaya vulgo, A. 145.
Musina fructu Cathanum, A. 272.
Mystica Provincia, A. 266.
Muscum splendens, A. 128.
Myrti laurif. folio, Eleni fundens,
M. 25.
Naldicong Candou Parcheff, A. 228.
Papyrifera Japonica, M. 190.
Peponifera Bras. spinosa, A. 146.
peregrina ex Guinia, A. 124.
peregrina Roma Andr. Casalp., M. 24.
Pergamentifera, A. 275.
picta Hernandez, A. 193.
piscipula, M. 150.
Platani folio fructu Peponis, A. 145.
Popule similis resinosa, A. 228, 360.
racemosa Brasiliensis fol Malabathri,
A. 40, M. 4.
a Raia Linchuan, A. 241.
resinifera Tabacifera, A. 144, M. 42.
ruptura consolidans, A. 147.
Saccharifera Canadensis Ind., A. 7.
Salvifolia sericea, A. 326.
Santi Thoma Zann, A. 240.
Saponaria Pisoni, A. 92.
Sciencia, M. 225.
siliquosa Africana Geniste femine,
A. 122.
siliquos. Bras. siliq. tortuosa, M. 96.
siliquos. ex qua Gummi Anime distil-
latur, A. 96.
siliquos. Juglandis folio, A. 295.
siliquosa Malabar. cordato fol., A. 109.
Sinensis pinguedinem Sebi instat fe-
rens, M. 39.
spinosa ex Jova undè Cast., A. 160.
spinosa Fraxini fol. Virginiana, A. 98.
spinosa Indica americana siliquis, A. 4.
Sycophora Jamaicensis, A. 42, 145.
Tasamachacum liquidam fundens,
A. 160.
Thurifera, A. 292, M. 3, 119.
Tigridis Nierembergii, A. 393.
tindoria I.B. A. 308.
tindoria Virginiana Multis, A. 181.
trifolia Indica I.B. A. 297.
trifolia Indica, M. 46.
venenata laurifolia Strabo, A. 86.
venenata quorundam, A. 181.
Vespertilionis Indica Lenticis fol.
A. 202.
Vespertilionis maxima, A. 294.
viminalis ex Antago, A. 240.
Violatum Indica, A. 262.
Vomitaria Hernandez, A. 293.
Arbori Brasiliensis affinis, M. 136.
Arbore Indica que pendens Nidi a Orelli,
M. 176.
Arbore quibus verticulus est Materis,
M. 197.
Arbutus, A. 491.
Archam arbor Indica, M. 116.
Bechangel Barbados. Angli, A. 141.
335, M. 129.
Archangelica Park, A. 203.
Becham and Corda Nephritis, A. 275.
Arctium Discurti, A. 205.
Arcturus Critici Belli, A. 382.
Arduapallo Malabar, M. 270.

Arnica H. Mol., A. 144.
Arcia f. Fausel, A. 277.
Arenaria I.B. A. 23.
Argan f. Ergum. nux., A. 306.
Argemone, A. 279.
Argentea Prosp. Alpina, A. 194.
Argyrea Gnapaleidi affinis, A. 398.
Aria Thophrasti, A. 248.
Aria-bepou f. Nimbo Ariste H. Mol.
A. 269.
Ari-veala H. Mol., A. 280.
Arifarum, A. 52, 53.
Aristolochia, A. 29, 30, 114, M. 27.
Arkafondi f. Akafond. Zann, A. 247.
Armeria, A. 87.
Arnicae Malabar, M. 98.
Arna Ouero Anavareca Zann, A. 398.
Aroeira Lusitana, A. 319.
Arpus Mesocitii, A. 247.
Arravenam pondo Malabar, M. 9.
Artemisia, A. 80.
Artemisia, A. 50, M. 1.
Arti. f. Alla arbor. in Insula Seler, M. 86.
Artis vulgo, A. 373.
Asplenium, M. 124.
Arvida folio Canariensis Hispanis,
A. 329.
Arum, A. 50, 51, 52, M. 27, 28, 16.
Arundo, A. 12, 53, 79, 80, 177, M. 28.
Astaria, A. 191, 283, 314.
Astarum, A. 73.
Asni folio, planta Ethiopica, M. 128.
Asclepias, A. 35, M. 26, 27.
Ascyrum, & Ascyroides, A. 189, 190,
M. 104.
Asjoram H. Mol., M. 27.
Aspalathus, A. 199, 166, M. 66, 89, 139.
Alparum, A. 13, M. 28.
Asperula & Asperula congener, A. 14,
324, M. 39, 163.
Aphodius, A. 44, 53, 289, M. 29, 242.
Aporis Thophrasti. putata, A. 309.
Ailhogomaram Malabar, M. 21.
Africa Zann., A. 240.
Aster, A. 55, 56, 57, 58, 65, 99, 100, 101,
117, 149, 336, M. 29, 30, 65.
Asteris Rhod., A. 396.
Astragalus & Astragaloides, A. 58, 59,
60, 111, 227, 269, 273, 274, 391, M.
30, 142, 143.
Astrantia, A. 198.
Atamaram, H. Mol., A. 32.
Atamulco, A. 220.
Atapaulum Malabar, M. 14.
Ataspalei Mexicana,
Atchuspallia Hernandez, M. 98.
Atenihuiel Nvo. Hsp., M. 147.
Atropocathia Hernandez, A. 101.
Atrexalysoides. Nvo. Hsp., M. 85.
Atitara Margrevis, A. 270.
Atitara, A. 212.
Atlatonothli Hernandez, A. 147.
Atlatopillan, f. aquosa herba appensi
Hern., A. 14, M. 6.
Atlinam Mexicana, M. 35.
Arochist. 3. Nierembergii, M. 52.
Atragene quibdam, A. 109.
Atriplex, A. 60, 61, 62.
Attrachylis, A. 82, 86, M. 38.
Atroxoch-Cortic-Yui Rodulio Hern,
A. 23.

INDEX

- Avacari forte *Indurum* Garciae, M. 134.
 Avacari, f. Citavanacu H. Mal. A. 319.
 Avaramo-Temo *Brassiliana*, A. 95.
 Avaree *Malabar*, M. 169.
 Aucadhamaree *Malabar*, A. 267.
 Avellana, A. 121. M. 57.
Americana quadrifida, A. 139.
Indica verticillata, A. 275.
Indica Clusii, A. 39.
Indica minor, f. *Indica*.
Mexicana Guilandini, A. 40.
 purgatrix, A. 320. M. 161.
 Avellana *Indica* genus oblongum Clus.
 A. 265.
 Avena, M. 30.
 Avenqua *Lafianus*, A. 11. 159.
 Avelut, A. 2.
 Avicularia *Sylvi*, A. 78.
 Aumanamaram *Malabar*, M. 144.
 Aumanadundoo *Malabar*, A. 47.
 Auris Allobrogum, A. 86.
 Auricula leporis, A. 73.
 Auricula leporis affinis, *Odentitis* In-
 tea, A. 287.
 Auricula marina, A. 162.
 Auricula muris pulchro flore, A. 23.
 Auricularia *Indurum*, D. Marlot, M. 129.
 Auverchedde *Malabar*, M. 52.
 Azuba *Opidi*, A. 45.
 Axi filique in *Hispania*, A. 353.
 Axibuitapapat lachis *Hern*, M. 187.
 Axiparlis *Hernandez*, M. 72.
 Axizcuro-Huizpatli-Yanguitlanensis
 Mex. *Hern*, M. 62.
 Axochiati de Colan: *Hernand*, A. 235.
 Ayacachquahoi *Nov. Hisp. Rec.*, A. 15.
 Ayauicuramo *Thaculelquahuit* *Hern*.
 A. 393.
 Ayri radix, M. 126.
 Ayri, vel Hayri *Brassiliana*, A. 277.
 Azederach & Azederach, A. 62.
 Azadirachta *Indica* foliis *Fraxini*, A. 269.
- B.
- Baccatis *Africana*, M. 71.
Americana suaveolens, A. 149.
 Baccatis, Rauwolf, M. 91.
 Baccatis, A. 117.
 Baccatis purpureis nudis, M. 71.
 Baccifera arbor calycularia *Jamaica*,
 M. 119.
 officulo compresso lunato, A. 59.
 Badiany *Silvestris*, M. 70.
 Badu-karime *Bengalensis*, A. 294.
 Badukka, H. Mal. A. 36.
 Babai-Coyolli, Mexic. A. 275.
 Bala, f. *Muth* *Sarapiensis*, A. 145.
 Balam-pulli, f. *Maderam-pulli* H. Mal.
 M. 361.
 Balangas arbor *Sycophora*, M. 21.
 Balanus *Myreplica*, A. 45. 353.
 Balanitis flore pleno, A. 249.
 Balsamifera arbor, A. 63.
 Balsami *Peruviana* fructus *Indica*.
 Balsamina Cucumertina, A. 123. 269.
 Balsamina flem, A. 62. 64.
 Indica repens, A. 282. M. 146.
 Balsamum alpinum, A. 1-6.
 Caprarium *Antiguanum*, A. 331.
 Balsam-Sypte, A. 92.
 Baltracan in *Tartaria* nascens, M. 155.
 Bamia J.B. A. 16.
Ethiopica, filique decagona *Indica*.
 Bamie aligustenus affinis *Sabdariffa*,
 A. 15.
 Banamfrusinus in *regno Congo*, A. 145.
 Banata & Bananeta, *Indica*.
 Bandura *Cingalesis*, A. 394.
 Bangalee *Orientalis*, M. 191.
 Bangue *Indurum*, A. 80.
 Bankaratti H. Mal. A. 194.
 Baramarea H. Mal. A. 192.
 Barba Capri, A. 392.
 Barba *Tovis* arbor, A. 227.
 Lagopoides *Cretica* *Indica*.
 minor *Lusitana*, M. 120.
 pumila, A. 227.
 Barba *Nipuni* *Neurono*, A. 120.
 Barbarea minor *perennis*, M. 69.
 minima, A. 137.
 muralis, A. 70.
 Bardana, A. 295.
 Baruce fructus & pluribus nocibus ar-
 boris *Hurn*, A. 266.
 Basella H. Mal. A. 253.
 Basella *Zanmi*, *Indica*.
 Basilicum *Indicum* *Sylvestre* *Zanmi*, A. 268.
 Bastum monile *Hernand*, A. 266. M. 89.
 Bastum *Indica* *Lusitana* *Brassiliana*, A. 25.
 296.
 Basse-Cree, A. 41. M. 75.
 Basse-Cree, A. 92.
 Basse-Locus *Barbadosensis* *Anglia*.
 A. 225.
 Batata purgativa *Hernand*, M. 53.
 di purga *Pisonis*, A. 114.
 Batatas *Camores* *Hispanum* *Indica*.
 Capraris, A. 292.
 Batta-Valli, H. Mal. A. 181.
 Batti-Schofigenam H. Mal. A. 394.
 Baxaga arbor, M. 23.
 Bellifera arbor in *America*, A. 43.
 Bellii fructus *Labellii*, A. 92.
 Bean-Cree, M. 30.
 Bean-Cree, A. 292.
 Bean-Cree, A. 144.
 Becabunga dicta, A. 383.
 Beech-Whet, M. 74.
 Beedchamerca *Zingibifera*, A. 13.
 Beed-Whet, A. 395.
 Been album vulgo, A. 231. 232.
 Beene H. Mal. A. 64. M. 153.
 Beeha H. Mal. A. 53.
 Behen album *Rauwolfii*, A. 141.
 rubrum *guilfordii*, A. 220.
 Beidelfar *Alpinus* & Beidelfar *Offic.*, A.
 34. 35.
 Bel-adambu-walli, H. Mal. A. 193.
 Bela-Schona H. Mal. A. 286.
 Be'droga *Lusitana*, A. 303.
 Bel-Ericu H. Mal. A. 35.
 Beli *Bengalensis*, A. 125.
 Felliam P. Mal. M. 49.
 Be ingela *Lusitana*, A. 350.
 Be-i-Tajira H. Mal. A. 379.
 Bella-Donna, A. 220. 341.
 Bellamodagan, H. Mal. A. 361.
 Belladonna, A. 68.
 Bellis, A. 64. 65. 66. M. 31.
Africana *Coronopi* fol. A. 100.
Canadensis *purpurea* *Clusii* *Nurjo*, A. 99.
 Cereus, A. 335.
 leucanthera conyzoid. *Parmice* fa-
 cie, A. 56.
 lutea *Dalcham*, A. 57.
 folio subrotundo. C.B.P. A. 102.
 montana frutescens, A. 335.
 Bellura-Kanneli H. Mal. M. 39.
 Belmoschus *Egyptia* *Hern*, A. 14.
 Belotere H. Mal. A. 17.
 Belutta-adeca-manjeu, H. Mal. A. 33.
 Belutta-Arelli H. Mal. A. 262.
 Belutta-Modella-muccu H. Mal. A. 288.
 Belutta-pola-taly H. Mal. A. 219.
 Belutta-Tsompacum H. Mal. A. 99.
 Bem-moenja H. Mal. A. 66.
 Bem-nosi H. Mal. A. 390. M. 161.
 Bem-Schetti H. Mal. A. 196.
 Bem-Tamara H. Mal. A. 267.
 Bena-patja H. Mal. A. 182.
 Bengiuri H. Mal. A. 320.
 Ben-kara *Indica*, M. 57.
 Benka-lesjam H. Mal. A. 66.
 Ben-pala H. Mal. A. 369.
 Benzoeil fructus, A. 381.
 Benzoinifera sur Arbor *Benevifera*,
 A. 42.
 Ber *Indica* fructus *Jujubino*, A. 199.
 Ber *Indica* affinis *Laccifera* M. 85.
 Berberis & Berberidi affinis, A. 66. 67.
 M. 31.
 alpina *Critica*, A. 234.
 Berberidis facie spinosa, A. 234.
 Berberis *Opiper*, A. 374.
 Baretinus fructus *Clusii*, A. 211.
 Berula *Tatars*, A. 385.
 Beta, A. 67.
 Beta folio *Malabarica* semine *lappaceo*,
 M. 117.
 Beta-baccifera *Beyra*, A. 253.
 Betonica, A. 67. M. 31.
 Betonica coronaria f. *Tunica* mini-
 ma, A. 233.
 Beron, f. *Tunica* minima. similis plan-
 ta, A. 22. 233.
 Betonica *Pauli*, A. 384.
 Berre, f. *Betelle*, T.B. A. 67.
 Berula, A. 67.
 Berys vel Berre *Pisonis*, *Indica*.
 Berys femina *Pisonis*, A. 297.
 Beut-Wheat *Skinneri*, M. 74.
 Bezudo del Pera, T.B. A. 109. M. 51.
 Bezou-But, M. 2.
 Bezucus *Nicotiana*, A. 391.
 Che-Biche-Cree, N. 44.
 Bidens *Indica* *Hieracii* folio, M. 47.
Americana *Aspi* folio, M. 47.
Canadensis latifolia, *Indica*.
 Bidsjam-Hierac *Malabarica*, A. 344.
 Bidsjam-Poeteh *Malabarica*, *Indica*.
 Bifolium, A. 270.
 Bignonia *Americana*, M. 30.
 Bilimbi H. Mal. A. 238. M. 36.
 alba minor H. Mal. A. 45.
 Billingsby *Bent*, A. 238. M. 36.
 Binta *Zeylanica*, A. 253.
 Bintamburu *Zeylanica*, A. 174.
 Birad *Indurum*, M. 12.
 Birli *Lusitana* *Zanmi*, A. 276.
 Bisfermas *Camara*, A. 185.
 Bisforta, A. 67. 68.
 Biti *Malabarica* accedens, A. 67.

INDEX.

- Bipenthes Hordasiana, A. 168, 303.
Biotropis, A. 397.
Black-bone, Arabidopsis angustifolia, A. 146.
Black-berried, A. 63.
Blackberry of St. Helena, M. 6.
Blattaria, N. 11.
Blatterfloss Hollandia, M. 132.
Blitum, A. 68, 69, M. 32.
Blitum angustifolium verticillatum Bosc.
M. 113.
Boe-keloor van Rhin, A. 355.
Bodagah Paludina, M. 162.
Bo-gajah Cingampur, A. 144.
Bois de Café, Rochfort, M. 151.
Bois de Rose, Rochfort, M. 140.
Bon, vel Ban, Item Buna, A. 69.
Botanica, A. 143.
Botanische, A. 190, 191.
Bonduch Pene & Zami, M. 143.
Bunifolia, T. Hülligau, A. 309.
Bouquet-Pepier, A. 353.
Bonus fibris vulgo M. 32.
Borago, A. 72.
Borri Borri Indorum, A. 397.
Botia-ota, A. 106.
Botrys, A. 68, 97.
Botrys Cypris Curatrum, M. 117.
Brachyglottis Diaphyllidis Zam., A. 315.
Brami H. Mal. A. 302, M. 9.
Branchomela Lufitana, A. 330.
Branchura-Urtica Gwamara, M. 355.
Brafina Piperis genus, M. 151.
Bredia, A. 69, 70, M. 32, 33.
Brylvetria minor, A. 261.
folio Nymphaea Cajou-A. ID. M. 138.
marina, f. Solimanella, A. 113.
Bryonia, M. 143.
Bryonia et Chalk, A. 194.
Bridonema, M. 43.
Britannica Antiquorum Mundi, A. 109.
Conyzoides, A. 57.
Quorand, & Praxarthra, A. 105.
Brom-leaf Nephrolepis, M. 140.
Brom-leaf Sparganium, A. 144, M. 75.
Brodiae Condoleo, A. 235.
Brown Jelly, Neotrichia dist., A. 350.
Brunella, A. 70, M. 33.
Bruta arbor Plinii, A. 302.
Bryonia, A. 70, 71, M. 33, 137.
Bryonides, A. 71, 98.
Dryopteris, Prov. Nov. Syd. A. 377.
Bucania fusiformis, A. 140.
Bucania phytum, A. 71, 72.
Buck-Organs, Arabidopsis angustifolia, A. 139.
Buck-sage, M. 74.
Buedenda Zamui, A. 45.
Buena Nacha Hispanorum, A. 114.
Daphnium, A. 72, 126, M. 33, 34.
Echioides Indicum, A. 142.
marinum incabum, O. A. 306.
Bugula, A. 73, M. 34.
Bule H. Mal. A. 37.
Bulboacanthum, A. 73.
Coniophyton Camer., A. 359.
Bulbus eriphorus Orientalis, A. 186.
oblongus Ethiopius, A. 130.
Bulla-Weg, A. 306.
Bunium Deutschmilleri, M. 129.
Bupariti H. Mal. A. 17.
Bupaularian, Malabar, A. 89, M. 106.
- Bupthalimum, A. 73.
Abrotani fol. Cap. Sw. 3, A. 194.
African. tenuifol. Willd. A. 109.
Cotule lenio, A. 103.
Discordia, A. 103.
lanuginos fol. Müllerboli, A. 103.
majus Limieri, A. 64.
peregrin. Fr. Alpini, A. 102.
verum Dutschmilleri, A. 103.
Dupleurum & Dupleuri familia, A. 73.
M. 34.
Buria pafforis alpina rosea, M. 102.
Buria pafforis familia, A. 70.
Buttantum, A. 182.
Buxus & Buxifolia frutex, A. 74, M. 34.
Byfini aurei herba Siliam, A. 203.
- C
Caapija Brasiliensis, A. 53.
Ca-apije alata species Pisces, Bid.
Ca-ataya Bras. Marcy, A. 337, 338.
Cashira unde sit Aub. A. 112.
Casicia Brasil. 372.
Caseo Marcy, A. 251.
Caaghiyyo Pisces, A. 40, 58.
Ca-opia Brasil. Pisces, A. 108.
Casapungua vertia Pisces, A. 270.
Caspeba Brasiliensis, M. 114.
Casponga prima Pisces, A. 27.
secunda Pisces, M. 114.
tertia Pisces, A. 304.
Casporiraga Brasiliensis, A. 338.
Cast-Veal H. Mal. A. 180.
Cabbage-Weg, A. 276.
Cathartus, A. 399.
Caba-Iba Marcy, A. 63.
Cabure-iba Pisces, Bid.
Cathartus Brasiliensis, Bid. A. 27.
Calacia, A. 74.
Americana Part. A. 140.
Virgin folad calacanthifolia, A. 142.
Calacic Nov. Hisp. M. 147.
Camelinocochlid Brasilia, M. 147.
Camantic Thapoukionii Mex. M. 53.
Caezanilla H. Mal. A. 353.
Canacochil Mex. Hisp. A. 147.
Cacio Acute, A. 40.
Cacao affinis frutes, M. 122.
Caspatis Brand. M. 118.
Cecapelon Nov. Hisp. M. 46.
Cacava Quakeri f. Arbor Cacavi Her.
A. 40.
Cacavazochil f. Flus Cacavi, Her.
A. 70.
Cacoxochil Niernburgi, M. 146.
Cachakallille Guellima India, M. 313.
Cachimia potum in fide Caribbi, A. 32.
Cachos Hordasiana, M. 173.
Cachuquai Nov. Hisp. Bosc. A. 77.
Cachrya, A. 74.
Cachochil Nov. Hisp. A. 243.
Cacubalus Plinii, A. 358.
Cadefi Indie M. 39.
Cadelari, H. Mal. M. 11.
Cadel-Avantes, A. Mal. A. 140.
Cafirconda H. Mal. A. 140.
Cajuba & Cahaja, A. 76.
Cajao arbor Indica, A. 293.
Caiconen-pala H. Mal. A. 373.
Cajous, A. 28.
- Capa-Schore H. Mal. A. 180.
Casilie, A. 197.
Calabura alba & rubra, A. 75.
Calaf f. Ben Alpini, M. 165.
Calamintha, A. 75, M. 33.
Calamistrum herba aquatica alpina,
A. 170.
Calasपालुंग Malabar, M. 130.
Calcicola D. Martz, A. 182, 183, M. 101.
Calitrag, A. 86.
Calendula, & Calendula affinis, A. 75.
104, M. 35.
Chelyanthemoides Brya, A. 195.
Cali B. A. 102.
Vermiculari mariae non diffini-
lis, A. 196.
Calishor Rochforti, A. 157.
Callipiles Malabar, M. 301.
Callavance, A. 189.
Callerealis Malabar, M. 77.
Callitriche Plinii, A. 31, 357.
Calochortis Oregon, A. 31.
Caltha, A. 74.
Camacari Brasiliensis, A. 393.
Camanaya Marcy, A. 146.
Camara Pisces, Marcy, A. 107, 136.
Camarinas fructus, A. 106.
Camarinhas discoloratus, A. 136.
Camaru Brasiliensis, A. 373.
Camarotoncopolis Brand. A. 77.
Camborchede Malabar, M. 33.
Cambui Peruviana arborea, A. 97.
Cambuy tertia species Pisces, A. 299.
Camoti H. Mal. A. 369, M. 163.
Cammaleptum Malabar, M. 23.
Camopallic Nov. Hisp. Bosc. A. 120.
Campanileve Caribbi, A. 133.
Campanilla B. A. 187.
Campanilla A. 75, 76, 77, 78, M. 35, 10.
exotica Adm., A. 113.
Indica B. Bosc., A. 113.
Iura Linifolia, A. 114.
Lychnides, A. 117.
Camphora & Camphora familia, A. 79, 399.
Camphorides arab. A. 79.
Canambaya Brasiliensis Marcy, A. 296.
Canari Malabar, A. 297.
Can-Cad Siliam, M. 97.
Cantie-Rotund, A. 126.
Cantie-Weg, A. 260.
Cantie-Weg, & Cantie-Ezer Ogile.
Bid.
Canella B. Bosc., A. 114.
Caninga arbor Her. A. 49.
Caniram H. Mal. A. 140.
Cane intersector f. Hordasiana Her.,
M. 179.
Canna d'Acqua Lufitanis, A. 93.
Canna Indica, A. 79, 80.
Cannabilla Indica Stapalii, A. 140.
Cannabinna aquatica, A. 100.
Cannabis, A. 80.
Iutea sterilis Camer., A. 317.
spuria Urtica facie, A. 209.
sylvestris quondam, Bid. A. 117.
Canficent-pou H. Mal. A. 140.
Canfichi Malabarica accedens, A. 43.
Cansjan-Cora, H. Mal. A. 43.
Canabrica Plinii, A. 116.
Caoba Wormii, A. 395.
- D d Caupp

INDEX.

Chaipoondoo

INDEX.

pentaphylla

INDEX.

- all vegetation

INDEX

- Alnus. Et ut talis recte denominatur in Catalogo. Hort. Baccanum. ut suo loco habeatur.*
- Coryli folio Prunex convolvulaceus, A. 121.**
- Corymbifera Millefolii umbella, A. 308.**
- Costa Canariensis, A. 149.**
- Costic-Kibuiti Nvo. Hiss. A. 159.**
- Costi quoddam genus, M. 91.**
- The Costic-Tree of Parkinson, M. 57.**
- Costus amara dicta, A. 207.**
- Arabia, A. 397.*
- Idem redolens, M. 93.**
- Cotoneaster, A. 248.**
- Cotinus, & Cotino affinis, A. 121.**
- Cottam species H. Mal. A. 268. M. 22.**
- Cotula, A. 97. 98.**
- Cotyledon altera Clus. A. 339. 340.**
- altera Disfioridi, A. 362.*
- altera Matthioli, A. 330.*
- aquatica, A. 314. 331.*
- stellata, A. 340.*
- Covallum H. Mal. A. 125.**
- Coubage vulgo, A. 292.**
- Coubage-Tree, M. 162.**
- Courbari Cariborum, M. 44.**
- Corundi H. Mal. & Corundi Zanen. M. 156.**
- Courou-Moelli H. Mal. M. 123.**
- Couton arbor Juglandi similis, A. 38.**
- Crococypote Clusii, M. 19.**
- Coyolli Mexicani, A. 275.**
- Coyotomati, f. Tomati Coyoti Her. A. 352.**
- Conochitis Mex. Her. A. 146.**
- Cozticacvilot-Xochitl Nvo. Hiss. M. 49.**
- Cozticpatlis, f. Cananensis Hernand. A. 364.**
- Cozticpatlis secunda Her. A. 363. M. 172.**
- Coztic-Kibuiti Mex. Her. A. 300. M. 153.**
- Cotomati Hernandez, A. 352.**
- Ceanothus, A. 392.**
- Crassula major A. 362.**
- Crataegus Theophrasti, A. 249.**
- Cratogeomum, A. 245.**
- Pisum-laudium, A. 143.*
- Cremenei sibi TB. A. 160.**
- Crepis Dulchampsii, A. 183.**
- Crisis Apulii, M. 152.**
- Crista galli major Italica, A. 142.**
- spicata flore luteo, A. 283.*
- Crista pavonis, A. 102. 194.**
- Cricium maritimum, A. 58. 121.**
- Crocodyliades Africana, A. 86.**
- Crocodylium, A. 85.**
- Moschellanus, A. 333.*
- Crocus Aschipsii, M. 58.**
- Crocus Indicus, f. Curcuma, A. 125. 397.**
- Croc-grass Bermudaensis Anglii, A. 174.**
- Crotalaria, A. 123. M. 58.**
- Cruciata, A. 324.**
- Cruciata marine similis, planta Ind. Or. A. 122. M. 154.**
- Cruet Javanicum, A. 394.**
- Crupina Belgicum, A. 93.**
- Crux St. Andrea, A. 189. M. 104.**
- Cucacu-Mandiba Pisoni, A. 71.**
- Culambu Brasiliense, A. 87.**
- Cubebifera arbor potata, A. 43. 122. M. 26.**
- Cubebis affinis, A. 153.**
- Cubebis affinis Fagara maj. CBP. A. 143.**
- Cuthamilepitha Malabar. M. 96.**
- Cucullaria quibuldam, M. 151.**
- Cucumis, A. 123. M. 59.**
- Flos Passonis dictus, A. 281. 282.**
- Cucurbita, A. 286.**
- Cucurbitifera arbor, A. 123. 124. 125. M. 59.**
- Cucurbitifera trifoliata baccata similis, M. 60.**
- Cudu-pariti H. Mal. A. 172.**
- Cuechiliz-Tomati Hernandez, A. 353.**
- Cueyauh-Quilic, Nvo. Hiss. 303.**
- Cugua-curemia Pisoni, A. 71.**
- Cujete Margravii & Pisoni, A. 124.**
- Cupouna Brasiliensis Pisoni, A. 246.**
- Cuiclapalli Hernandez, A. 45.**
- Culcas f. Colocasia Fr. Alpin. A. 50.**
- Culitamar H. Mal. A. 326.**
- Cullecaucania Malabar. M. 54.**
- Cumana arbor Lactii, M. 22.**
- Camandata Brasiliensis, A. 291.**
- Cumane nuci similis TB. A. 365.**
- Cumboopillee Malabar. M. 94.**
- Cumbulam H. Mal. A. 286.**
- Cuminum sylv. capitalis globosis, A. 130.**
- sylv. alterum filiquos, A. 183.*
- Cumula Malabar. M. 21.**
- Cu tio forte Sinenfium, M. 2.*
- Cumme Javanicum, modernis, A. 43.**
- Cungee Malabar. M. 25.**
- Cunhet Malatii Linschot. A. 397.**
- Cupameni H. Mal. A. 248.**
- Cupa-Veela H. Mal. A. 280.**
- Cupi Malabarica accedens, A. 125.**
- Cupirri Mexic. Hernandez, M. 160.**
- Cupressu-pinnatus, A. 136. 361. M. 69.**
- Cupressus, A. 125. M. 61.**
- Echinops coronata Dr. M. 45.*
- Curamchedde Malabar. M. 19.**
- Curbifolium, A. 350.**
- Curcardietus, & Faba purgatrix, A. 319.**
- Curcuma, A. 125.**
- Veteraniorum Virginianum, A. 280.*
- Curini & Carim-Curini H. Mal. A. 126.**
- Curant Pepper, A. 154.**
- Curvici Brasiliense, M. 189.**
- Curupicaba Brasiliensis Pisoni, A. 120.**
- Curucu-pala H. Mal. A. 43.**
- Curutzeti Mexic. Hernandez, M. 134.**
- Cuscuta, A. 126. M. 61.**
- Cusfermout Tovarum, A. 337.**
- Cusfara-Apple, A. 32.**
- Cusudo Brasiliense Pisoni, A. 88.**
- Cyanus, A. 126. M. 61.**
- alpinus capite pennato, A. 191.*
- arboresc. longifol. Fr. Alpin. M. 105.*
- arboresc. altera styracis fol. Fr. Alp. A. 141.*
- arboresc. Styracis folio Africana, M. 58.*
- Ceantoides fruticosa, Cap. R. Spei, M. 105.**
- Cesticus spinosus Belgicum, A. 192.**
- Linii folius repens TB. A. 141.**
- permarus repens fol. Lavendula, A. 192.**
- pulehro semine, A. 93.**
- repens latifolius, CBP. A. 193.**
- sylvestr. Kary-lavendula, Thalii, A. 191.**
- spinosus Cesticus Poca & Fr. Alpin. A. 400. M. 175.**
- Cydonia exotica CBP. A. 125.**
- & Bengala. Acolia Ind.*
- Cymbalaria, A. 123.**
- Cymnum lativum, A. 125.**
- feminibus villosis, A. 129.*
- Cynara Indica, M. 13.**
- Cynocrambe legitima Poca, A. 280.**
- Cynoglossa affinis, A. 126.**
- Cynoglossum, A. 126. M. 61.**
- pusillum Narbonne, A. 206.*
- Cynophallophorus, A. 126. 127. M. 52.**
- Cynorinchium, M. 62.**
- Cynosbates & Cynorhodon Officinar. A. 322.**
- Cynoschis, A. 271.**
- Cynoxylum, A. 127.**
- Cyperus genus ex India CBP. A. 125.**
- Cyperus graminifolius, A. 127. 128. M. 62. 98.**
- maritimus capitulis glomeratis, M. 109.*
- Cypore similis nuci Balsami Peruvian TB. M. 19.**
- Cyprus Disfioridi & Plinii, A. 217.**
- Cyrtis quodammodo affinis, A. 129.**
- Cyrtis-Spartium aculeatum Ind.**
- Cyrtis, A. 128. 127. 143. 274. 375. M. 63. 87.**
- arbores bituminosus, M. 130.*
- D**
- Daburi folliculatus, A. 172.**
- Dadus Americanus, A. 147.**
- Damar Indicum, resine genus, M. 42.**
- Damasonii species quibuldam, A. 182.**
- Damor Sinenfium L'Anslum Indic. M. 90.**
- Damajen Tree, Barbados Anglii, A. 306.**
- Daphnoides Plinii, M. 26.**
- Dart-Tree, A. 80.**
- Dartman, A. 234.**
- Datura fetida, f. Tatura, A. 358.**
- Datura Indica Breyn. A. 106.**
- Davadarre Malabar. M. 26. 167.**
- Daucus, A. 129. 130. 216. 333.**
- pratensis Dulchampsii, M. 139.*
- Auriculata Thalii, M. 147.*
- Delphinium, A. 129.**
- Dendrobryon genculatum Poca, Cal. A. 234.**
- Desfioridi, A. 240.**
- Dentaria, A. 130. 131. 400. M. 63. 64.**
- Buguloides Montalii, A. 142.*
- monophyllos, A. 167.*
- Dentaria affinis polymorpha, A. 132.**
- Dentellaria Rindleri, A. 212.**
- Lychnoides scandens, M. 153.**
- Dispensia & Sanicula masdubi, A. 206.**
- Dictamnus adulterinum quibuldam, A. 242.**
- Dictamnus albus vulgo, A. 157.**
- Echinicus, M. 64.*
- Creticus, A. 131.*
- Lidius & masdubi Stylis Ind.*
- secunda Theophrasti Poca, A. 242.*
- Virginianum, A. 110. M. 52.*
- Digitall affinis, A. 400. M. 99.**
- Digitalis, A. 131. M. 64. 65.**
- minima Gratiola dicta, A. 180.*
- Diakodali Zeylanicum**
- Dillo-Tree, A. 147.**
- Dils Sotran, A. 162.**

INDEX

- [illegible]

INDEX.

Fongellus, *Mithridaticus*, A. 163.
Fungus, & Fungis affinis, A. 162, 163,
164. M. 86.
Fungus, A. 396.

G.

Gacima *Nierembergii*, A. 92. M.
22.
Gaidaro-Thymum *Ovatum*, A. 346.
Galacorta *Wholeri*, A. 337.
Galactoxylon, A. 164.
Galanga citale accepta, A. 127.
Galata & verticillata *Persice folio*,
A. 180.
Galega *Aegyptiaca*, A. 339.
nemorensis *Verna*, A. 273, 274.
Galega affinis *Malabarica*, M. 87.
affinis *Sophora dicta*, A. 342.
legener folio singulari, M. 87.
Galega unifolia flore herbaceo, M. 87.
Galeopsis, A. 203, 204, 338, 345.
species lutes, viscida, odorata, A.
185.
Galli crus, A. 177.
Gallitrichum & Gallitricho affinis, A.
185, 186, 345.
Gallium, A. 324.
Gambodi titulo inscripta in Ind. Or. A.
210.
Ganti radix ex China, A. 397.
Garab *Maurum Rauwolfii*, A. 133.
M. 66.
Garb *Arabum Avicennae*, A. 133.
Garnitro fructus, A. 165.
Garryophyllon *Plinii*, poyarum, A. 88.
legitimum *Plinii*, M. 39.
Garryophyllus, M. 38, 39.
Gatchgachitta *Malabarica*, M. 2.
Gaulthier, A. 41.
Gaulthieru *Gentianum Indicum*, M. 58.
Gellifinium, A. 108, 195, 196.
Gellifinium f. *Jasminum Virginianum*, scân-
dalis, A. 359.
Gellifloro arbor *Indica*, A. 41.
Gendou *Barbasi*, M. 135.
Genipat *Theophrasti*, A. 224, M. 99.
Genista & Genist. affinis, A. 164, 165,
166, M. 87, 88.
Gonifella, A. 122, 165, 166, M. 87, 88.
Gentiana Gentianella & Gentiane af-
finis, A. 166, 167, 394, M. 89, 142.
Gentianella *Indica Bontii*, A. 135.
Gentianiscognata paludosa, M. 128.
Geranium, A. 167, 168, 169, 170, 401.
M. 89, 90.
Gerostopogon, A. 371.
Ghondaduru *Zeylanicum*, A. 241.
Ghoraka Dulcis, M. 20.
Goumeze vocata *Presl. Alpini*, A. 144.
Gim-sem, & Gim-sen *Sinensium*, M. 336.
Ginger, M. 62.
Gingidium, A. 170, 373.
Gladiolus & Gladiolo affinis, A. 170.
M. 38, 91, 96.
Glandillogia affinis fructus *Indica*, A. 338.
Glan Unguentaria *Moribund*, A. 45.
Glastifolia *Cichoroides*, A. 69.
Glastivida, A. 371, M. 88, 182.
Glasto affinis *Rorimarini foliis*, A. 165.
Glaux *Indica*, A. 304, M. 9.

Glaux major, A. 170, M. 91.
Lupina viminea *Lafiana*, M. 110.
vulgaris *leguminosa*, A. 69.
altera perennans *Indica & Hispania*, M. 110.
Globularia *Messapiensis*, A. 335.
Glycoxylum *Americum*, A. 307.
Glycyphoros f. *Amara dulcis* *Indica*, A. 349.
Glycyrrhiza, f. *Glycyrrhiza affinis*, A.
59, 120, 170.
Glycyrrhiza f. *Glycyrrhiza affinis spi-*
nosa, A. 6.
Dioscoridis echinata, A. 269.
Indica seminebus coccineis, A. 294.
Gnaphalium, & Gnaphalis affinis, A.
171, 172, M. 91, 92.
Alexandrinum, A. 133.
Tragi, A. 379.
Vetrum *Indica*, A. 242.
Gnaphaloides, M. 91, 92.
Goncomaz *Ovadi*, A. 63.
Goan herba, M. 92.
Gou-Sen-Cree, *Park*, A. 124.
Goerzonde planta marina ex *Indica* *Ja-*
va, A. 172.
Gonandima *Brasilianum*, M. 178.
Gopher *Hebraicum*, M. 110.
Gossypium, A. 172, 173, M. 2, 93.
Goutte-Indica, *Indica*, M. 77.
Gratien, A. 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, M. 93, 94, 95, 96, 97, 98.
Gramen *Cyperoides*, A. 127.
Juncum foliis & spica *Junci*, A. 199.
Juncoides lanatum alcerum *Danum*
A. 207.
Pernaff, A. 108.
Pernaff, luteo flore, A. 188.
Spartium caputis *Equiset*, A. 200.
Spartium *Seras equinas referens*, A.
160.
Graminifolia aquatica *Thlaspedis capi-*
tullus, A. 180.
Granadilla *Hispanica*, A. 181, 182.
Granati vulgo, A. 240.
Granata folio, Arbor *Cassiopeia*, M.
84.
Grana-Tilli *Officinorum*, A. 320.
Gratia Dei *Germanorum*, A. 169.
Gratiola, & Gratiola affinis, A. 180.
337, 338, M. 98, 99.
Gratiola affinis *Digitalis emula*, A.
264.
Gratiola affinis *Echoides Zeylanica*, A.
142.
Grain the Collier, A. 184.
Grossularie fructu Arbor max, *Ameri-*
cum, M. 2.
Guahipocatabiba *Brasilica*, *Pisum*, A. 4.
96.
Guajabara *Barbasi*, A. 394.
Guaiacana, A. 180.
Guaiaco Occidico similis arbor *Park.*
A. 7, 42.
Guaiaco viribus similis *Chp*, A. 307.
Guaiacum, A. 180.
alterum *Dreyer*, A. 359.
foliis *Cassia acida* *Indica*, A. 140.
Guaiaco-Timbo *Brasilica*, A. 290.
Guaiava, A. 181.
Guajeru *Brasilianum* *Macgravi*, A. 338.
Guajuba *Elliptica*, A. 31.

Guianabaris *Ovadi*, A. 92, 134.
Guapdu *Brasilianum*, A. 290.
Guaparaiba *Pisum*, A. 241.
Guarerya-Oba *Pisum*, A. 123.
Guarumbes *Brasilica*, A. 291.
Guchon *Nierembergii*, M. 23.
Guegela-etta *Zeylanica*, A. 143.
Guirapiriba *Brasilica*, A. 132.
Guirapiriba *Brasilica*, A. 328.
Guiti-iba cuius fructus *Guiricoroya di-*
citur, A. 308.
Guiritoraba *Brasilica*, A. 42.
Gum-poon *Belgis Zeylanica*, A. 41.
Guvavirap *Brasilianum*, *Laetii*, M. 4.
Guyabo pomifera *Indica*, A. 181.

H.

Haba de India *maillarga*, A. 293.
Habures *Indica*, A. 298.
Habel fructus *Claf*, A. 125, M. 61.
Habzeli *Nigritarum*, M. 152.
Haecchie *Indicum*, A. 160.
Hachal *Indicum*, A. 252.
Hacoyochitl *Nvo. Hisp. Recc.* M. 7.
Hadhad *Arabibus*, A. 234.
Hemanthus *Africanus*, A. 220.
Hemorrhoidalis, A. 303.
Haj-alem-el-maovi *Presl. Alpini*, A. 223.
267.
Hairini f. *Guso Hernandez*, A. 369.
Halicacabum, A. 352.
arborifera, A. 298.
perennans, A. 120.
Halimus, A. 61.
Nummularie nudido folio, M. 111.
Hamamaliga *Caribici Plumier*, A. 154.
Harankaba *Zeylanicum*, A. 397.
Harar *Arabum*, M. 42.
Harel *Arabibus*,
Haret-foot *Plantain*, A. 298.
Harmala *Syracus*, A. 325.
Hatie radix in Florida,
Hayri *Parkinson*, A. 277.
Modera arborea, A. 181, M. 99, 100.
Hedera Muruciae species, A. 282.
Hedere foliis *Gauricus*, scandens capre-
olis, A. 182.
Hedera saxatilis magno flore, A. 283.
Hederaceum *Thlaspi Labell*, A. 111.
Hedysarum majus, A. 339.
argenteum *Pr. Alpini*, A. 112.
minimum *Dalichampii*, A. 157.
Clypeatum, A. 269.
triphyllum *Canadense*, A. 270.
Helenium *Indicum*, A. 98, 100.
Aegyptiacum *Smetii* *Leda*, M. 50.
Helianthemum, A. 185, 107.
Indicum tuberosum, A. 99.
Helianthes species rara, A. 21.
Helicifer arbor, A. 181, 182.
Heliochrysoarbor *Americana*, A. 76.
Heliochryson *gerardum* fol. *Abrotani*,
A. 163.
Abrotani sem. fol. *Burm.* 187.
Heliochryso *Sylv.* similis tota viridis
Burm. M. 166.
Heliochryso *Presl.* A. 359.
Heliotropium & Heliotropio affinis, A.
182, 353, M. 190.
minus *Lithospermum folius*, M. 119.
Heliotropium

100

- [illegible]

- J**aborandispices *Pissini*, *N.* 343.
Jaborandi *Brasiliense*, *N.* 70.
Jaca, *N.* 42.
Jaca, *N.* 63, 65, 90, 91, 92, 93, 337.
N. 105, 106.
Jaca Olea folio affinis, *N.* 107, 108.
Jaca & Sarcocolla minoris capsulis theocaridis, *N.* 71.
Jaca bicolor & tricolor, *N.* 338.
Jacrabudii *Trichomanes*, *N.* 293.
Jack in a Box, *Barbados*, *Anglia*, *N.* 366.
Jacobina, *N.* 98, 193, 194, 195, 333, *N.* 106, 107, 108, 170.
Jacta-vertue *Gossypium Indis*, *N.* 174.
Jacua-Acanga *Brasiliensis*, *Pison*, *N.* 381.
Jaë *Pissini*, *N.* 247.
St. Jago *Pinus* et *Elm*, *N.* 1.
Jalapie nomine vocatus, *N.* 114.
Jalappa *Voss*, *Amboyna*, *N.* 171.
Jaloux *Paludum*, *N.* 171.
Jamaicaria *pinus* & *quercus Pissini*, *N.* 147.
quina *Pissini*, *N.* 170.
Jamberrado *Perficum*, *N.* 59.
Jamboli *Aloe*, *N.* 237.
Jambolonia *Garcia*, *N.* 307.
Jambos *Paludum* *Linchoten*, *N.* 337.
sylvar. fructu *Cassia*, *N.* 162.
Jambos sylvestr. *Samitravadi* dictus alter, *N.* 166.
Jambu sylvestris minor, *N.* 23.
Anschidde *Melastoma*, *N.* 28.
Anapachidi *Melastoma*, *Indis*.
angonis *Prunus* *finilla*, *N.* 195.
anipa *Rosier*, *N.* 154.
Jampala *Pissini*, *N.* 79, 99.
anist Indi *Aucuma*, *N.* 102.
aracaba *Americana*, *N.* 38.
aracata *Pissini*, *N.* 146.
aruna *Moriri*, *N.* 73.
aruns montana, *N.* 171.
arumum, *N.* 107, 196, 197, *N.* 108.
Mentha, *Indis*, *N.* 251.
Mullefolii folio *CSP.*, *N.* 117.
Perficum, *N.* 339.
purpureum *trichomanes* *filicis*, *N.* 108.
Trichomanes *laetifolium*, *N.* 309.
Spinosum *Americana*, *N.* 334.
Ibacuru-pari *Brasiliense*, *Marcgravii*, *N.* 40.
Ibametara *Moriri*, *N.* 107.
Ibarcum *Pissini*, *N.* 170.
F f
Iba

INDEX

- Ibati Brasilensis*, A. 37.
Ibera-Putcherana Brasiliana, A. 346.
Iberis Cardamantica, A. 197. 261.
Ibira Brasilensis, A. 88. 394.
Ibiraba Maragrav., A. 246.
Ibiracé Brasiliana, A. 307. M. 156.
Ibixuma Pisonis, A. 92.
Icicaraba Brasiliana, A. 306.
Iydu-Japer, N. 150.
Idu-Mulli H. Mal., A. 399. M. 733.
Iecape Brasilens. Pison., A. 327.
Ient Idorum, A. 212.
Jequiritinguacu Lacti, A. 265.
Jeffersoni Cere of Barbados, A. 109.
Jeraba Pisonis, A. 96.
Jetita Brasilens. Maragr., A. 114.
Jeticuca Jusf. Maragravii. Ibid.
Jeta-Heads Brasilensis nostris, A. 273.
Jesur Philippin., Isular, M. 60.
Jibucumi de Lact., M. 99.
Jigica Lactis, A. 308. 307.
Jigli arbor de Insula Sals., A. 306.
Jiro prior Pisonis, A. 394.
Jlanda Zeylanensis, A. 199.
Jlex, A. 197. M. 108.
Jlicis facie Madagassiana, A. 198. M. 108.
Jllecebra major, A. 340.
Jly H. Mal., A. 53. M. 28.
Imperatoria Ranunculoides, A. 198. M. 108.
Inaja Brasilensis Pisonis, A. 275.
Inaja-Guacuba Maragr., Ibid.
Inalei H. Mal., M. 39.
Indeum Americana, A. 182.
Inulan-Santibot, A. 79.
Inhame, A. 78. 79. 134. 321.
Inimboy Maragravii, A. 4.
Jute-berry & Jute-moss, A. 234. 246.
Inora Indien H. Mal., A. 352.
Inchi vel Inchi-Kua H. Mal., A. 397.
Intia Malabar. & Intie accedens, A. 4.
Iondraba albidoides Apulspicata, A. 215.
Ionthiaspi, A. 365.
Ipracuanbe, A. 65. 288.
Iproba Maragravii, M. 26.
Iraiba Pisonis, A. 276.
Irairuch & Ajawes succus similis Aloe, M. 190.
Irio-Ethiopica, M. 70.
Apulster alter, A. 137.
Iris, A. 198. 348. M. 109.
Iucaba de Lact., A. 39.
Ifatis sylv. min. Lufitanica, A. 198.
Indica foliis Rorimarini, A. 165.
Ichus, A. 321.
Ikeru-valli pauna H. Mal., M. 82.
ahera Jusf. Ibid.
Ifoca-muri H. Mal., A. 181. M. 190.
Ifocinnamon Plinii, M. 26.
Iricoca Brasilian. Pison., A. 214.
Iti-alu H. Mal., A. 42. 145.
Irci-Canni H. Mal., A. 283.
Itubu Sirinamensis, A. 137.
Itezcupatlia Horandiz, A. 110.
Ivapeanga Pisonis, M. 249.
Iucare arbor, Nicotianag., A. 89.
Iudica arbor, A. 95.
Iujuba & Iujube, A. 193. 199. M. 85.
Iuncaria affinis Ethiopica, M. 197.
Iuncellus, A. 201.
Iuncus, A. 199. 200. 201. M. 109.
Bombycinus JB., A. 179.
Cyperoides Cat. Jamaic., M. 97.
Cyperoides maritimus Lab., A. 178.
maritimus Northensis. Park. Bih.
odoratus aromaticus, A. 175.
proprie aridi Soli in Africa, A. 164.
Iunipapeywa Brasiliana Clusii, A. 124.
M. 99.
Iuniperus, A. 201. 326. M. 42. 109.
Iuniperifolia, A. 202. M. 111.
Iunfa Ind. Oriem., M. 149.
Iupetai Pisonis, A. 170.
Iuqueri Brasilens. Pison., A. 351.
Iuqueri Ommano Maragr., Ibid.
Iuripaba Pisonis, A. 351.
Joe-flowering-Wintergreen, Virginian., M. 115.
Joe-Plant of America, A. 182.
Izacariba Brasiliana Pison, A. 41. 306.
Izontacpatlis, f. Volucrum Medicina Heru. M. 17.
Izrac-Coanepillia, f. Volubilis aur-retica Heru. M. 147.
Izacpatlis-Quizalepin No. Biff., A. 349.
M. 27.

K

Kaste, N. 85.
Kablibot Bengalenisum, A. 273.
Kadjang Ogiv., A. 293.
Kaha Zeylanisum, A. 125.
Kajan f. Katjan Zeylanisum, A. 293.
Kajan Tacori-folia Clusii, A. 303.
Kaida H. Mal., A. 277. M. 12.
Kaida-Taddi H. Mal., M. 245.
Kainepu Malabar., M. 73.
Kaipu-Tajira H. Mal., A. 221.
Kailchucemaik Virginianisum, M. 28.
Kaka-Mullu H. Mal., A. 302.
Kakapu H. Mal., A. 283.
Kaka-Toddali H. Mal., A. 102.
Kakoufa Juvenis, A. 306.
Kakuvalli H. Mal., A. 292.
Kali, A. 202. M. 111.
Crassula minoris folio C.B.P., A. 149.
floridum rapens Fab. C.B.P., A. 169.
fruticosum Hispanica, A. 69.
genus Americana, A. 32.
Kali hirsuto aliois Anthyllidis species, A. 368.
Kalli-Egypticum album Presp., A. 149.
Kalpanna-Maravara H. Mal., A. 150.
Kal-Veradagou H. Mal., A. 391.
Kalu-palapen H. Mal., A. 236. M. 73.
Kaluree Malabar., M. 112.
Kamha-Affrum Ogiv., A. 242.
Kandel H. Mal., A. 241.
Kanna Ghoraka Cingalenisum, M. 10.
Kannellitri-Canni H. Mal., M. 25.
Kansjan-Cora H. Mal., M. 43.
Kapa-Mayo H. Mal., A. 28.
Kapa-tajika H. Mal., A. 28.
Kappa-Kalengu H. Mal., A. 114.
Kara-Tajira H. Mal., A. 303.
Karibehi-pauna Maravara H. Mal., A. 152.
Kari-bepou f. Nimbo altera H. Mal., A. 269.
Kari-Kandel H. Mal., A. 241.
Karin-Tajira H. Mal., A. 44.
Karunde-poondoo Malabar., M. 199.
Kary-Kandel & Kanil-Kandel H. Mal., M. 63.
Karyl H. Mal., A. 305.
Katabaramareta H. Mal., A. 191. M. 149.
Karan-belloueten H. Mal., A. 15.
Kataga H. Mal., M. 3.
Katapincka Zanni., A. 106.
Katappetta Jean-Nicubusf., M. 12.
Kata-Schena H. Mal., A. 52.
Katho-Karohiti Cingalenisum, A. 245.
Kathu rampala Zeylanisum, A. 26.
Katoti Adamboe H. Mal., A. 16.
Katou-A'bu H. Mal., A. 144.
Katou-Conna H. Mal., 95.
Katou Indel H. Mal., A. 276.
Katou Inchi-Kua H. Mal., A. 397.
Katou-Kadali H. Mal., A. 106.
Katou-Kalefiam H. Mal., A. 335.
Katou-Mail-elou H. Mal., A. 48.
Katou-Nicouri H. Mal., M. 84. 188.
Katou-pulcolli H. Mal., A. 102.
Katou-Tandale-Corti H. Mal., A. 122.
Katou-Tajaka H. Mal., A. 203. M. 168.
Katou-Tajeron, f. Chera H. Mal., A. 306.
Katou-Uren H. Mal., A. 25.
Katsij-Kelengu H. Mal., A. 321.
Katu-Kalengu H. Mal., A. 113. M. 54.
Karubala H. Mal., A. 79.
Katu-Kapel H. Mal., M. 29.
Katu-Kam-Walli H. Mal., A. 318.
Katu-Katsij H. Mal., M. 185.
Katu-Kurika H. Mal., M. 128.
Katu-Mulla H. Mal., A. 196.
Katu-Murunga Zeylanisum, A. 253.
Katu-Naregam H. Mal., M. 115.
Katu-petru H. Mal., A. 291.
Katu-palvalli H. Mal., M. 17.
Katu-pee-Tjanga-pusam H. Mal., A. 167. M. 44.
Katu-Tjandi H. Mal., A. 292. M. 149.
Katu-Tjettip-pu H. Mal., A. 27.
Katu-Tjiregam-Mulla H. Mal., A. 196.
Katu-Tumba H. Mal., M. 129.
Katu-Ulinu H. Mal., M. 149.
Kathapoondoo Malabar., M. 146.
Kauki Idorum Breyne, A. 203.
Kawaruwa Zeylanisum, A. 142.
Kayan dictus, A. 293.
Kaye-Baka Clusii, A. 390.
Kayjang Insula Formosa, A. 203.
Kedangu H. Mal., A. 112.
Keelanello Malabar., M. 84.
Keiri, A. 214.
Kenkerig Wallerum, A. 255.
Kepul Idorum, A. 297.
Kerande childe Malabar., M. 139.
Kerbita vulgo Brasilensis, A. 29.
Kerzeberch arbor venenata Perforum, M. 86.
Kethefhar Arabum, A. 240.
Ketmia Syriacum, A. 14.
Kiegiu f. Kagi. Sinarum Boym., A. 29.
Kiluké Cingalenisum, A. 43.
Kil-wench Barbadosis nostris, A. 290.
Kimoy Zeylanisum, A. 106.
Kindici-valli H. Mal., M. 55.
Kinkanbau Sirinamensis, A. 16.
Kinlu Sinarum, A. 203.
Kirganelli H. Mal., A. 159.

INDEX.

Riscatona No^o Anglicanis, M. 136.
 Kitta & Alkitta Arabum, M. 40.
 Kitoel Zeylanicus, A. 277.
 Knawel Germanicum, A. 302.
 Knippa Americana, A. 265.
 Koddapail H. Mal. M. 137.
 Konar, Persarum Thevenotic M. 109.
 Konni H. Mal. A. 294.
 Kopalam Zeylanicus, A. 73.
 Kopang arbor, A. 41.
 Kotsjietripulhu H. Mal. A. 170.
 Kua H. Mal. A. 397.
 Kudde-Mulla H. Mal. A. 196.
 Kniiku radix Sinica, M. 92.
 Kuppemija Zeylanicum, A. 248.
 Kurinti-Kali H. Mal. A. 335. 309.
 Kurundoci H. Mal. M. 50.
 Kurundu Zeylanicum, A. 38.
 Kuttanemmius Virginianum, A. 51.
 Kyati f. Quercus Indica Bontii, M. 178.
 Kyckonophane Zeylanicum, A. 243.

L.

L Ablab. A. 297.
 Lablari arbor Americana, A. 38.
 Laburnum Zeylanicum, A. 122.
 humilium, M. 150.
 Spinosum, A. 293.
 Labruca dicta, A. 392.
 Lacheriza Bengalenica, A. 122.
 Lacc-Cest, A. 41. M. 75.
 Lachryma Jubi. Multis, A. 250.
 Lachryma Myrsi, A. 300.
 LaCruc agnina, A. 38.
 LaCruc sylvestr. pumila. Park. M. 102.
 Ladanium Creticum. Fr. Alpin. A. 106.
 Ladanium Sigitum, A. 345.
 Ladichini Dramantis, A. 252.
 Lagopus, A. 375. 376.
 Lamium, A. 203. 204. 338. M. 112.
 Alragaloides, A. 338. 339.
 feticidum Lusitanicum fol. Melissi, M. 327.
 Lamii flog' tani facie, Planta Mariana.
 Lamplana, A. 104.
 Apala Plinii, A. 314.
 Lantaria f. Scorchium Discoloris, A. 232.
 Langoa Bô d' Stapel, A. 79.
 Lantia Indurum, A. 277.
 Lanifera arbor peregrina, A. 172.
 Lanigera arbor Amili, Ibid.
 Lantana vulgo, A. 387.
 Lantor arbor Indica, A. 176.
 Lapa f. B. A. 205.
 Lappathum, A. 204. 205. M. 112.
 Egyptiacum lactescens CBP. A. 34.
 hortense, f. Spinachia, A. 346.
 maritimum feticidum CBP. A. 8.
 Lappath Anthomantho accedens plant.
 confusa, M. 113.
 Lappa boaria Plinii, A. 90. 91.
 major, A. 205.
 strumaria f. minor, Ibid.
 Lappula, ejusque species varie, A. 206.
 M. 113. 114.
 Canaria, A. 91.
 Larix, A. 91.
 Lasepitiu, A. 207. M. 114.
 Lata fructus exoticus Clusii, A. 249.
 Latinit Rochforti, A. 277.

Lathyrus, A. 371.
 Lathyrus & Lachyroides, A. 208. 209.
 387. M. 114.
 Lathyrus affinis Mexicana, A. 382.
 Lavandula & Lavendule folis, A. 299.
 223.
 Lavopras Lusitanis, A. 96.
 Laureola, A. 209.
 Cretica humilis Prosp. Alpin. A. 107.
 M. 49.
 Lauro cerasus, A. 95.
 Lauro serrate Stapeliana similis inodo-
 ra, A. 139.
 Laurotaxa, A. 209. 210. M. 114. 115.
 Laurus & Laurifolia, A. 210. 211. M. 115.
 Alexandrina, A. 209. 210.
 non odorata, fructu globoso Africa-
 na, A. 139.
 odorata Lignii, A. 88.
 Laurifolia Americana pomo capitis
 magnitud. A. 124.
 arbor venenata, C. M. 86.
 Guineis CBP. A. 124.
 Magellanica, A. 89.
 Laurustinus & Laurustino similis, A.
 211.
 Laurus Tulipifera, A. 379.
 Lazarola Kalam, A. 248.
 Leacher-Cest, A. 38.
 Le' Basilis, M. 76.
 Ledum & Ledon, A. 106. M. 49.
 palustre nostras Arburi flore, A. 136.
 Legumaria arbor Arabis spinosa, A.
 199.
 Legumen pallidum Ussipomasi, A. 387.
 exiliis, cujus filiqua & Anil inscrip-
 ta, A. 165.
 trifolium sub terra fructum edens,
 M. 149.
 Li berbe was Hæckel D. Rochfort, A. 79.
 Lemna Theophrasti, M. 116.
 Lens, A. 211. 387. M. 116.
 Lens Phascolodes maxime Ind. A. 295.
 Lens palustris & Lenticula, A. 211. 212.
 M. 116.
 Lenticula marina, A. 161.
 palustris, A. 207.
 palustris bifolia, A. 21.
 Lenticularis arbor, A. 212.
 Barbadosensis Ligonis, A. 307.
 humilis trifolia, A. 319. M. 161.
 Prunellae fol. Indica, A. 319.
 Leontopetalon, A. 212.
 Leontopetalon affinis, M. 116.
 Leontopodium Creticum, A. 298. M. 152.
 Leontopodium Martialis, A. 171.
 Leonurus, A. 82. M. 37.
 Lepidium, A. 132. M. 65.
 Americanum, A. 297.
 Dentularia dictum, A. 222.
 Pauli, Ibid.
 Laucacantha, A. 83. 84.
 Leucadendros Africana, A. 212.
 Leucanthemum, A. 65. 97. 98.
 alpinum Clusii, A. 73.
 Leucoium, A. 212. 213. 215. M. 116. 117.
 Africatum ceruleo flore, A. 183.
 f. alb. filigine uno versu relictis, A. 69.
 Lusitanicum purpureum, A. 103.
 Indicum ejusmodi, A. 211. M. 162.
 lut. f. Keri minim. Polygale facie,
 M. 153.

maritimum, A. 183. M. 101.
 Leucois affine Tiopolum Aguilae,
 A. 213.
 Lucuma Parkinsoni, A. 90.
 Lucxylon arbor Americana, A. 215.
 Levisticum vulgare, A. 217.
 Leum Alapaha (i. e.) Nur Machil Sa-
 rapim, M. 176.
 Libanotis, A. 207. 215. 216. 217. 346.
 M. 116. 114. 117.
 Cachryopharod, A. 74.
 Coronaria, A. 123.
 Ferula folio & semina, A. 143. M. 74.
 Foemiculi folio CBP. A. 143.
 Rosmarinum herbaceum, A. 345.
 Sept. 18. alium Ibid.
 Libby arbor in Isula Madagasc, M. 144.
 Lichen, A. 216.
 arboreus f. B. A. 254.
 Discoloris & Plinii, Ibid.
 marinus Clus. A. 118.
 petrus purpur. Derkenti, A. 255.
 Lici arbor Sinensis Boyum, M. 20.
 Lien Sinensis, A. 267.
 Lieres Rochforti, A. 295.
 Lignum, Barbadosense Angli, A. 228.
 Ligma Acanthium densum, M. 2.
 Aloes vel Paradisi, M. 131.
 amarum, A. 395.
 Americanum album CBP. A. 215.
 aromaticum, A. 89.
 Bovinum, A. 395.
 Brasilianum, ut charta candidum, A.
 245.
 Colubrinum alterum Aesc. M. 28.
 Colubrin Barbadosense, A. 270.
 Colubrin Garcia, A. 287.
 Colubrinum Officin. A. 124.
 Columbarium, A. 391.
 croceum tingens f. B. M. 292.
 Desiderat croceum Regis, A. 228.
 dulce f. Guajacum Plinii, A. 307.
 exoticum Clus. M. 42.
 ferreum, A. 346.
 focale Americanum, A. 138.
 fomitis vicem præbens, A. 128.
 levissimum f. B. A. 228.
 Malum Panva dictum, M. 162.
 Nepreticum Hernandez, A. 253.
 odoratum Americanum, A. 128.
 odore fragrans, Ibid.
 Patavum f. B. A. 20.
 purpureum ex Africa, N. 41.
 Rhodium a quibusdam putatum, A.
 166. 228.
 sempervivum f. B. A. 269.
 Sambarum, M. 70.
 Ligusticum, A. 346.
 alterum Martialis, M. 171.
 Belgicum, A. 104.
 humilium Scitum & maximia, A.
 217.
 quercifolium folis Anglica, Ibid.
 vulgare, A. 216.
 Ligustrifolia, baccifera Americana, A.
 217.
 Ligulatum, Ibid.
 folis laciniatis, A. 359.
 Oracale, Ibid.
 Zeylanic. arboreum f. B. A. 259.
 Lilach, A. 359.

Caroliniana

for Arabia, A. 375.

- [illegible]

INDEX.

- N** Abca, *Abca*, A. 198.
Nacanthalis Tolosa
M. 196.
Nachani, *Nachani*, A. 198.
Nagadance H. *Nagadance*, A. 198.
Nagam H. *Nagam*, A. 198.

Neli-

INDEX.

Nell-Tali H. Mal. A. 170.
Nellacrambac Malabar. M. 4.
Nellacrandee Malabar.
Nellamulle Malabar. M. 22.
Nella-panna-Maravara H. Mal. A. 154.
Nella-wattachade Malabar. M. 80.
Nellekai Christlour. Malabar. M. 45.
Nellendim Malabar. M. 133.
Nellennichim Malabar. M. 96.
Nellia-Tandale-Cotti H. Mal. A. 221.
Nelumbo Zeylanicum. A. 207.
Nenuphar Brumfidi. A. 266.
Nepa Gaia. A. 164.
Nepalroc-Cutz Alucuratum. A. 196.
Nepenthes Americanum. A. 71.
Neslin Thicar. Imperatoria. M. 175.
Neylanthum. A. 304.
Nepeta maxima purpurea. M. 367.
Nepenthes, Hermannus. A. 249.
Nepenthes monarda purpurea. A. 75.
Nephel f. Nephel-Ienbathar. Ch. A. 246.
Nepenthes, Deane. A. 250.
Nepenthes, Hermannus. M. 8.
Nerium alpinum. A. 106, 107.
Nerium. A. 262, 263.
Nerli facie-arbor India. M. 279.
Nerli filique effusa Kaya-Bata. M. 390.
Neruchedex Malabar. M. 140.
Nettle-Tree vulgo. A. 232.
Nerbadijhu. Angli. A. 98.
Nexhocaulis Nidum. M. 32.
Nexpayan Mexico. A. 306.
Nexthal. Nov. H. B. A. 209.
Neycochpatlis Barnum. M. 23.
Nexdrie-Obs. Brumfidi. A. 263.
Niazul Brumfidi. A. 271.
Niera H. Mal. Nidula cladocarpa. A. 263.
Niacadavula Cingaloffina. . . .
Nia. Malabar. M. 2.
Nicotiana. A. 265.
Nicothia Malabar. M. 148.
Nienphala Zeylanicum. M. 229.
Nigella. A. 263. M. 135.
Nil. Anil f. Indigo India. A. 275.
Nilam. A. 113. Cynatholus fol. A. 263.
Nila-barudena H. Mal. A. 350.
Nila-chettu Gonitima-batum. M. 51.
Nila-humata H. Mal. M. 176.
Nila-vananga Zeylanicum. A. 17.
Nilacamarum H. Mal. A. 6. M. 133.
Nimbo fol. f. Graffu Olan. A. 269.
Nimbo-Tavungina. A. 211.
Ninazin f. Zingib. f. Ginfeng. A. 263.
Nipal-Bur. A. 104.
Niraoix fructus. M. 23.
Nir-Gottan-Rala. H. Mal. A. 373.
Niruo-Bijl H. Mal. M. 26.
Nirpulari H. Mal. A. 394.
Nir-pullu H. Mal. A. 137.
Nir-Schulli H. Malacca. A. 263.
M. 99.
Nir-tjemba H. Mal. M. 27.
Nirvala H. Mal. A. 363.
Nirvalli-pullu H. Mal. A. 135. M. 131.
Niruri H. Mal. A. 391.
Niruri vel Nirvalli H. Mal. A. 179.
Nig Zeylanicum. A. 136.
Niti-Toddy-Vadi H. Mal. A. 371.
Niuren H. Mal. A. 25.

[illegible][illegible]

...Kartier 7. 401

- Olyra** f. *Carpino adnata* Zeylan. *A.* Panacea *Kaypwa* v. *A. 98.*
Olyris frutescens baccifera. *A. 89.* *Moschatum Canariense* Cognat. *A. 396.*
Othmania v. *Disfordia* Zanon. *A. 379.* *Panaci Heraclei* familia *Ungaria*. *M. 135.*
Orell *Amel* H. *Mal.* *A. 320.* *Panax* *Scitellum*. *A. 143.* *Coloni*. *A. 345.*
Oulamaram Malabar. *M. 12.* *Carpinos folio*, triphyllus. *M. 145.*
Oulim Caribae. *A. 394.* *Paniceae folio*, f. *Colinum*. *M. 145.*
Ounri *CBP.* *A. 19.* *Siamum* *famine hirsuto*. *A. 74.* *M. 63.*
Ozalis. *A. 8.* *M. 3. 7.* *Sphondyli folio*. *A. 356.*
Oxyacanthia colore fructu peregr. *M. 151.* *Pancratium* *Moschifolium*. *A. 219.*
Oxyacanthum & Oxyacantha. *A. 249.* *Pandi-Avancu* H. *Mal.* *A. 319.*
M. 130. *Pandi-pavel* H. *Mal.* *A. 123.*
Oxycedrus (melius autem) Juniperus *Panel* H. *Mal.* *M. 139.*
A. 101. *Panem-palka* H. *Mal.* *A. 265.*
Oxycedrus Africana. *Montis Atlantis*, *A. 91.* *Pangepille* *Malabar.* *M. 95.*
Oxyccoccus. *A. 392.* *Pangja-Pangaja* H. *Mal.* *A. 172.*
Oxyperanum *Hernand.* *A. 169.* *M. 90.* *Panicum*. *A. 278.* *M. 145.*
Oxylapathum *IB.* *A. 205.* *aquatic.* *M. 155.* *glyvestre*. *A. 174.* *peregrin.* *Gifu*. *M. 84.*
Oxymyline vulgo. *A. 220.* *Scrapini*, *M. 26.* *Pani* *Sauhi* *Tobiquis*. *A. 95.*
Oxytrichillum Scribnii *Largi*. *A. 226.* *Panipijamaram* *Malabar.* *M. 75.*
Oxyl. *A. 274.* *M. 143.* *Panna-valli* H. *Mal.* *M. 80.*
Oxydites-Cere. *A. 242.* *Pannemaram* *Malabar.* *M. 75.*
Ozgehes *Chilipia* *Ogilvii*. *A. 307.* *Panover-Tajetava* H. *Mal.* *A. 374.*
P. *Pan* *Arca* *Lufitana*. *A. 328.*
Panchurchi *Malabar.* *M. 27.* *Pas de Lays* *Lufitana*. *A. 108.*
Pacal arbor. *A. 393.* *M. 189.* *Papajamaram* H. *Mal.* *A. 145.*
Pacayer, f. *Guayva* *Ind. Occid.* *A. 307.* *Papa* *Americana*. *A. 352.*
Paccasatinga arbor *Brasilien.* *M. 190.* *Papayer*. *A. 278.* *279.* *280.*
Paccasatinga herba *Brasilien.* *M. 191.* *affin. montan.* *Aconitifolia*. *A. 267.*
Pacoeria arbor. *A. 145.* *Papaves* *Spumum*. *A. 232.*
Pacozeroca *Brasilien*, *diff.* *A. 80.* *M. 37.* *Papaya* *Hernand.* *A. 145.*
Pada-Kelanga H. *Mal.* *A. 71.* *Pappaichede* *Malabar.* *M. 75.*
Pada-vale H. *Mal.* *A. 287.* *M. 143.* *Papyracea* *arbor* *Copaia*. *A. 394.*
Paeode H. *Mal.* *A. 28.* *Guajabara* *arbor* *Ind.*
Paeodii H. *Mal.* *A. 290.* *cybus* *Tal. IB.* *A. 276.*
Paina-Schulli H. *Mal.* *A. 58.* *Paper* *ex* *Albora* *vasta*. *Ind.*
Pajmollia *Brasilien.* *A. 342.* *Pasam-Tulica* *Malabar.* *M. 139.*
Pai-Paeoda f. *Corradi* H. *Mal.* *A. 275.* *Parar* *Brasilien*. *Margrav.* *M. 53.*
Palamala. *A. 382.* *383.* *Parenconurus* *Malabar.* *M. 57.*
Palaris herba. *A. 116.* *Paritron* *Rochfort.* *A. 241.*
Paleofoularia *Lufitana*. *M. 137.* *Perigier* *Stall.* *A. 174.*
Palega *Peonoli* H. *Mal.* *A. 100.* *Paristacu* *Hernand.* *M. 46.*
Pallurus *Jupubini* *folia*. *A. 273.* *Parietaria & Parietaria* *folia*. *A. 80.*
alter *peregrinus* *Adv.* *A. 233.* *281.*
Africana *IB.* *70.* *filigata*. *A. 159.* *Paringee* *Nallai* *Malabar.* *M. 45.*
Palma & Palmo-pina. *A. 275.* *276.* *277.* *278.* *M. 144.* *145.* *Paria* f. *Tali-paria* H. *Mal.* *A. 16.*
cujus fructu oblong. *Fausel* *similia* *Pariparaca* *Convolvul.* *M. 46.*
A. 265. *Paronychia* *folia* *incisa*. *A. 331.*
humilis longis latius fol. *CBP.* *A. 145.* *altera* *Maritima*. *A. 20.*
Maria *Dampier*. *M. 135.* *Hispencia* *Clusi.* *A. 101.*
Myrobalanis *Blum.* *M. 14.* *Myosotis*. *A. 281.* *Myosotis* *lutea*. *A. 281.* *M. 102.*
Palm & Palmo-pina. *A. 275.* *276.* *277.* *278.* *M. 144.* *145.* *Parota* *M. nison.* *A. 68.*
cujus fructu oblong. *Fausel* *similia* *Parpadagam* H. *Mal.* *A. 81.*
A. 265. *Parthenium* *alpin.* *Clus.* *A. 243.*
humilis longis latius fol. *CBP.* *A. 145.* *marionum*. *A. 98.* *maritim.* *minim.* *M. 126.*
Maria *Dampier*. *M. 135.* *Parra-Kelanga* H. *Mal.* *A. 11.*
Myrobalanis *Blum.* *M. 14.* *Pallerina & Pallerina* *folio*. *A. 281.* *M. 146.*
Palm & Palmo-pina. *A. 275.* *276.* *277.* *278.* *M. 144.* *145.* *Ruiflora & Ruiflora* *spuria*. *A. 282.*
cujus fructu oblong. *Fausel* *similia* *A. 265.* *282.* *283.* *M. 146.*
humilis longis latius fol. *CBP.* *A. 145.* *Pastinaca* *marina*. *quibusd.* *Secacul.* *A. 121.*
Maria *Dampier*. *M. 135.* *Echinophora* *Apala* *Coluran*. *Ind.*
Myrobalanis *Blum.* *M. 14.* *Oenanthes* *folio* *Secum*. *A. 129.*
Palm & Palmo-pina. *A. 275.* *276.* *277.* *278.* *M. 144.* *145.* *Pastinac.* *styl.* *tennifolia*. *A. 283.* *M. 147.*
cujus fructu oblong. *Fausel*

INDEX.

- Periclymenum* *Periclymenum*, *M.* 129.
Pergulosa, *A.* 302.
Periclymenum, *A.* 187, 188, *M.* 187, 188.
Periclymenum genus, *A.* 195.
Periclym. rect. herbac. *Centium* fol.
M. 67.
Periclym. succresci genus *A.* 199.
Perin *Kakavalla*, *H. Mal.* *A.* 195.
Perin *Curigil*, *H. Mal.* *A.* 188.
Perin *Kara*, *H. Mal.* *M.* 175.
Perin *Niars*, *H. Mal.* *M.* 39.
Perin *Nioursi*, *H. Mal.* *M.* 183.
Perin *panel*, *H. Mal.* *A.* 128, 129.
Perin *Toddali*, *H. Mal.* *A.* 199.
Periploca latifolia, *Ger. emac.* *A.* 37.
Permenton *Canariensis*, *A.* 351.
Perpericum *Malabar.*, *M.* 9.
Persea *Curigil*, *M.* 37.
Persea *Malabar.*, *M.* 144.
Persea *Graciosa*, *A.* 181.
Persea *arbori* *similis*, *A.* 182.
Persea *nuci* *simil.* *nucleo* *Venenat.*
A. 241.
Perficaria & *Perficar.* *similis*, *A.* 188.
M. 141.
Personata, *A.* 105.
Pes *Capra*, *Lusitan.*, *A.* 114.
Pes *Palerius*, *Hermand.*, *A.* 116.
Pes *Tigrius*, *A.* 115.
Pessis *Coloni*, *Hermand.*, *A.* 174.
Petalites, *A.* 118, 119, 120, 121, 122.
Petromarula *Crotonum*, *A.* 316.
Petroelinum, *A.* 34.
Petradanum, *A.* 34, 122, 123.
Petradanum *Clusi*, *A.* 305.
Petradanum *folio* *Planta*, *Hermand.*, *A.* 189.
Phaco *Hermand.*, *A.* 349.
Phalagium, *A.* 134, 135, 136, 137, 138.
Phalaris, *A.* 176, 189.
Phandendros, *M.* 121.
Phaeolus, *Phaeoloides*, & *Phaeosol.*
accelera, *A.* 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325,
326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485,
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493,
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501,
502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533,
534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565,
566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581,
582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589,
590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669,
670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693,
694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717,
718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725,
726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733,
734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,
758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765,
766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773,
774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789,
790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797,
798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,
838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853,
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877,
878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,
886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893,
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901,
902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909,
910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917,
918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925,
926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933,
934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941,
942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949,
950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957,
958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973,
974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981,
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997,
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,
1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039,
1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088,
1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130,
1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137,
1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144,
1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172,
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186,
1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193,
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200,
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207,
1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214,
1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221,
1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228,
1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242,
1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256,
1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263,
1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270,
1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312,
1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326,
1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,
1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340,
1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354,
1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396,
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410,
1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438,
1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445,
1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452,
1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459,
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466,
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473,
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501,
1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508,
1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536,
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,
1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550,
1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557,
1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571,
1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578,
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585,
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,
1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599,
1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606,
1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613,
1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620,
1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634,
1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641,
1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648,
1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655,
1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662,
1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683,
1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690,
1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697,
1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704,
1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711,
1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718,
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725,
1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732,
1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,
1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753,
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760,
1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781,
1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788,
1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795,
1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802,
1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816,
1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823,
1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,
1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837,
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844,
1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851,
1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865,
1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,
1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921,
1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949,
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977,
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2

INDEX

- Radicula palmata*, A. 381.
Radix Americ. Indis fragrantis, M. 94.
Cerati Sassa, A. 71.
 contra venenatas laguras, A. 80.
Idea Phytobalan, A. 209.
Malaca toxicis sagittis resistens, M. 36.
Medica Maritima, M. 183.
Quimbaya Per. Cjaca, M. 53.
Santa Helena, A. 327.
Urtica, A. 250.
Ragadiolus edulis, A. 104.
Ramaccium H. Mel. A. 300.
Rangiferi cornua referent, A. 370.
Ranunculifolia Cochinchinensis, A. 189.
Ranunculus, A. 310, 311, 312, 313, 314.
 M. 158, 159.
Echinosus H. Mel. A. 108.
Aloucurioides, A. 11.
aquatil. Milles. fol. pennat., M. 355.
Nemorum Moschatellina dist., A. 31.
palustr. minim. Plantag. fol., A. 40.
perelegans B. P. *marginata*, A. 198.
Virginicus. albus Parkin., A. 380.
Ragunculi facie Planta peregr., A. 367.
Raphani aquat. species Virginica, A. 361.
Raphanistrum, A. 314, 315, M. 159.
Raphanus, A. 314, 315, M. 159.
Rapistrum, A. 314, 315, M. 159.
Italica filiquis longissima, A. 192.
Rapum Americ. A. 31. Brasilis, A. 338.
Rapuncul. & Rapuntium, A. 76, 77, 78.
 316, 317, M. 160.
Nemorosus angustifol. parv., A. 334.
Rapuntium umbellatum, A. 379.
Rapordio affinis Lini facie, A. 93.
Rapistr. Rochforti, A. 394.
Ratambala Zeylanica, A. 196.
Ravanamela Malabar., M. 93.
Ravicomens Virginica, A. 391.
Reb-budo, M. 43. *Reb-bulb*, M. 70.
Reb-budo, *Reb-budo*, *Angli.*, A. 138, 165.
 M. 136.
ex Santa Helena, M. 6.
Refeda, A. 317, M. 160.
Retropemarete Malabar., M. 11.
Rha capitarum, A. 93.
Americum Monardes, A. 204.
Mimachurum Hernand., A. 105, M. 112.
verum Parkin., A. 304.
Rhamnus, A. 317, 318, M. 160.
Africana Cerasi fructu, A. 94.
folio subrot. fructu compresso, A. 275.
Myrtifolius Cornu, A. 343, M. 122.
Solutiv. Pannolis, 2. 76, M. 122.
Virginiana Prunifolia, A. 349.
Rhapontica, A. 204.
folio Helenii incano, A. 93.
Rhafor Maurus, A. 50.
Rhenanthea Borkh., M. 189.
Rhodis radix, A. 363.
Rhodium lignum, quibet. Agallochum
 M. 139.
Rhus, A. 318, 319.
Ch. Richard. Cere., A. 41, M. 75.
Ricinus, A. 319, 320, 321, M. 161, 162, 163.
farinifera heptaphylla, M. 130.
parvus urens, A. 393.
Ricini fructu Julifera lactesc. fol. Myrt.
 M. 112.
Ricophora, A. 78, 79, 321.
Rihan Egyptus B. A. 169.
River-dear, A. 32. *Robur. Clus.*, A. 309.
Robus Calicut., A. 377. *Rosa*, A. 321.
 322, 323.
Rosa alpina altera, A. 167.
Batavica-Indica inodora, A. 14.
Hiericho B. A. 256. *marina*, A. 161.
Siamis Ferrarii, A. 14.
Rose alpin. altera species Gessneri, M. 49.
Rosmarinum Stoechadis facie, A. 360.
Sylvestris nostras, A. 136.
Rosmarinus, A. 323.
foliis Salino similibus, M. 117.
Sylvestris, A. 323. *Clus.*, A. 106.
Ros Solis & Rosella, A. 323, M. 163.
Rotang dista, A. 53. *Rot-Beam*, A. 96.
Rotenissade Strumensibus arbor, A. 40.
Rubia & Rubra, A. 383, 384, 385, M.
 163, 164.
parva Virginiana, M. 117.
Rubie Sylvatic. levi similis exot., A. 21.
Rubi facie scitica planta, A. 4.
Rubus, A. 4, 325, M. 164.
Rumigi Maurus, A. 300.
Ruscus, A. 210, M. 114, 115.
Ruta, A. 325. *canina*, A. 338. *Hyper-*
icoid, A. 189.
Rylagone Indurum, M. 199.
Saamona Pissini, A. 326.
Saamona Brasil. floribus emula,
 A. 328.
Sabdariffa Alcea Americana Park., A. 13.
Sabina, A. 326. *Sylvestr. Trag.*, A. 178.
baccata altera Hist. Lag., A. 205.
foliis Cupressi, C. B. *Ind.*, A. 117.
Sabal. Syriacum Rauwolfii, A. 44.
Saccaravatum Malabar., M. 31.
Sacquenunmener bacca Americ., A. 51.
Sacanda Zeylanica, A. 49.
Sadar Adhal Serapiotis, A. 198.
Sadar Affis Serapiotis, A. 199.
Sadricalli Indurum, M. 181.
Sagapenifera ather, M. 177.
Sagitta aquae & Sagittaria similis, A.
 336, M. 164.
Sagittaria Cordialis Monr., A. 112.
Sagu Pigeon, A. 276.
Saintfeyne vulgo, A. 269.
Sauz Indurum Taurinifera, A. 243.
Sal amarum Hernand., M. 107.
Salix, 327, 328, M. 161, 162, 163, 164.
Arabica foliis Atropiceis, C. B. A. 193.
Brasilis. foliis Indurum, A. 193.
Conophora Africana, A. 216, M. 112.
Salix marina Parkin., A. 304.
Salvia, A. 328, 329, M. 165, 166.
alpina Tabernamontani, A. 357.
Amaranthoides Mich. Nutt., A. 26.
arbores Cameracensis, A. 219.
Silvifolia Hernand., A. 30.
Salustiana, M. 128.
Samandra Bengalensis, A. 260, M. 122.
Sambac Arabum, A. 106.
Sambarana Malabar., Garcia, A. 138.
Sambarane Aust., M. 70.
Sambancaje Brasilis, M. 19.
Sambucus, A. 330. *Indica Bontii*, A. 354.
Samolus Valerandi B. A. 20.
Samp. p. p. radialis cortex, M. 118.
Samitradadi H. Mel., M. 137.
Samodra Tjogam H. Mel., A. 113.
Sanamunda Afric., A. 366, 367, M. 168,
 180, 181.
Africana Parkin., A. 371.
tertia Clus. affinis, M. 179.
Sanders-clandi H. Mel., A. 117.
Sandicalli Zeylan., P. B. P. A. 370.
Sanga-Langbeet Gussil., M. 117.
Sanguis Draconis herba B. A. 305.
Sanicula Officinarum, A. 206.
alpina, A. 330, 331, 332, M. 166.
alpina foliis Boraginis villosa, A. 61.
alpinae genus Ericoides, A. 136.
Aethiopia cruciata, M. 163.
Eboracensis, A. 296.
Sanicula affinis Androsace maj., A. 62.
Sanfangus Japonicus, A. 15.
Santali (fordi) genus, A. 138.
Santalum albo perfumile Garcia, M. 70.
Santalum, M. 167.
Santalus adulterina Ceylon, M. 40.
Santolina Africana, M. 48.
Santonium Alexandrinum, M. 1.
Sapaoe Clus., M. 21.
Saponaria, A. 330, 331, 332.
Saponar arbor tricoceas, A. 263.
Sappa quibala, A. 31.
Saprolobus, A. 90.
Sarcocolla arbor Orientalis, M. 183.
Sargezo Hispan., A. 161.
Saria litoralis Pissini, A. 114.
Sarlaparilla, A. 98.
Sassapar arbor Monard., A. 130.
Sassifolia Indurum, A. 373.
Sather Arabum, A. 333.
Sattarel Cameracensis, A. 328.
Satureia, A. 328, 329, 330, M. 167, 168.
floribus in summis, A. 110.
lutes Sylvestris, A. 245.
Satanna-Pissini, M. 135.
Satin, or Lycopodium, Barid.
Angli., A. 201.
Saururus Plunder, A. 343, M. 167, 171.
arborescens fructu aduno, A. 197.
humilis folio carnoso, A. 51.
Saxifraga, A. 23, 333, 330, 331, 332,
 A. 333.
Saxifraga, A. 333, *Angli.*, A. 344. *Ve-*
netor, A. 216.
Saxiphraga Fris., A. 110, altera, M.
Saxivolvula Hernand., A. 71, 109.
Scabiosa, A. 333, 334, 335, 336, M. 167,
 168.
Africana arborescens Cupressi-pine-
lus, M. 69.
Indica arbores Rati, A. 140. *Ovina*,
 A. 316.
major squammati capitulis, C. B.
 A. 190.
Squamata argentea, B. A. 377.
Scabiosae affinis Anomala Eoulicoid., M. 73.
Scammona Malabar., & *Huic affinis*,
 A. 37.
Macrohizos Ind. Mexicana, H. M.
 115.
rorundifol. Virginica, M. 115.
Scandix, A. 336.
Scandragora, *Scandix*, M. 135.
 Schida.

INDEX

- ## Smyrniacae

INDEX.

Tests

INDEX

[illegible][illegible][illegible]

INDEX.

[illegible]

Tuna d'Inde. *A.* 148.
Tuna adepillee *Malahaw*. *N.* 96.
Turapip & Onagor *Flinn*. *A.* 702.
Turpicave f. Scoparia *Piquet*. *A.* 704.
Turpis *Americana*. *C.B.P.* *A.* 777.
Turbit Officinar. *N.* 114.
Singum quibula. *A.* 55. *Angl. Chym.* 55.
Garganica. *A.* 364.
Turcicus Frustrament. *N.* 94.
Turkey ou-gerschickbedde *Mil.* *N.* 144.
Turkic-Gay nonnarhar dikla. *A.* 144.
Turpis-Cere. *A.* 702.
Tussethorum Indicum *C.B.P.* *A.* 114. *N.* 55.
verum L'albom. *N.* 55.
Turpis altera species *N.* 94. *C.* 117.
Tuutitis. *A.* 69. *N.* 32. *Tufts quibula*.
Tussilag. alpinifoli oblongo. *A.* 131.
alpinis rotundifolia caulescens. *Ibid.*
Tympnamit aqueum *Hernand.* *A.* 1.
Typha Datis *Pa-E*. *A.* 778. *pistia*. *A.* 779.
Typhoniditi *Mil.*. *Hera.* *N.* 146.
Tystryanot quiloc *Hernand.* *N.* 132.
Tyzardensis *Hera.* *N.* 105. *N.* 99.
Tyzaucarpis *Hernand.* *M.* 73. [136].
Tyztion Tycomati *C.B.P.* formica.
Tyzhichiev Telzhiche *Osmia*. *N.* 154.
Tyztioncapellii *Nov. Hsp.* *A.* 154.
Tyzin-Concordia-Tyuzhichiev *N.* 154.
Tyzipatili & Tyzipoi. *N.* 124.
Tyzipatili *Nov. Hsp.* *N.* 99.
Tyztin *Nov. Hsp.* *Racc.* *A.* 1.
Tyztion *Nov. Hernand.* *A.* 105. *N.* 99.
Tyztionpatili altera *Hernand.* *A.* 146.
Thompini-Huizpatili *Nov. Hsp.* *A.* 143.
Thenperio Kihudi f. Neff. *Hera.* *N.* 111.
Thonpotonis *Mil.*. *Hernand.* *A.* 144.
V
VacuumMalahaw. *N.* 139. *N.* 141.
Vaccaria *B.* *A.* 132. Vacinia.
Valianbaffi *Malahaw*. *N.* 64.
Vaidechero Garkihar India. *N.* 183.
Valanya *Malahaw*. *N.* 66.
Valdebona nomine mulla. *A.* 216.
Valerians. *A.* 199. 260. 281. *N.* 135.
Atriplicis folio *Virginiana*. *A.* 261.
Clematines. *A.* 109. Hyssopifol. *Virg.*
A. 141.
Urtice folio *American*. *A.* 1901.
Valerinabide. *A.* 379. *N.* 185.
Valerianella. *A.* 346. *N.* 185.
palustr. *N.* 191. polycarpus. *N.* 194.
Wallia-capo-Mallaga *H. Mal.* *A.* 353.
Walli-pama. *H. Mal.* *A.* 89.
Valli-Tereghin *H. Mal.* *A.* 390.
Valli-yanahali *H. Mal.* *N.* 59.
Vanamstam *Malahaw*. *N.* 198.
Vanamalloodode *Malahaw*. *N.* 98.
Vanamarim *Malahaw*. *N.* 114.
Familia. *A.* 381.
Vamincluddode *Malahaw*. *N.* 131.
Varanna-mulle *Malahaw*. *N.* 107.
Varvacee *Blacwell*. *N.* 150.
Vasivalliarthar-quand. *A.* 41. 383.
Vathappille *Malahaw*. *N.* 97.
Vavkelugolepe *Malahaw*. *N.* 58.
Vaudamalloodode *Malahaw*. *N.* 97.
Veammugoo *Malahaw*. *N.* 59.
Veeda-Caira. *H. Mal.* *A.* 135.
Velamunhu *Malahaw*. *N.* 52.
Vella-canjerre *Malahaw*. *N.* 103.
Vellecacantha *Malahaw*. *N.* 150.
Velle-Minga-nari *H. Mal.* *A.* 392.

[illegible]

